

**AGARICUS PURPURELLUS** (F.H. Moller) F.H. Moller



**AUTORITÉS**

F.H. Moller 1952, Friesia IV (3) : 193, Psalliota purpurella.

F.H. Moller 1952, Friesia IV (3) : 204, Agaricus purpurellus.

**SYNONYMES**

Psalliota amethystina sensu Lange.

## **BIBLIOGRAPHIE**

- Bon, 1985, Documents Mycologiques, 60 : 28  
Cappelli, 1984, Monographie du genre Agaricus : 305, 494  
Cappelli, 2011, Rivista di Micologia n° 54-2 : 107  
Cetto, 1983, I Funghi dal vera, 4 : 1294 (sn. *Psalliota purpurela*)  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 753  
Galli, 2004, Gli Agaricus : 135  
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 416 (sn. *Psalliota purpurella*)  
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 434

## **ICONOGRAPHIE**

- Cappelli, 1984, Monographie du genre Agaricus : 495  
Cappelli, 2011, Rivista di Micologia n° 54-2 : 108  
Cetto, 1983, I Funghi dal vera, 4 : 1294 (sn. *Psalliota purpurella*)  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 753  
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 504  
Galli, 2004, Gli Agaricus : 135  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 135 A (sn. *Psalliota amethystina*)

## **OBSERVATIONS**

Recensement de quelques exemplaires, sous épicéas, sur le plateau du Peuil (alt. 1000 m.)

Petite espèce gracile de la section des 'Minores' caractérisée par un chapeau densément fibrilleux entièrement coloré de rouge vineux ou de lilas, à chair jaunissante à la base du pied et à odeur d'amande amère.

Agaricus dulcidulus, avec lequel il est parfois synonymisé (Index Fungorum, Mycobank, Nauta, ...), en diffère par un chapeau plus pâle, au moins à la marge, et par l'absence d'odeur d'amande amère.

## **DESCRIPTION**

Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, conique à hémisphérique puis convexe et +/- étalé, peu charnu, fibrilleux, entièrement lilacin ou brun vineux à rougeâtre, un peu plus foncé au centre.

Marge un peu frangée de blanchâtre, fibrilleuse.

Lames pâles au début puis gris rosé à brun vineux.

Arête pâle, stérile.

Stipe de 3 - 4 x 0,3 - 0,5 cm, blanc, jaunissant à partir de la base et au froissement, clavé à cylindrique, subbulbeux, soyeux.

Anneau pendant, simple, étroit, mince.

Chair blanche, mince, jaunissant ou ochracé à la base du pied.

Odeur d'amandes amères.

Saveur douce.

Habitat sous conifères herbeux, sur litières d'aiguilles.

Spores ovales, très petites, de 4 - 5 x 3 - 3,5 µ.

Cheilocystides +/- sphéropédonculées, de 15 - 25 x 10 - 15 µ.

**MICROSCOPIE (R.G.)**



Spores x 1000 (dans le congo)



Cheilocystides x 1000 (dans le congo)



Cuticule x 400 (dans l'eau salée)



Epicutis x 400 (dans l'eau salée)