

**AGARICUS SUBPERONATUS (J.E. Lange) Singer**




Planche de Jean Vialard

## AUTORITÉS

J.E. Lange, 1926, Dansk botanisk Arkiv 4 (12) : 8, *Psalliota hortensis* f. *subperonata*  
Singer, 1951, Lilloa 22 : 432, *Agaricus subperonatus*

## SYNONYMES

*Agaricus campestris* var. *vaporarius* Pers.  
*Psalliota subperonata* (J.E. Lange) J.E. Lange

## BIBLIOGRAPHIE

Boisselet, 1993, Bulletin de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 130 : 11  
Bon, 1985, Documents Mycologiques, 60 : 11  
Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 274  
Cappelli, 1984, Monographie du genre *Agaricus* : 156  
Cappelli, 2010, Rivista di Micologia, 53-3 : 201, 201  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 724  
Galli, 2004, Gli *Agaricus* : 98  
Heim, 1969, Champignons d'Europe : 565 (*sub Psalliota*)  
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 410 (*sub Psalliota*)  
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (Réimp. 1994) : 472, 687 (*sub Psalliota*)  
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 426  
Nauta, 2001, Flora Agaricina Neerlandica, 5 : 37  
Parra Sanchez, 2003, Fungi non delineati, 24

## ICONOGRAPHIE

Boisselet, 1993, Bulletin de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 130 : 8  
Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 275  
Cappelli, 1984, Monographie du genre *Agaricus* : 402  
Cappelli, 2010, Rivista di Micologia, 53-3 : 201, 202  
Cetto, 1983, I Funghi dal vera, 4 : 1292 (*sub Psalliota*)  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 724  
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 490  
Galli, 2004, Gli *Agaricus* : 99  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (Réimp. 1994) : Tav. 140 D (*sub Psalliota*)  
Parra Sanchez, 2003, Fungi non delineati, 24.

## OBSERVATIONS

Espèce à chair rougissante, à chapeau subsquamuleux brun fauve à ocracé, à marge appendiculée, lames rose sale et à anneau épais, doublé par quelques bagues chinées blanches.

## DESCRIPTION

Chapeau de 8 à 12 cm de diamètre, charnu, hémisphérique à convexe, puis plan-convexe, brun rougeâtre à ocre fauvâtre, orné de fines écailles triangulaires, ochracées sur fond plus clair.

Marge excédante, appendiculée par les restes du voile blanc, fibrilleuse peignée à subglabre.

Lames très serrées, étroites, libres, ascendantes, rosâtre sale puis brun pourpre.

Arête stérile, blanchâtre.

Stipe de 6 - 10 x 1,5 - 2 cm, subcylindrique à un peu clavé, ferme, plein, blanc, gainé à la base par une sorte d'armille apprimée, souvent rompue en vestiges membranaires désorganisés formant des bracelets +/- complets.

Anneau supère, blanc, mixte ou vaguement double, membraneux, pulpeux, épais ou pelucheux, ample.

Chair ferme, épaisse, blanchâtre, devenant rosâtre sale puis rouge brunâtre à la coupe.

Odeur faible, un peu fruitée, de chicorée dans la vieillesse - Saveur douce.

Habitat dans les jardins, les parcs, les décharges, sous pins, peupliers et autres essences.

Spores subglobuleuses, monoguttulées, de 6 - 7 x 4,5 - 5,5  $\mu$ .

Cheilocystides en massues, en clavules élancées, tortueuses, hyalines, à paroi mince.

Basides à 4 stérigmates, longuement clavées.

## MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans la phloxine)



Spores x 1000 (dans la phloxine)



Cellules marginales (dans le congo)