

ARCYRIA STIPATA (Schwein.) Lister.



BIBLIOGRAPHIE

Martin & Alexopoulos, 1969, The Myxomycètes : 136
M. Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet, Les Myxomycètes, T.1 : 95

ICONOGRAPHIE

Martin & Alexopoulos, 1969, The Myxomycètes : Plate IX, fig. 94
M. Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet, Les Myxomycètes, T.2 : 101

OBSERVATIONS

Sporanges souvent entassés et unis en pseudoaéthaliun, avec le péridium persistant sous forme de coupe.
Les spores, très minutieusement verruqueuses, mesurent de 6 à 8 μ et le capillitium est entouré de bandelettes spiralées ornées d'anneaux ou d'épines.

DESCRIPTION

Sporanges groupés, courtement stipités ou sessiles, de 1 à 2 mm de haut, parfois superposés, entassés ou unis en un pseudoaéthaliun.

Péridium en coupe profonde, membraneux, simple, lisse ou finement papillé, persistant, cuivré, rougeâtre à brun ocracé

Hypothalle brun sombre.

Pédoncule dressé, épais et court, de 0,1 à 1 mm de long, brun sombre, creux, rempli de kystes

Columelle absente.

Capillitium peu élastique, creux avec quelques extrémités libres, entouré de bandelettes spiralées à gauche, discrètes et souvent confondues avec des épines, des anneaux ou des réticulations.

Spores globuleuses, très finement verruqueuses, de 6 à 8 μ de diamètre.

Habitat sur bois mort ou pourrissant de feuillus.

MICROSCOPIE



Capillitium et spores x 400



capillitium et spores x 1000



Spores x 1000