

CLITOCYBE DITOPA (Fr.) Gillet



AUTORITÉS

Fries, 1815, *Agaricus ditopus*, *Observationes mycologicae*, 1 : 91 (basionyme)
Gillet, 1874, *Clitocybe ditopus*, *Hyménomycètes* : 166

...

BIBLIOGRAPHIE

Bon, 1988, *Champignons d'Europe occidentale* : 140
Bon, 1997, *Les clitocybes, omphales et ressemblants* : 79
Bon & Chevassut, 1973, *Documents Mycologiques*, 9 : 36
Breitenbach & Kränzlin, 1991, *Champignons de Suisse de Suisse*, 3 : 157
Consiglio, 1997, *Rivista di Micologia*, 40-4 : 328
Courtecuisse & Duhem, 1994, *Guide des champignons de France et d'Europe* : 305
Kühner & Romagnesi, 1953, *Flore analytique* : 133
Kuyper, 1995, *Flora Agaricina Neerlandica*, 3 : 56
Lange, 1935, *Flora Agaricina Danica*, 1 (Réimp. 1993) : 57, 245 (*sn. Clitocybe ditopoda*)
Moser, 1978, *Kleine Kryptogamenflora* (traduction française) : 182
Phillips, 1981, *Les champignons* : 50

ICONOGRAPHIE

Bon, 1988, *Champignons d'Europe occidentale* : 141
Breitenbach & Kränzlin, 1991, *Champignons de Suisse*, 3 : 157
Cetto, 1979, *I Funghi dal vero*, 3 : 1045
Consiglio, 1997, *Rivista di Micologia*, 40-4 : 329
Courtecuisse & Duhem, 1994, *Guide des champignons de France et d'Europe* : 305
Dähne, 1993, *1200 Pilze* : 206
Lange, 1935, *Flora Agaricina Danica*, 1 (Réimp. 1993) : Tav. 38 A (*sn. Clitocybe ditopoda*)
Phillips, 1981, *Les champignons* : 50

OBSERVATIONS

Espèce à silhouette +/- infundibuliforme, remarquable par son odeur forte de farine rance et par ses basidiomes brun gris, hygrophanes.

La détermination est facilement confirmée au microscope par la présence de spores très petites et subglobuleuses

Recensement d'une dizaine d'exemplaires dans la forêt de Chambarran entre Roybon et le col de Toutes Aures, au lieu dit 'Les pins' (alt. 600 m.)

DESCRIPTION

Chapeau de 1 à 5 cm de diamètre, convexe à aplani et souvent déprimé puis infundibuliforme et ombiliqué, lisse, hygrophane, brun gris et recouvert d'une pruine blanchâtre argenté, gris beige en séchant.

Marge entière, non striée, longtemps enroulée, pruineuse.

Lames gris brunâtre à gris fumeux, sinuées ou subdécurrentes, larges.

Arête entière, concolore.

Stipe de 2 - 5 x 0,1 - 0,6 cm, cylindrique, brun fuligineux, cassant, fibrilleux longitudinalement de blanc, feutré à la base.

Chair aqueuse, brun gris, hygrophane.

Odeur forte de farine rance - Saveur douce mais désagréable.

Habitat sous feuillus et conifères.

Spores subglobuleuses à largement elliptiques.

Cheilocystides absentes.

Epicutis composé d'hyphes parallèles ou irrégulièrement enchevêtrées, x 2 - 5 μ , minutieusement incrustées de jaunâtre, bouclées.

MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 1000 (dans la phloxine)



cuticule x 400 (dans la phloxine)



Hyphe cuticulaire incrustée et bouclée (dans l'eau salée)