

CORTINARIUS CONIFERARUM (Moser) Moëgne-Locc. & Reumaux



SYNONYMES

Cortinarius multiformis fo. *coniferarum* (Moser) Nespiak
Cortinarius multiformis var. *coniferarum* (Moser) Nejdójm.
Phlegmacium multiforme var. *coniferarum* Moser.

BIBLIOGRAPHIE

Bidaud et al., Atlas des Cortinaires, III : Fiche 114
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 218 (*sn. Cortinarius multiformis* var. *coniferarum*)
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1359 (*sn. Cortinarius multiformis* var. *coniferarum*)
Gerault, 2005, Florule évolutive des Basidiomycotina du Finistère (*Internet*)
Marchand, 1982, Champignons du Nord et du Midi, 7 : 702 (*sn. Cortinarius multiformis* var. *coniferarum*)
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 84 (*sn. Cortinarius multiformis* var. *coniferarum*)

ICONOGRAPHIE

Bidaud et al., Atlas des Cortinaires, III : Pl. 62
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 218 (*sn. Cortinarius multiformis* var. *coniferarum*)
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1359 (*sn. Cortinarius multiformis* var. *coniferarum*)
Dähncke, 1993, 1200 Pilze in Farbfotos : 727 (*sn. Cortinarius multiformis* var. *coniferarum*)
Marchand, 1982, Champignons du Nord et du Midi, 7 : 702 (*sn. Cortinarius multiformis* var. *coniferarum*)

OBSERVATIONS

Inféodée aux conifères (épicéas – pins), cette espèce, proche de *Cortinarius multiformis*, en diffère par des couleurs plus saturées. Outre son habitat, il est caractérisée par la présence d'un voile blanc bien visible au centre du chapeau sous forme d'une pruite caractéristique.

DESCRIPTION

Chapeau de 5 à 12 cm de diamètre, hémisphérique puis convexe à plan-convexe, irrégulier ou bossu à la fin, brun jaune à jaune orangé, jaune ocracé, poudré de blanc au centre par la présence du voile, finement fibrilleux radialement, brillant par l'humidité.

Marge incurvée, ondulée, mince, formant au début une étroite marginelle..

Lames plutôt serrées, uncinées ou adnées, blanchâtres à argilacées, brun clair à la fin

Arête concolore, crénelée.

Stipe de 6–10 x 1,5–2,5 cm, ferme, cylindrique, bulbeux marginé, sec, fibrilleux-rayé, blanchâtre puis jaunâtre à ocracé

Cortine blanche, fibrilleuse, abondante, .

Chair épaisse, ferme, blanche à crème jaunâtre

Odeur faible

Saveur douce.

Habitat sous conifères, surtout épicéas et pins en montagne.

Spores ellipsoïdes à subamygdaliformes, ponctuées de petites verrues, de 9-11 x 5-7 μ .

Basides tétrasporiques, bouclées.

Cellules marginales cylindracées à légèrement clavées.

Cuticule composée d'hyphes enchevêtrées, légèrement incrustées.


MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans KOH)



Spores x 1000 (dans KOH)



Cheilocystides x 400 (dans le congo)



Cheilocystides x 1000 (dans le congo)



Cuticule x 400 (dans le congo)