

CORTINARIUS URACEOVERNUS Rob. Henry ex A. Favre & Vialard



AUTORITÉS

Henry, 1981, Bulletin de la Société Mycologique de France, 97-3 : 261, *Cortinarius uraceovernus* (invalide)
A. Favre & Vialard, 2008, Journal des JEC, Journées européennes des Cortinaires 11 (no. 10) : 27

BIBLIOGRAPHIE

Bidaud, Moëgne-Loccoz & Reumaux, 2000, Atlas des Cortinaires, Pars X : 501 (clé), fiche 479
Henry, 1981, Bulletin de la société Mycologique de France, 97-3 : 260
Moëgne-Loccoz & Reumaux, 1989, Fungorum rariorum Icones selectae, XVIII : 42, 45
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 196

ICONOGRAPHIE

Bidaud, Moëgne-Loccoz & Reumaux, 2000, Atlas des Cortinaires, Pars X : Planche 307
Henry, 1981, Bulletin de la société Mycologique de France, 97-3 : 259 (Fig.)
Moëgne-Loccoz & Reumaux, 1989, Fungorum rariorum Icones selectae, XVIII : Pl. 143

OBSERVATIONS

Plusieurs exemplaires recensés dans le marais des Seiglières, commune de St Martin d'Hères (alt. 1100 m.)
Espèce caractérisée par sa poussée précoce, ses spores très grossièrement verruqueuses, son pied remarquablement rayé-strié de fibrilles alternantes blanches par le voile et fauves par le fond.

DESCRIPTION

Chapeau de 1 à 4 cm de diamètre, conico-campanulé à convexe puis plan-convexe, bossu ou orné d'un mamelon obtus ou conique, fortement hygrophane, brun-bistre à brun châtain sombre quand imbu puis ocre alutacé en séchant, souvent givré par un voile blanc.

Marge d'abord enroulée puis incisée ou retroussée, appendiculée par une cortine abondante mais fugace.

Lames espacées, adnées-émarginées, ventruées, assez épaisses, jaune ocracé puis safrané et brun-rouge. Arête entière, plus claire.

Stipe de 6 - 8 x 0,2 - 1,2 cm, subégal ou atténué-pointu, droit ou incurvé, d'aspect sale, à tonalités isabelle à paille fauvâtre ou fauvâtre, remarquablement rayé-strié chez l'adulte de fibrilles alternantes blanches (*voile*) et fauves (*fond*).

Voile blanchâtre, laissant sur le pied une trace annulaire apprimée fugace (*en biais*), mais parfois absente.

Chair blanc-brunâtre à isabelle ou crème ocre dans le chapeau, plus foncée sous les surfaces et dans le pied où elle est parfois brun-rougeâtre ou brun-noirâtre tout en bas.

Odeur nulle ou faible de scléroderme, d'*Inocybe* ou de persil.

Habitat sous conifères, souvent dans les stations marécageuses.

Spores ellipsoïdes à amygdaliformes, en forme de pépin, un peu déprimées sous l'apicule, à sommet obtus, très grossièrement verruqueuses surtout vers l'apex, de 7 - 8 x 5 - 5,5 μ .

Cellules marginales nombreuses, +/- clavées, en palissade ou en bouquet

Epicutis relativement mince, à hyphes x 3 - 5 μ , à extrémités libres égales ou légèrement clavées.

Pigment brun jaunâtre verdâtre, aspérulé ou granuleux sur les hyphes superficielles mais nettement incrustant dans la chair.



MICROSCOPIE (R.G.)




Spores x 400 (dans le congo)



Spores x 1000 (dans le congo)



Hyménium x 400 (dans le congo)



Cuticule x 400