

ENTOLOMA EXCENTRICUM Bres.



SYNONYMES

Rhodophyllus excentricus (Bres.) Kühner & Romagnesi

BIBLIOGRAPHIE

Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 30
Bresadola, 1881, Fungi tridentini, 1 : 11
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 98
Consiglio, 2008, Rivista di Micologia n° 51-1 : 39
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 919
Gerault, 2005, Florule évolutive des Basidiomycotina du Finistère (*Internet*)
Kühner, 1990, Bulletin de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 119: 17
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 198 (*sn. Rhodophyllus excentricus*)
Noordeloos, 1981, Persoonia 11-2 : 252
Noordeloos, 1988, Flora Agaricina Neerlandica, 1 : 117
Noordeloos, 1992, Entoloma : 215

ICONOGRAPHIE

Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 30
Bresadola, Iconographia Mycologica, IV : Tab. 556
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 98
Cheype, 1990, Bulletin de la Fédération mycologique Dauphiné-Savoie, 119: 16
Consiglio, 2008, Rivista di Micologia n° 51-1 : 40
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 919
Noordeloos, 1992, Entoloma : Tav. 24

OBSERVATIONS

Espèce montagnarde plutôt rare caractérisée par sa silhouette collybioïde, son chapeau plu ou moins excentré de couleur alutacée à brun carné et par la présence de cheilocystides plus ou moins ventrues généralement terminées par un col caractéristique.

DESCRIPTION

Silhouette collybioïde.

Chapeau de 3 à 6 cm de diamètre, convexe à plan-convexe puis plus ou moins étalé, faiblement mamelonné, blanchâtre à crème alutacé, nuancé de carné, non hygrophane, lisse à finement feutré.

Marge aiguë, entière, étroitement incurvée.

Lames adnées-émarginées, assez serrées, blanchâtres à rose carné.

Arête ciliée de blanc puis de brun, légèrement crénelées.

Stipe de 3-7 x 0,3-0,8 cm, souvent excentré (pas toujours), subégal, plein, prulineux au sommet, blanchâtre à gris brun, tomenteux de blanc à la base, lisse à légèrement fibrilleux longitudinalement.

Chair blanchâtre plus ou moins nuancé de brunâtre.

Odeur légèrement farineuse.

Saveur douce.

Habitat dans les prairies subalpines non fumées, les clairières, sur sols calcaires.

Spores très anguleuses, de 10-13 x 7-9 μ .


Basides tétrasporiques, clavées à clavées-fusiformes, de 35-50 x 12-14 μ , bouclées.

Cheilocystides largement fusiformes à lagéniformes, subulées ou monoliformes au sommet,


Pleurocystides absentes.

Cuticule formée d'hyphes emmêlées, larges de 2 à 5 μ , non bouclées.

MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans la phloxine)



Spores x 1000 (dans la phloxine)