

INOCYBE CERVICOLOR (Pers.) Quél.



SYNONYMES

Agaricus cervicolor Pers.
Inocybe bongardii variété *cervicolor* (Pers.) Heim
Inocybe hirsuta sensu Bresadola

BIBLIOGRAPHIE

Alessio, 1980, *Inocybe* - Iconographia Mycologica (J. Bresadola) vol. 29, suppl. 3 : Tab. 7
Bon, 1988, *Champignons d'Europe occidentale* : 234
Bon, 1997, *Documents Mycologiques*, 105 : 25
Breitenbach & Kränzlin, 2000, *Champignons de Suisse*, 5 : 9
Chevassut & Bertéa, 1989, *Documents Mycologiques*, 76 : 25
Courtecuisse & Duhem, 1994, *Guide des champignons de France et d'Europe* : 1024
Kühner & Romagnesi, 1953, *Flore analytique* : 219
Kuyper, 1986, *Revision of the genus Inocybe* : 38
Lange, 1935, *Flora Agaricina Danica*, 2 (Réimp. 1994) : 422, 616 (*sn. Inocybe bongardii* variété *cervicolor*)
Malençon & Bertault, 1975, *Flore des champignons du Maroc*, 1 : 348
Stangl, 1989, *Hoppea*, 46 : 58

ICONOGRAPHIE

Bon, 1988, *Champignons d'Europe occidentale* : 241
Breitenbach & Kränzlin, 2000, *Champignons de Suisse*, 5 : 9
Bresadola, 1930 (Réimp. 1981), *Iconographia Mycologica* : Planche 721-2 (*sn. Inocybe hirsuta*)
Courtecuisse & Duhem, 1994, *Guide des champignons de France et d'Europe* : 1024
Dähncke, 1993, *1200 Pilze* : 648, 649 (*sn. Inocybe bongardii* variété *cervicolor*)
Rebaudengo, 1980, *Inocybe* - Iconographia Mycologica (J. Bresadola) vol. 29, suppl. 3 : Tab. 7

OBSERVATIONS

Espèce entièrement beige brunâtre (couleur de cerf), à chapeau recouvert d'écailles pelucheuses et à odeur terreuse, de tonneau moisi.

DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, conique puis campanulé et étalé à obtusément mamelonné, de couleur ocracée et recouvert de fines squamules lilas ou rougeâtres, apprimées avec l'âge. Marge lisse, aiguë.

Lames blanches au début puis brun rougeâtre à brun olivacé, larges, émarginées et étroitement adnées. Arête finement ciliée de blanchâtre.

Stipe de 3 - 8 x 0,3 - 0,8 cm, subégal, plein au début, fibrilleux de brun rougeâtre sur fond blanchâtre, plus ou moins squamuleux par places.

Chair blanchâtre à gris brun pâle, rougissant à la coupe.

Odeur terreuse, de moisi

Saveur plutôt désagréable, légèrement astringente.

Habitat sous conifères et feuillus.

Spores ovoïdes à subelliptiques ou phaséolées, de 11- 14 x 6 - 8 μ .

Basides tétrasporiques, clavées, bouclées.

Cystides absentes, mais présence de poils marginaux hyalins, clavés.

Cuticule constituée d'hyphes parallèles, couchées, larges de 6 à 14 μ , pigmentées de jaune, bouclées, non ou à peine incrustées.

MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans l'eau)



Spores x 1000 (dans l'eau)



Cellules marginales x 400 (dans le congo)



Cuticule x 400 (dans l'eau)



Hyphe de la cuticule bouclée et incrustée (dans l'eau)