

LACTARIUS REPRAESENTANEUS Britzelm.



SYNONYMES

Lactarius speciosus Burl.

Lactarius scrobiculatus var. *violascens* Lindbl.

Lactarius scrobiculatus var. *repraesentaneus* (Britzelm.) Killerm.

BIBLIOGRAPHIE

Basso M. T., 1999, *Lactarius* : 237

Bon, 1980, *Documents Mycologiques*, 40 : 33

Bon, 1998, *Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie*, 150 : 16 (clé)

Courtecuisse & Duhem, 1994, *Guide des Champignons de France et d'Europe* : 1558

Galli, 2006, *I Lattari* : 112

Kränzlin, 2006, *Champignons de Suisse*, 6 : 54

Kühner, 1975, *Bulletin de la Société Mycologique de France*, 91-1 : 12

Kühner & Romagnesi, 1953, *Flore analytique* : 475

Marchand, 1980, *Champignons du Nord et du Midi*, 6 : 525

Michelland, 1987, *Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie*, 106 : 15

Roux, 2006, *Mille et un champignons* : 128

ICONOGRAPHIE

Basso M. T., 1999, *Lactarius* : 240

Courtecuisse & Duhem, 1994, *Guide des Champignons de France et d'Europe* : 1558

Dähncke, 1993, *1200 Pilze* : 940

Galli, 2006, *I Lattari* : 113

Kränzlin, 2006, *Champignons de Suisse*, 6 : 54

Marchand, 1980, *Champignons du Nord et du Midi*, 6 : 525

Michelland, 1987, *Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie*, 106 : 16

Moreau Pierre Arthur, 1995, *Recensement des champignons supérieurs des Saisies* : Planche 5

Roux, 2006, *Mille et un champignons* : 128

OBSERVATIONS

Espèce robuste faisant penser à *Lactarius scrobiculatus* mais à chair devenant violette au contact de l'air. A noter également la marge piléique remarquablement barbue-laineuse et l'habitat dans les pessières humides, généralement en montagne.

DESCRIPTION

Chapeau de 6 à 12 cm de diamètre, convexe puis étalé et souvent creusé au centre, jaunâtre à crème ocracé à jaune clair, +/- nuancé d'orangé, visqueux puis sec, non zoné, revêtu de mèches apprimées, brunissant avec l'âge, taché de violet sombre dans les blessures.

Marge barbue-laineuse par une frange atteignant 5 mm de large.

Lames serrées, arquées, adnées-décurrentes, pâles à crème ocracé, tachées de violet.

Arête entière, brunissante.

Stipe de 3 - 7 x 1 - 2,5 cm, scrobiculé, vite creux, concolore au chapeau ou plus pâle, gris violeté après manipulation.

Chair épaisse, crème blanchâtre, acrescente, devenant violette à l'air en 10 minutes ou plus, suivant la fraîcheur du champignon.

Odeur faible

Saveur subdouce à légèrement âcre.

Latex copieux, blanc, immuable hors de la chair mais devenant violet à son contact, doux puis un peu amarescent.

Habitat sous conifères hygrophiles et acidophiles, dans les pessières fangeuses ou humides, les hauts-marais.

Spores de 8 - 10 x 7 - 9 μ , à verrues +/- reliées, crêtées mais non réticulées.

Sporée crème.

Cystides fusiformes.

Epicutis constitué d'hyphes fasciculées, filamenteuses, incrustées, de 2 à 5 μ de diamètre.


MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans le melzer)



Spores x 1000 (dans le melzer)



Cheilocystides x 400 (dans le congo)



Cuticule x 400 (dans le congo)



Laticifères x 400