

LEPIOTA ALBA (Bres.) Sacc.



SYNONYMES

Lepiota clypeolaria variété *alba* Bres.

BIBLIOGRAPHIE

- Bon, 1975, Documents Mycologiques, 20 : 47
Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 284
Bon, 1993, Les Lepiotes (Monographie) : 58
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 213
Candusso & Lanzoni, 1990, Monographie du genre *Lepiota* : 163
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 669
Gerault, 2005, Florule évolutive des Basidiomycotina du Finistère (*Internet*)
Jamoni, 2008, Funghi alpini : 440
Kühner, 1983, Cryptogamie, Mycologie, 4 : 62
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 403
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (Réimp. 1993) : 19, 191
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 446

ICONOGRAPHIE

- Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 285
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 213
Bresadola, 1927, Iconographia Mycologicae, 3 : Tab. 32-1 (*sn. Lepiota clypeolaria* variété *alba*)
Candusso & Lanzoni, 1990, Monographie du genre *Lepiota* : Planche 13 b
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 410
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 669
Jamoni, 2008, Funghi alpini : 441
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (Réimp. 1993) : Tab. 11 A

OBSERVATIONS

Espèce entièrement blanche au moins au début, à stipe pelucheux et spores fusiformes, proche de *Lepiota clypeolaria* mais poussant dans les pâturages et à chapeau blanc ou à peine coloré au disque mais non contrasté.

Parfois synonymisée à *Lepiota erminea* qui serait alors prioritaire, mais à silhouette gracile, à saveur raphanoïde et à pied orné d'une zone annulaire fugace.

DESCRIPTION

Chapeau de 3 à 6 cm de diamètre, campanulé puis plan convexe, obtusément mamelonné, à calotte discale lisse, longtemps blanche ou à peine ochracée avec l'âge mais non contrastée, finement fibrilleux feutré à un peu laineux squamuleux à la fin.

Marge aiguë, finement frangée.

Lames libres, larges, peu serrées, blanchâtres.

Arête finement floconneuse.

Stipe de 4 - 6 x 0,3 - 0,6 cm, blanc, subcylindrique, cassant, creux, orné d'un anneau membraneux mais fragile, pendant, parfois sous forme d'un bourrelet annulaire laineux.

Chair blanche, immuable.

Odeur faible ou proche de celle de *Lepiota cristata*

Saveur douce, plutôt désagréable.

Habitat dans les pâturages, les clairières herbues, surtout en terrain calcaire, jusqu'en zone alpine.


Spores fusiformes ou à dépression supra appendiculaire, de 12 - 16 x 5 - 7 μ .

Cheilocystides clavées à +/- ventrues - Pleurocystides absentes.

Basides tétrasporiques, bouclées, clavées.

Epicutis constitué de poils allongés jusqu'à 200 μ mêlés à des poils courts et variables.


MICROSCOPIE (R.G.)




Spores x 400 (dans la phloxine)



Spores x 1000 (dans la phloxine)



Cheilocystides x 400 (dans la phloxine)



Cuticule x 400 (dans la phloxine)