

LEPISTA SAEVA (Fr.) P.D. Orton



Planche de J. Vialard

AUTORITÉS

Fries, 1838, *Epicrisis Systematis Mycologici* : 48, *Agaricus personatus* fo. *saevus*

Orton, 1960, *Transactions of the British Mycological Society* 43 (2) : 177, *Lepista saeva*

SYNONYMES

Clitocybe saeva (Fr.) H.E. Bigelow & A.H. Sm.

Lepista personata (Fr.) Cooke

Rhodopaxillus personatus (Fr.) Maire ss. auct. pp.

Rhodopaxillus saevus (Fr.) Maire

Tricholoma personatum var. *saevum* (Fr.) Dumée

Tricholoma saevum (Fr.) Gillet

BIBLIOGRAPHIE

- Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 144
Bon, 1997, Les clitocybes, omphales et ressemblants : 109
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 248 (*sn. Lepista personata*)
Clémenton et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 2 : 395 (*sn. Lepista personata*)
Contu, 1999, Bollettino dell'Associazione Micologica ed Ecologica Romana, 47 : 14
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 429 (*sn. Lepista personata*)
Eyssartier & Roux, 2017, Le guide des champignons : 628
Girel, 1976, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 63 : 20 (*sn. Rhodopaxillus saevus*)
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 171 (*sn. Rhiodopaxillus saevus*)
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (Réimp. 1993) : 43, 225 (*sn. Tricholoma personatum*)
Malençon & Bertault, 1975, Flore des champignons supérieurs du Maroc, 2 : 14 (*sn. Lepista personata*)
Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 47 (*sn. Lepista personata*)
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 188 (*sn. Lepista personata*)
Noordeloos & Kuyper, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 74
Phillips, 1981, Les champignons : 114
Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 2 : 227 (*sn. Rhodopaxillus saevus*)
Roux, 2006, Mille et un champignons : 439

ICONOGRAPHIE

- Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 145
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 248 (*sn. Lepista personata*)
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 587 (*sn. Tricholoma personatum*)
Clémenton et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 2 : 395 (*sn. Lepista personata*)
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 429 (*sn. Lepista personata*)
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 214
Dermek & Pilat, Poznzjemy grzyby : Tab. 121 d
Eyssartier & Roux, 2017, Le guide des champignons : 628
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (Réimp. 1993) : Tav. 28 A (*sn. Tricholoma personatum*)
Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 47 (*sn. Lepista personata*)
Phillips, 1981, Les champignons : 114
Roux, **2006**, Mille et un champignons : 439
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 277
Schlittler, 1972, Champignons à lamelles : 41

OBSERVATIONS

Espèce facilement reconnaissable sur le terrain à son aspect massif et à son pied violet nettement discoloré par rapport au chapeau gris ocre et par rapport aux lames de couleur beige. Proche de *Lepista nuda* qui se différencie par ses couleurs bleutées ou lilacines dans toutes ses parties.

Espèce tardive, fidèle à ses stations, poussant en ronds de sorcières.

Recensée chaque année dès la fin novembre, au col de Toutes Aures (alt. 700 m.) et près de Grenoble, au rocher de Comboire, dans des prés fumés (présence de chevaux).

DESCRIPTION

Chapeau de 6 à 12 cm de diamètre, très charnu, hémisphérique puis plan-convexe à pulviné et étalé, lisse, glabre, un peu pruineux au début, non ou peu hygrophane, gris brun pâle puis café au lait clair uniforme à brun jaunâtre, plus pâle vers la marge.

Marge enroulée au début, assez épaisse, non striée.

Lames serrées, étroites, émarginées à étroitement adnées, parfois presque libres, ventruées, gris pâle à beige rosâtre pâle puis brun rosâtre, minces, galbées, facilement séparables.

Arête entière à faiblement ondulée, concolore.

Stipe court, de 3 - 6 x 1,5 - 2,5 cm, souvent clavé ou ventru, parfois bulbeux à la base, pourpre violacé sombre ou bleu violacé, blanchâtre au sommet, virant au brun rougeâtre à partir de la base avec l'âge, mais toujours nuancé de violacé au centre, plein puis farci, cotonneux de blanc à la base.

Chair épaisse, ferme, cassante, blanchâtre à l'intérieur mais concolore aux surfaces dans le cortex.

Odeur faible ou un peu aromatique, peu caractéristique - Saveur douce et agréable.

Habitat dans les pâturages, en lignes ou en ronds de sorcières, très tardif, sur sol calcaire.


Spores de 6 - 8 x 4 - 5 μ , elliptiques, hyalines, finement verruqueuses ou ponctuées.

Sporée crème rosâtre avec des reflets orangés.

Basides tétrasporiques, clavées, bouclées - Cystides absentes.

Cuticule formée d'hyphes irrégulièrement enchevêtrées de 2 à 6 μ de large, bouclées, à extrémités libres, un peu ramifiées mais peu nombreuses - Pigment intracellulaire brunâtre.

MICROSCOPIE (R.G.)



spores x 400 (dans la phloxine)



spores x 1000 (dans l'eau)



baside et basidioles x 1000 (dans le congo)



cuticule x 1000 (dans le congo)