

SARCOSCYPHA JURANA (Boud.) Baral



SYNONYMES

Sarcoscypha coccinea variété *jurana* Boud.

BIBLIOGRAPHIE

Boudier, 1905-1910, *Icones Mycologicae*, 4 (Réimp. 1982) : planche 323
Grelet, Réimp. 1979, *Les Discomycètes de France* : p.128

ICONOGRAPHIE

Boudier, 1905-1910, *Icones Mycologicae*, 2 (Réimp. 1981) : planche 323

OBSERVATIONS

Diffère de *Sarcoscypha coccinea* par des spores plus courtes, plus larges, moins fusiformes, comme tronquées dans le jeune âge, souvent biguttulées, mesurant de 20-30 x 12-15 μ .

DESCRIPTION

Fructifications stipitées, de 1 à 5 cm.

Apothécie cyathiforme puis cupuliforme et étalée.

Hyménium rouge écarlate, d'un rouge cocciné très pur.

Surface externe rosée à ocracée ou blanchâtre, granuleuse, furfuracée ou floconneuse, à marge longtemps enroulée.

Pied cylindrique, généralement court, pâle, poilu à la base.


Habitat de Février à Mars sur bois moussus, branchettes enfouies, dans les stations humides.

Spores elliptiques, lisses, hyalines, obtuses au sommet, +/- tronquées dans la jeunesse puis finement nébuleuses avec 2 petites vacuoles aux extrémités et une grosse goutte centrale

Asques octosporés, à spores unisériées, de 400 - 450 x 13 - 15 μ , ne bleussant pas dans le Melzer.

Paraphyses grêles, cylindriques, peu ramifiées, à contenu granuleux rouge, verdissant dans l'iode.

MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 400 (dans la phloxine)



Spore x 1000 (dans la phloxine)



Asques et spores x 400 (dans la phloxine)



Asques x 100 (dans la phloxine)



Asques et paraphyses x 400