

TUBARIA CONFRAGOSA (Fr.) Harmaja



Photo de Gilles Bonnet-Machot

AUTORITÉS

Fries, 1838, *Epicrisis Systematis Mycologici* : 169, *Agaricus confragosus*
Harmaja, 1978, *Karstenia*, 18 : 55, *Tubaria confragosa*

SYNONYMES

Fulvidula confragosa (Fr.) Singer
Naucoria confragosa (Fr.) Singer
Pholiota confragosa (Fr.) P. Karst.

BIBLIOGRAPHIE

Courtecuisse & Duhem, 1995, *Guide des champignons de France et d'Europe* : 1237
Dähncke R.M., 1993, *1200 pilze in Farbfotos* : 635
Kühner, 1969, Travaux du laboratoire de 'La Jaysinia' 3 à Samoëns, 3 : 67-71
Lamoure, 1995, *Bulletin de la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie*, 137 : 30
Moser, 1983, *Kleine Kryptogamenflora II b/2 (5^e éd.)* : 304
Nordic Macromycètes, Vol.2, 1992 : 340
Renard, 2009, *Bulletin de la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie*, 195 : 10
Romagnesi, 1942, *Bulletin de la Société Mycologique de France*, 58 : 89 (*sn. Fulvidula confragosa*)

ICONOGRAPHIE

Courtecuisse & Duhem, 1995, *Guide des champignons de France et d'Europe* : 1237
Dähncke R.M., 1993, *1200 pilze in Farbfotos* : 635
Renard, 2009, *Bulletin de la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie*, 195 : 10
Ryman & Holmasen, 1984, *Svamâr* : 464

OBSERVATIONS

Espèce lignicole caractérisée par la présence d'un anneau submembraneux, un chapeau hygrophane, des spores subphaséolées et des cheilocystides cylindro-fusiformes

DESCRIPTION

Chapeau de 2 à 4 cm, campanulé-convexe à plan-convexe, parfois légèrement déprimé, hygrophane, brun roux à brun rougeâtre par l'humidité, ocre incarnat en séchant, sublisse à plus ou moins pelucheux.

Marge généralement plus claire, jamais striée mais nettement voilée chez les jeunes exemplaires.

Lames peu serrées, adnées-émarginées, subconcolores au chapeau ou roux brique.

Stipe de 3 - 6 x 0,2 - 0,5 cm, subégal ou clavé, tubuleux, concolore au chapeau, fibrilleux ou cotonneux de blanc par les restes du voile, hérissé de trichoïdes blancs à la base.

Anneau fixé sur le tiers supérieur du pied, submembraneux, blanchâtre sale, descendant, longtemps sous-tendu puis étalé, longtemps persistant.

Chair brun roux vineux à concolore au chapeau.

Saveur douce, plutôt agréable.

Odeur fruitée à plus ou moins de pelargonium.

Habitat sur souches ou branches mortes de feuillus, au voisinage des tourbières ou des marécages.

Spores de 6 - 8 x 4 - 6 μ , cylindro-phaséolées, sans pore germinatif, obtuses aux extrémités, lisses.

Basides tétrasporiques, claviformes, bouclées.


Cheilocystides cylindracées à subfusiformes, saillantes, bouclées à la base, de 40 - 50 x 5 - 8 μ .

Epicutis à hyphes x 4 - 12 μ , à pigment membranaire ou incrustant brun jaune, partiellement bouclées.


MICROSCOPIE (R.G.)



Spores x 1000




Cheilocystides et spores



Cheilocystides x 400 (dans la phloxine)



Cheilocystides x 1000 (dans la phloxine)



Hyphes de la cuticule x 400