

SORTIE DU 4 MAI 2019

Responsables: André TARTARAT et Claudine VICHERD

Lieu: La Cordelière

Saison plutôt sèche, ventée, tardive et froide.

Hygrophorus marzuolus (Hygrophore de Mars)

Chapeau de 3 à 10 cm, lisse, lubrifié, blanc à gris noir. Lames espacées blanches puis grisâtres, épaisses. Pied plein, ferme, sec, gris blanchâtre à gris noirâtre. Chair blanche, épaisse, ferme, fibreuse dans le pied. Odeur nulle. Saveur douce. Sous feuillus et conifères au printemps, à partie de 800m.

Excellent comestible.



Photo Cl.Vicherd

Strobilurus esculentus (Collybie des cônes)

Chapeau de 1 à 4 cm, lisse, convexe puis aplati, de brun rougeâtre à châtain sombre. Lames serrées, blanches à gris blanchâtre ou crème. Stipe (pied) égal, fibrilleux concolore au chapeau, plus clair au sommet. Chair mince, pâle. Odeur faible non caractéristique. Sur cônes d'épicéas enfouis, au printemps.

Excellent comestible mais pied coriace à couper.

Risque de confusion avec Mycena strobilicola.



Photo Ch.Rougier

Mycena strobilicola (Mycène des cônes)

Chapeau 1 à 3 cm, ovoïde à conique, lisse, mat, brun foncé à brun clair. Lames larges, ventrues, assez épaisses, blanches à gris blanchâtre. Pied égal, parfois arqué, creux, cassant, brun gris à brun clair, sec, feutré de blanc en bas. Chair mince, blanchâtre. Odeur eau de Javel. Habitat d'avril à juin en montagne, sur cônes enfouis d'épicéas.

Non comestible du fait de son odeur de Javel.



Photo Ch. Rougier

Clitocybe pruinosa (Clitocybe à chapeau pruineux)

Chapeau de 3 à 5 cm, plan-convexe à creusé au centre, pruineux au début, brun-roussâtre à grisâtre ou beige ocracé terne. Lames blanchâtres à beige, assez serrées. Pied blanchâtre orné de radicelles, vite creux. Chair pâle. Odeur non caractéristique.

Comestibilité non prouvée. À éviter.



Photo Ch.Rougier

Entolome hirtipes (Entolome mamelonné)

Chapeau de 2 à 7 cm, conique à campanulé, papillé, brun foncé. Lames larges, ascendantes, blanchâtres puis gris rose sale, brun rose avec l'âge. Pied de 8 à 12 cm, souvent torsadé, creux, rigide, cassant, gris brun, orné de fibrilles longitudinales blanchâtres. Chair mince, gris brun à brun beige. Odeur de poisson. Habitat au printemps, dans les forêts de conifères de montagne, à la fonte des neiges.

Très toxique comme la plupart des entolomes.



Photo Ch. Rougier

Mycena stipata (alcalina) (Mycène cespiteuse)

Chapeau 1 à 3 cm, conique puis campanulé, brun gris à brun rougeâtre, strié par transparence, hygrophane. Marge crénelée. Lames ascendantes, gris pâle à arête blanchâtre. Pied concolore au chapeau, hérissé à la base, lisse cassant. Chair mince, concolore. Odeur nitreuse ou d'eau de Javel. Habitat sur les souches de conifères, printemps et automne.



Photo Cl. Vicherd

Melanoleuca cognata (Tricholome à lames couleur saumon)

Chapeau de 6 à 10 cm, convexe, plus ou moins mamelonné, crème ocracé vif à brun orangé ou café au lait. Lames serrées, arquées, échancrées, crème ocracé à reflets orangé saumoné. Pied de 6 à 12 cm cylindrique, plein, presque concolore au chapeau. Chair blanchâtre dans le chapeau. Odeur herbacée, agréable. Dès le printemps en montagne, en bordure de chemins, dans les clairières.

Bon comestible, mais méconnu.



Photo Ch. Rougier

Hypholoma capnoides (Hypholome à lames enfumées)

Chapeau convexe jaunâtre à orangé au centre, marge pâle. Lames blanchâtres puis grisâtres, puis brun violacé, assez serrées. Pied tenace, arqué, fibrilleux, brun rougeâtre à partir de la base. Chair blanchâtre. Odeur faible, agréable. En touffes sur souches.

Consommation déconseillée.



Discina perlata (Discine ou pézize perlée)

Fructifications de 3 à 10 cm, en forme de coupe puis vite étalées, avec la marge relevée, brun carné à brun bai, ondulé à plissé au centre, face extérieure plus pâle, veloutée. Chair cassante. Odeur faible. Sur souches de conifères au printemps.

À rejeter.

Risque de confusion avec Discina venosa.



Photo Cl. Vicherd

Gyromitra esculenta (Gyromitre soit-disant comestible)

Chapeau en forme de cervelle, sans alvéoles. Chair fragile cassante, blanchâtre. Pied court épais blanchâtre. Avril à juin, en plaine et montagne, sous conifères et feuillus.

Risque de confusion avec les morilles.

Mortelle.



Photo Cl. Vicherd

Auriscalpium vulgare



Rutstroemia bulgaroides



Aleurodiscus amorphus



Ganoderma carnosum (lucidum)



Trichaptum abietinum



Fomitopsis pinicola

