

## SORTIE MYCOLOGUE DU DIMANCHE 23 AOUT 2020

Massif de Belledonne Chamrousse Arselle, Fond-froide

Altitude respectivement 1530 m et 1620 m.

Encadrement assuré par Didier GIBIER & André TARTARAT

### Les participants

André Tartarat – Didier Gibier – Evelyne Tardy – André Bernard  
Jocelyne Sergent – Sepehr Bahrinejad - Gilles Bonnet-Machot - Suzanne Chardon  
Anne Excoffier - Claudine Vicherd - Jean-Jacques Lefrançois

Malgré la sécheresse, nous avons tout de même trouvé 28 espèces (Voir tableau) dont une assez rare, Entoloma sphagnorum.



Photos des participants lors de cette promenade, en partant du parking de la salle hors sac du plateau de l'Arselle à 1620 m, descente vers Fond-froide depuis la source Badet 1530 m par la piste de ski de fond de l'Astragale, puis remonté par un autre sentier pour reprendre en partie le sentier de découverte de la tourbière et retour au travers de celle-ci pour la pose repas.

Le temps s'étant détérioré pendant la pose, il faisait assez froid et surtout, dans les nuages, la continuité pour l'après midi que nous avions prévu vers le lac des vallons n'a pu se faire. Ce sera remis à plus tard quand les champignons voudront bien se montrer.





Didier Gibier

## Liste détaillée

<u>Etat de la fiche</u>	<u>Habitat Odeur</u>	<u>Genre Espèce var. fo.</u>	<u>Synonyme(s)</u>	<u>Nom(s) français</u>
			<u>Commentaires</u>	
 N° fiche 130 N° table 22 - Fiche Courante	Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide. Non caractéristique.	<b>Amanita muscaria</b> (L.) Lam. nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Amanitaceae		Amanite tue-mouches
 N° fiche 263 N° table 29 - Fiche Courante	Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide. Fongique, très agréable.	<b>Boletus edulis</b> Bull. nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Boletales Boletaceae	Chapeau rouge éclairé moucheté de flocons blancs. Anneau membraneux, juponnant - Lames blanches.	Cèpe de Bordeaux
 N° fiche 277 N° table 31 - Fiche Courante	Dans les pâturages, à l'étage montagnard ou alpin. Inodore.	<b>Bovista nigrescens</b> Pers. nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Agaricaceae	Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.	Boviste noirissante
 N° fiche 295 N° table 29 - Fiche Courante	Sous conifères et feuillus, en calcaire. Un peu acidulée, de vinaigre.	<b>Caloboletus calopus</b> (Pers.) Vizzini nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Boletales Boletaceae	Fructifications de 3 à 7 cm, sans partie stérile. Endopérnidium non gris mais brun noirâtre, luisant.	Boletus calopus Bolet à beau pied
 N° fiche 320 N° table 12 - Fiche Courante	Surtout sous feuillus, en terrain non calcaire. Forte et agréable, fruitée, d'abricot.	<b>Cantharellus cibarius</b> Fr. nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Cantharellales Hydnaceae	Chair bleuissant légèrement à la coupe, très amère. C. cibarius var. atlanticus - Chair jaune vif uniforme - Chair blanche ou jaune. Pils décurrents, fourchus, jaune orange.	Cantharellus cibarius var. salmoneus C. cibarius var. atlanticus - Chanterelle ou girolle
 N° fiche 353 N° table 09 - Fiche Courante	Sur bois mort de feuillus ou de conifères. Inodore.	<b>Chlorociboria aeruginosa</b> (Nyl.) Ramamurthi et coll. Ascomycota Leotiomycetes Helotiales Chlorobasidiomycetidae		Chlorosplenium aeruginosa Pézize verte de gris
 N° fiche 450 N° table 23 - Fiche Courante	Sous feuillus et résineux, dans les clairières. Fortement farineuse.	<b>Clitopilus prunulus</b> (Scop.) P. Kummer nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Entolomataceae	En forme de disque - Hyménium jaunâtre ou vert pâle. Colore le bois de bleu-vert - Spores de 9-14 x 2-4 µ.	Clitopilus prunulus Meunier
 N° fiche 1004 N° table 24 - Fiche Courante	Dans les pessières humides, dans les hauts-marais. Faible, non caractéristique.	<b>Cortinarius subvalidus</b> Rob. Henry Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Cortinariaceae	Lames très décurrentes, blanches puis roses.	Croche de Cortinarius validus
				Chapeau brun fauve, à marge longtemps enroulée. Voile ocre et laineux sur le stipe et le chapeau.

## Liste détaillée

<u>Etat de la fiche</u>	<u>Habitat Odeur</u>	<u>Genre Espèce var. fo.</u>	<u>Synonyme(s)</u>	<u>Nom(s) français</u>
			<u>Commentaires</u>	
N° fiche 1140 N° table 19 - Fiche Courante	Sous conifères, sur humus ou tapis d'aiguilles. De mois, d'insecticide, de lindane.	<b>Cystoderma amianthinum</b>  (Scop.) Fayod Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Agaricaceae		Cystoderme furfuracé
N° fiche 3665 N° table 23 - Fiche Courante	Dans les hauts marais, dans les sphaignes ou proche. Nulle - Saveur amaraescente.	<b>Entoloma sphagnorum</b>  (Romagn. & J. Favre) Bon & Courtec. Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Entolomataceae	Rhodophyllus sphagnorum  Chapeau chamois ochracé, finement farineux-granuleux Stipe concolore, couvert d'une armille floconneuse.	Entolome des sphaignes
N° fiche 1367 N° table 10 - Fiche Courante	Parasite des rhododendrons et de leurs hybrides. Nulle.	<b>Exobasidium rhododendri</b>  (Fuckel) C.E. Cramer Basidiomycota Hérobasidiomycé Exobasidiales Exobasidiaceae		Exobasidium du rhododendron  Sous forme de nodosités irrégulières de 1 à 3 cm. De couleur rose verdâtre à rose rouge puis pruineuses.
N° fiche 1395 N° table 11 - Fiche Courante	Saprophyte des conifères, parfois des poulailleurs.	<b>Fomitopsis pinicola</b>  (Swartz) P. Karst. Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Fomitopsidaceae	Ungulina marginata  Fructifications dimidiées à surface brun-rouge. L'un des polypores les plus communs.	Polypore marginé
N° fiche 1417 N° table 26 - Fiche Courante	Dans les marais, parmi ou sur les sphaignes. Légèrement farineuse.	<b>Galerina sphagnorum</b>  (Pers.) Kühner nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Strophariaceae		Galère des marais  Chapeau jaune ochracé, strié presque jusqu'au centre. Stipe subconcolor au chapeau, fibrilleux de blanc
N° fiche 1484 N° table 26 - Fiche Courante	Sur bois dégradé de conifères et de feuillus. Légèrement herbacée.	<b>Gymnopilus penetrans</b>  (Fr.) Murrill nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Strophariaceae	Gymnopilus stabilis - Gymnopilus hybridus  Chapeau feutré, jaune orangé - Cortine persistante. Lames jaunâtres et saveur amère.	Gymnopile pénétrant
Logo N° fiche 1989 N° table 14 - Fiche Courante	Dans les bois, au bord des chemins. Insignifiante.	<b>Laccaria laccata</b>  (Scop.) Cooke nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Hydnangiaceae		Laccaire laqué  Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisse. Lames espacées, épaisse, larges, rose carné.
N° fiche 2037 N° table 28 - Fiche Courante	Exclusivement sous épicéas.	<b>Lactarius deterrimus</b>  Gröger Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Russulaceae		Lactaire des épicéas  Chapeau orangé vif, vite verdissant, orange, immuable, amer. Latex peu abondant, orange, immuable, amer.

## Liste détaillée

<u>Etat de la fiche</u>	<u>Habitat Odeur</u>	<u>Genre Espèce var. fo.</u>	<u>Synonyme(s)</u>	<u>Nom(s) français</u>
			<u>Commentaires</u>	
N° fiche 2047	Surtout sous feuillus, dans les taillis.	<b>Lactarius fulvissimus</b>		Lactaire fauve
N° table 28 - Fiche Courante	De vieux tonneaux, de vinaise.	Romagn. Basidiomycota Agaricomycetes Russulales Russulaceae	Chapeau roux orangé, pruineux, non zoné. Latex vite tari, non jaunissant, doux.	
N° fiche 2071	En montagne, dans les pessières.	<b>Lactarius picinus</b>		Lactaire enfumé
N° table 28 - Fiche Courante	Non caractéristique.	Fr. Basidiomycota Agaricomycetes Russulales Russulaceae	Chapeau brun noirâtre sombre, sec, velouté. Latex lentement rosâtre sur la chair, âcre.	
N° fiche 2414	Greffé sur rameaux et branchettes de feuillus au sol.	<b>Marasmius rotula</b>	(Scop.) Fr. nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Marasmiaceae	Marasme petite roue
N° table 17 - Fiche Courante	Insignifiante.			
N° fiche 2814	Sur bois mort de bouleau.	<b>Piptoporus betulinus</b>	(Bull.) P. Karst. nom. sanct. Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Fomitopsidaceae	Polypore du bouleau
N° table 11 - Fiche Courante	Agréable, acidulée.			
N° fiche 2961	Sur bois mort de feuillus, rarement sur conifères.	<b>Pycnoporus cinnabarinus</b>	(Jacq.) P. Karst. Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae	Tramète cinnabarine - Polyporus cinnabarinus
N° table 11 - Fiche Courante	Non remarquable.			Tramète rouge cinabre
 N° fiche 3113	Surtout sous hêtres (Fagus),, sur sols plutôt pauvres.	<b>Russula cyanoxantha</b>		Russule charbonnière
N° table 27 - Fiche Courante	Faible, non significative.		(Schaeff.) Fr. Basidiomycota Agaricomycetes Russulales Russulaceae	Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce. Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.
N° fiche 3189	Sous hêtres, en terrain acide.	<b>Russula mairei</b>		Russule de Maire
N° table 27 - Fiche Courante	De coco.	Singer Basidiomycota Agaricomycetes Russulales Russulaceae		Port robuste et chapeau ferme, d'un beau rouge. Lames blanc glauque - Saveur âcre - Stipe blanc pur.
N° fiche 3197	Dans les pessières à myrtilles, en montagne.	<b>Russula mustelina</b>		Russule couleur de belette
N° table 27 - Fiche Courante	Faible, non caractéristique.	Fr. Basidiomycota Agaricomycetes Russulales Russulaceae		Espèce compacte - Chapeau sec, brun noisette. Saveur douce - Lames crème - Chair épaisse.

## Liste détaillée

<u>Etat de la fiche</u>	<u>Habitat Odeur</u>	<u>Genre Espèce var. fo.</u>	<u>Synonyme(s)</u>	<u>Nom(s) français</u>
			<u>Commentaires</u>	
N° fiche <b>3289</b> N° table <b>27 -</b> Fiche Courante	Sous conifères de montagne, près des hauts-marais. De crustacés en train de cuire.	<b>Russula xerampelina</b> (Schaeff.) Fr. Basidiomycota Agaricomycetes Russulales Russulaceae	Russula erythropus - <i>Russula marthae</i> Chapeau pourpre - Stipe rose rouge - Lames ocre. Saveur douce - Réaction verte avec SO4Fe.	Russule feuille morte
N° fiche <b>3454</b> N° table <b>11 -</b> Fiche Courante	Sur bois mort de feuillus (hêtres, bouleaux ...). Nulle.	<b>Trametes pubescens</b> (Schumach.) Pilát Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae	Coriolus pubescens - Trametes velutina Chapeau velouté, délicatement zoné, ocre-jaune. Pores arrondis, jaune ochracé - Trame aérifiée.	Tramète pubescente
N° fiche <b>3457</b> N° table <b>11 -</b> Fiche Courante	Sur bois peu dégradé, surtout de feuillus. Nulle.	<b>Trametes versicolor</b> (L.) Lloyd Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporaceae	Coriolus versicolor Trame très mince - Pores fins et étroits, arrondis. Chapeaux multiples, concrècents, zonés, veloutés.	Tramète versicolore
N° fiche <b>3538</b> N° table <b>15 -</b> Fiche Courante	Sous conifères, rarement sous eucalyptus. Subnulle à légèrement farineuse.	<b>Tricholoma pseudonictitans</b> Bon Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Tricholomataceae	Tricholoma fulvum var. pseudonictitans Chapeau brun fauve, à marge non cannelée. Lames crème - Chair du pied jaune au grattage.	Tricholome luisant