

SORTIE D'ÉTUDE

dimanche 31 octobre 2021

Belledonne : La Cabane à Bonnet

Jean Debroux, mycologue.

Nathalie Szylowicz, François Pierre, en charge de l'organisation.


Cette sortie a réuni 13 participants qui ont prospecté entre la route d'accès à Chamrousse, au-dessus des Seiglières, et la Cabane à Bonnet (1268m). Malgré la sécheresse qui perdure depuis le début de l'automne, 56 espèces ont été récoltées et déterminées sur place par Jean Debroux et Robert Garcin. Le tour de table et le repas se sont déroulés devant la cabane, sous un temps finalement clément malgré les prévisions pessimistes.



Avant



Après



Le Grand Colon

La liste des espèces récoltées est reportée ci-dessous. Huit d'entre elles font l'objet d'une fiche détaillée, grâce à Jean Debroux qui s'est concentré sur quelques genres pouvant faire l'objet de confusions : Laccaria avec Mycena, ainsi que Gymnopilus avec Hypholoma.

Liste des espèces déterminées
(noms des taxons d'après le fichier S.M.D.)

Genre	Espèce	var. / fo.	Auteurs	Synonymes	Nom français
Agaricus	sp				
Amanita	muscaria		(L. : Fr.) Lamarck		Amanite tue-mouches
Amanita	vaginata		(Bull. : Fr.) Lam.		Amanite vaginée Grisette
Armillaria	ostoyae		(Romagn.) Herink	Armillaria obscura	Armillaire d'Ostoya
Boletus	edulis		Bull. : Fr.		Cèpe de Bordeaux - Gros pied
Calocera	viscosa		(Pers. : Fr.) Fr.		Calocère visqueuse
Chalciporus	piperatus		(Bull. : Fr.) Bataille	Boletus piperatus	Bolet poivré
Clitocybe	fragrans		(With. : Fr.) P. Kumm.	Clitocybe suaveolens Clitocybe deceptiva	Clitocybe parfumé
Coprinus	comatus		(O.F. Müll. : Fr.) Pers.		Coprin chevelu - Escumelle
Cortinarius	croceus		(Schaeff.) Gray		Cortinaire safran
Cortinarius	multiformis		(Fr.) Fr.	Cortinarius lundellii	Cortinaire multiforme
Cystoderma	amianthinum	fo. rugosoreticulatum			Cystoderme à Robert
Fomitopsis	pinicola		(Swartz) P. Karst.	Ungulina marginata	Polypore marginé
Galerina	marginata		(Batsch) Kühner	Galerina unicolor Galerina autumnalis	Galère marginée
Gymnopilus	penetrans		(Fr. : Fr.) Murrill	Gymnopilus stabilis Gymnopilus hybridus	Gymnopile pénétrant
Gymnopilus	sapineus		(Fr. : Fr.) Maire		Gymnopile du sapin
Hydnum	rufescens		Pers. : Fr.	Hydnum repandum var. rufescens	Pied de mouton roussissant
Hypholoma	capnoides		(Fr. : Fr.) P. Kumm.	Geophila capnoides Psilocybe capnoides	Hypholome à lames enfumées
Hypholoma	marginatum		(Pers. : Fr.) J. Schröt.	Hypholoma dispersum Psilocybe marginata	Hypholome marginé
Hypholoma	radicosum		J.E. Lange	Hypholoma epixanthum var. radicosum Psilocybe radicosa	Hypholome radicant
Hypomyces	lateritius		(Fr.) Tul. & C. Tul.	Peckiella lateritia	Hypomyces couleur de brique
Imleria	badia		(Fr. : Fr.) Vizzini	Boletus badius Xerocomus badius	Bolet bai Cèpe bai
Inocybe	geophylla	var. lilacina	Fr.		variété lilas d'Inocybe geophylla
Laccaria	amethystina		(Huds.) Cooke	Laccaria amethystea - Clitocybe	Laccaire amethyste - Laqué violet

				amethystina	
Laccaria	laccata		(Scop. : Fr.) Cooke		Laccaire laqué
Lactarius	aurantiofulvus		J. Blum ex Bon	Lactarius aurantiacus	Lactaire fauve orangé
Lactarius	pallidus		Pers. : Fr.		Lactaire pâle
Lactarius	salmonicolor		R. Heim & Leclair		Lactaire couleur saumon
Lepiota	cristata		(Bolton : Fr.) P. Kumm.		Lépiote crêtée - Lépiote radis
Morganella	pyriformis		(Fr.) Pat.	Lycoperdon pyriforme Apioperdon pyriforme	Vesse de loup en poire
Mycena	pura		(Pers. : Fr.) P. Kumm.	Prunulus purus	Mycène pur
Mycena	rosea		Gramberg	Mycena pura fo. et var. rosea	Mycène rose
Panellus	stipticus		(Bull. : Fr.) P. Karst.	Panus stipticus - Pleurotus stipticus Lentinus stipticus	Panelle styptique
Panellus	stipticus	var. albus			Panelle à Robert
Parasola	conopilus		(Fr.) Orstadus & E. Larss.	Psathyrella subatrata Psathyrella conopilus	Psathyrelle à chapeau conique
Paxillus	involutus		(Batsch : Fr.) Fr.		Paxille enroulé
Pholiota	lenta		(Pers. : Fr.) Singer	Dryophila lenta Flammula lenta	Pholiote glutineuse
Pseudoclitocybe	cyathiformis		(Bull. : Fr.) Singer	Clitocybe cyathiformis Omphalia cyathiformis	Clitocybe en coupe
Rhodocollybia	butyracea		(Bull. : Fr.) Lennox	Collybia butyracea	Collybie beurrée
Russula	badia		Quél.	Russula friesii	Russule perfide
Russula	chloroides		(Krombh.) Bres.		Russule à lames glauques
Russula	cyanoxantha		(Schaeff.) Fr.		Russule charbonnière
Russula	fellea		(Fr. : Fr.) Fr.		Russule de fiel
Russula	integra		(L.) Fr.		Russule des épicéas
Russula	langei		Bon		Russule de Lange
Russula	ochroleuca		Pers.		Russule ocre et blanche
Trametes	versicolor		(L.) Lloyd	Coriolus versicolor	Tramète versicolore
Tricholoma	boudieri		Barla	Tricholoma lavedanum sensu auct.	Tricholome de Boudier
Tricholoma	pseudonictitans		Bon	Tricholoma fulvum var. pseudonictitans	Tricholome luisant
Tricholoma	saponaceum		(Fr. : Fr.) P. Kumm.		Tricholome à odeur de savon
Tricholoma	sulphureum		(Bull. : Fr.) P. Kumm.	Tricholoma bufonium Tricholoma subsulphureum	Tricholome soufré
Tylopilus	felleus		(Bull. : Fr.) P. Karst.	Boletus felleus	Bolet amer

				Suillus felleus	Bolet chicotin
Xerocomellus	chrysenteron		(Bull.) Sutara	Boletus chrysenteron Xerocomus chrysenteron	Bolet à chair jaune
Xerocomus	subtomentosus		(L. : Fr.) Quéél.	Xerocomus xanthus Boletus subtomentosus	Bolet subtomenteux



Mycena rosea

Mycène à odeur de rave et de couleur rose

Chapeau de 4 à 7 cm, convexe à étalé, entièrement de couleur rose, à marge striée.

Lames blanchâtres +/- nuancées de rose.

Pied subconcolore au chapeau - Chair à odeur de rave.

Commun sous les hêtres.

Toxique



Laccaria laccata

Espèce commune et polymorphe, à chapeau brun rosé pâle, strié,

à **lames** roses à brun rosé et à stipe concolore.

Chapeau de 2 à 4 cm, hygrophane, brun rosé à l'état humide, beige à beige rosé en séchant.

Marge souvent striée par transparence - Lames rosâtres.

Pied fibrilleux, concolore au chapeau.

Dans les bois, en bordure des chemins forestiers.



Mycena pura

Espèce très variable, comportant de nombreuses formes ou variétés

Chapeau de 3 à 5 cm, convexe puis étalé, hygrophane, rose lilacin +/- violacé, à marge striée.

Lames pâles, plus ou moins nuancées de lilas.

Pied concolore au chapeau

Odeur de rave.

Sous feuillus et conifères.



Laccaria amethystina

Espèce très commune, facile à reconnaître sur le terrain grâce à sa monochromie d'un violet saturé sur le frais mais se décolorant par le sec jusqu'au blanchâtre.

Chapeau souvent ombiliqué, hygrophane, violet vif à l'état humide, lilas pâle sur le sec.

Lames violettes,

Pied fibreux, concolore.

Commun sous feuillus et conifères.

Comestible mais sensible à la radioactivité.



Gymnopilus penetrans

Difficile à séparer de *Gymnopilus sapineus*, différencié par sa cuticule fibrilleuse-laineuse tendant à se crevasser.

Chapeau de 2 à 7 cm finement feutré au début, jaune orangé à jaune rougeâtre, non hygrophane.

Lames assez serrées, jaune pâle à jaune rougeâtre ou jaune rouillé, larges.

Stipe blanchâtre à jaune pâle au début puis jaune rougeâtre, privé de voile mais +/- fibrilleux.

Chair mince, jaune blanchâtre à jaune rougeâtre pâle.

Odeur non caractéristique - **Saveur** amère.

Sur bois dégradé de conifères et de feuillus.



Gymnopilus sapineus

Difficile à séparer de *Gymnopilus penetrans* sur le terrain, mais la présence de fines squamules apprimées sur le chapeau, le pied s'élargissant de bas en haut et les hyphes cuticulaires dépassant 10 µ de large sont des caractères déterminants.

Chapeau de 2 à 6 cm, hémisphérique à convexe étalé, velouté ou feutré puis se déchirant en fines squamules apprimées.

Lames largement adnées, larges, jaune crème puis jaune ocracé à jaune rougeâtre.

Stipe s'élargissant progressivement de bas en haut, flexible, plein, jaune pâle puis jaune rougeâtre ou brun rougeâtre.

Chair mince, jaunâtre - **Odeur** non caractéristique ou épicée - **Saveur** amère.

Habitat sur bois dégradé de conifères, plus rarement sur feuillus.

Sporée jaune ocracée.



Hypholoma marginatum

Hypholome lignicole mais non fasciculé, facilement reconnaissable sur le terrain à son pied fortement voilé-chiné de fibrilles blanches et à la marge piléique fibrillo-floconneuse.

Chapeau de 1 à 3 cm, hémisphérique à convexe, lisse, mat, viscidule, jaune ocre à fauve jaunâtre, parfois nuancé d'olivacé.

Marge ornée de restes du voile dans la jeunesse.

Lames serrées, blanchâtres puis brun pourpre à gris olivacé, larges, adnées.

Pied plein puis creux, coriace, cassant, blanchâtre à ocre jaunâtre, fortement voilé-chiné de fibrilles blanches sur fond gris brun.

Voile blanc, visible à la marge du chapeau des jeunes exemplaires et sur le pied sous formes de chinures.

Habitat en troupe sur bois dégradé.



Hypholoma radicosum

Chapeau convexe à plan-convexe, ocracé pâle à brun jaunâtre, recouvert d'un voile blanchâtre

Stipe radican, élancé, brun ocracé pâle, fibrilleux de blanc, prumineux au sommet, orné d'une zone annulaire fugace

chair blanchâtre à crème, brunissant dans le stipe, de saveur amère.

lames assez espacées, adnées, blanc crème à beige pâle puis brun violacé ;

Sur souches ou racines de conifères.

Compte-rendu : J. Debroux, N. Szyłowicz, F. Pierre.

Documentation : fiches SMD, ouvrage de M. Bon "Champignons de France et d'Europe occidentale", site internet MycoDB, et les rapports de sorties précédentes.

Les **photos** sont de C. Rougier.