


SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU DAUPHINÉ

EXPOSITION DE GRENOBLE

(24 et 25 Septembre 2016)



Malgré une sécheresse inhabituelle et inquiétante, près de 300 espèces de champignons et de nombreuses plantes et baies ont pu être exposées. Les mycologues de notre Société et des Sociétés amies ont dû rechercher les stations humides d'altitude (hauts marais – tourbières) et parcourir de nombreux kilomètres pour assurer la réussite de notre exposition.

300 visiteurs environ, donc 4 fois moins que l'année dernière... Les causes de cette défection sont diverses : peu de champignons dans les bois – changement du lieu de l'exposition – manque de publicité ... A analyser !

Soulignons au passage la qualité des locaux prêtés par la municipalité (espace – éclairage...) et la bonne participation des responsables et du personnel de la mairie.



Lac des Boîtes (C. Rougier)



Arnica montana (S. Chardon)



Lac du Poursollet (C. Rougier)

LISTE DES CHAMPIGNONS EXPOSÉS

(282 espèces)

Abortiporus biennis (Bull.) Singer
Albatrellus citrinus Ryman.
Amanita muscaria (L.) Lam.
Amanita phalloides (Vaill. rx Fr.) Link
Amanita porphyria Alb. & Schwein.
Amanita rubescens Pers.
Amanita umbrinolutea (Secr. ex Gillet) Bataille
Amanita virosa Bertill.
Antrodia serialis (Fr.) Donk
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.
Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.
Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
Boletus calopus Pers. [= **Caloboletus calopus** (Pers.) Vizzini]
Boletus edulis Bull.
Boletus erythropus Pers.
Boletus subtomentosus L. [= **Xerocomus subtomentosus** (L.) Quél.]
Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel [= **Bondarzewia montana** (Quél.) Singer]
Bovista plumbea Pers.
Calocera viscosa (Pers.) Fr.
Calocera furcata (Fr.) Fr.
Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc.
Cantharellus cibarius Fr.
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill
Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra
Chroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moser
Clavariadelphus truncatus Donk
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. [= **Clavulina cristata** (Holmsk.) J. Schröt.]
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt.
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar
Clitocybe clavipes (Pers.) P. Kumm. [= **Ampulloclitocybe clavipes** (Pers.) Redhead et al.]
Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm.
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.
Clitocybe vibecina (Fr.) Quél.
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.
Collybia acervata (Fr.) P. Kumm. [= **Connopus acervatus** (Fr.) K.W. Hugues et al.]
Collybia cirrhata (Schumach.) Quél.
Coltricia perennis (L.) Murrill
Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod
Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [= **Coprinus atramentarius** (Bull.) Fr.]
Cordyceps ophioglossoides (J.F. Gmel.) Fr. [= **Tolypocladium ophioglossoides**].
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden
Cortinarius anomalus (Fr.) Fr.
Cortinarius armillatus (Fr.) Fr.
Cortinarius bataillei (J. Favre ex M.M. Moser) Hoil.

Cortinarius bolaris (Pers;) Fr.
Cortinarius brunneus (Pers.) Fr.
Cortinarius callisteus (Fr.) Fr.
Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr.
Cortinarius caninus (Fr.) Fr.
Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. [= **Rozites caperatus** (Prs.) P. Karst.].
Cortinarius claroturmalis Rob. Henry
Cortinarius evernius (Fr.) Fr.
Cortinarius melleopallens (Fr.) Britzelm. [= **Cortinarius triformis** Fr.]
Cortinarius multiformis Fr.
Cortinarius paleaceus (Weinm.) Fr.
Cortinarius poecilopus Rob. Henry
Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr.
Cortinarius stillatitius Fr.
Cortinarius subferrugineus (Batsch) Fr.
Cortinarius subtortus (Pers.) Fr.
Cortinarius subvalidus Rob. Henry
Cortinarius traganus (Fr.) Fr.
Cortinarius triumphans Fr.
Cortinarius varius (Schaeff.) Fr.
Cortinarius venetus (Fr.) Fr.
Cortinarius violaceus (L.) Gray
Craterellus lutescens (Fr.) Fr. (= **Cantharellus lutescens** Fr.).
Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél. (= **Cantharellus tubaeformis** Fr.).
Cudonia circinans (Pers.) Fr.
Cyathus striatus (Huds.) Willd.
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod
Cystoderma amianthinum forme rugosoreticulatum (F. Lorinser) Bon
Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod
Cystoderma fallax A.H. Sm. & Singer
Daedalea quercina (L.) Pers.
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & de Not.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr.
Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid
Elaphomyces granulatus Fr.
Entoloma nitidum Quél. [= **Entocybe nitida** (Quél.) T.J. Baroni et al.]
Fomes fomentarius (L.) Fr.
Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui et al. (= **Piptoporus betulinus** (Bull.) P. Karst.
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
Geastrum fimbriatum Fr.
Geastrum quadrifidum DC. Ex Pers.
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.
Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki
Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill
Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.
Gomphus clavatus (Pers.) Fray

Guepinia helvelloides (DC.) Fr.
Gymnopus confluens (Pers.) Antonin, Halling & Noordel. [= **Collybia confluens** (Pers.) P. Kumm.]
Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill [= **Collybia dryophila** (Bull.) P. Kumm.]
Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonin & Noordel. [= **Micromphale perforans** (Hoffm.) Gray]
Gymnopus peronatus (Bolton) Gray [= **Collybia peronata** (Bolton) P. Kumm.]
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. (**cueillette du printemps**)
Gyromitra infula (Schaeff.) Quél.
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél.
Helvella lacunosa Afzel.
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Hydnellum peckii Banker
Hydnum repandum L.
Hydnum rufescens Schaeff.
Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. [= **Hypholoma sublateritium** (Fr.) Quél.]
Hypholoma marginatum J. Schröt.
Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange
Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul.
Hypomyces viridis P. Karst.
Imleria badia (Fr.) Vizzini [= **Xerocomus badius** (Fr.) E.-J. Gilbert]
Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm.
Inocybe geophylla variété lilacina (Peck) Gillet
Inocybe pudica Kühner
Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst.
Laccaria amethystina Cooke
Laccaria fraterna (Sacc.) Pegler.
Laccaria laccata (Scop.) Cooke.
Laccaria laccata variété pallidifolia (Peck) Peck
Laccaria proxima (Boud.) Pat.
Lactarius albocarneus Britzelm.
Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray
Lactarius aurantiofulvus J. Blum ex Bon
Lactarius badiosanguineus Kühner & Romagn.
Lactarius blennius (Fr.) Fr.
Lactarius camphoratus (Bull.) Fr.
Lactarius deterrimus Gröger
Lactarius glaucescens Crossl. [= **Lactifluus glaucescens** (Crossl.) Verbeken]
Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr.
Lactarius helvus (Fr.) Fr.
Lactarius lacunarum (Romagn.) J.E. Lange
Lactarius pallidus Pers.
Lactarius picinus Fr.
Lactarius repraesentaneus Britzelm.
Lactarius rufus (Scop.) Fr.

Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair
Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.
Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoﬀ
Lactarius theiogalus (Bull.) Gray
Lactarius torminosus (Schaeﬀ.) Gray
Lactarius trivialis (Fr.) Fr.
Lactarius uvidus (Fr.) Fr.
Lactarius vellereus (Fr.) Fr.
Lactarius vellereus variété hometii (Gillet) Boud.
Lactarius vietus (Fr.) Fr.
Lactarius violascens (J. Otto) Fr.
Lactarius volemus (Fr.) Fr.
Laetisporus sulphureus (Bull.) Murrill
Leccinum brunneogriseolum Lannoy & Estades
Leccinum scabrum (Bull.) Gray
Leccinum variicolor Watling
Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst.
Lenzites warnieri Durieu & Mont. [= **Cellulariella warnieri** (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva]
Leotia lubrica (Scop.) Pers.
Lepista gilva (Pers.) Roze [= **Paralepista gilva** (Pers.) Vizzini & Ercole]
Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini et al. [= **Lyophyllum connatum** (Schumach.) Singer]
Lycoperdon perlatum Pers.
Lycoperdon umbrinum Pers.
Macrolepiota procera (Scop.) Singer
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kottl. & Pouzar.
Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill
Morchella elata Fr. **(cueillette du printemps)**
Morchella esculenta (L.) Pers. **(cueillette du printemps)**
Morchella rotunda (Pers.) Boud. **(cueillette du printemps)**
Morchella vulgaris (Pers.) Gray **(cueillette du printemps)**
Mycena epipterygia (Scop.) Gray
Mycena galericulata (Scop.) Gray
Mycena galopus (Pers.) P. Kumm.
Mycena pura (Pers.) P. Kumm.
Mycena renati Qué. l.
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.
Neolentinus cyathiformis (Schaeﬀ.) Della maggiore & Trassinelli [= **Lentinellus degener** Kalchbr.].
Oudemansiella radicata (Relhan) Singer [= **Hymenopellis radicata** (Relhan) R.H. Petersen]
Panaeolus campanulatus (L.) Qué. l.
Paxillus atrotomentosus Batsch [= **Tapinella atrotomentosa** (Batsch) Sutara]
Paxillus involutus (Batsch) Fr.
Peniophora aurantiaca (Bres.) Höhn. & Litsch.
Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar [= **Atheliachaete sanguinea** (Fr.) Spirin & Zùitr.]
Pholiota alnicola (Fr.) Singer
Pholiota astragalina (Fr. Singer).
Pholiota flammans (Batsch.) P. Kumm.
Pholiota gummosa (Lasch) Singer
Pholiota lenta (Pers.) Singer
Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm.

Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél.
Pluteus cervinus (Schazff.) P. Kumm.
Polyporus arcularius Rostk.
Polyporus durus Jungh.
Polyporus melanopus (Pers.) Fr. [= **Picipes melanopus** (Pers.) Zmitr. & Kovalenko
Polyporus varius (Pers.) Fr. {= **Cerioporus varius** (Pers.) Zmitr. & Kovalenko]
Postia stiptica (Pers.) Jülich
Psathyrella gracilis (Fr.) Quél. [= **Psathyrella corrugis** (Pers.) Konrad & Maubl.]
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.
Pycnoporellus fulgens (FR.) Donk
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.
Ramaria abietina (Pers.) Quél. [= **Phaeoclavulina abietina** (Pers.) Giachini]
Ramaria botrytis (Pers.) Ricken
Ramaria flava (Schaeff.) Quél.
Ramaria ignicolor Corner
Ramaria largentii Marr & D.E. Stuntz
Ramaria pallida (Schaeff.) Ricken
Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer [= **Collybia maculata** (Alb. & Schwein.) P. Kumm.
Rhodocollybia proluxa (Fr.) Antonin & Noordel. [= **Collybia distorta** (Fr.) Quél.]
Russula acetolens Rauschert
Russula aeruginea Lindblad ex Fr.
Russula albonigra (Krombh.) Fr.
Russula alutacea (Fr.) Fr.
Russula anthracina Romagn.
Russula aquosa Leclair
Russula atrorubens Quél.
Russula cavipes Britzelm.
Russula cutedructa Cooke
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
Russula cyanoxantha forme pelteteau Singer
Russula emetica variété pseudolongipes Moënné-Locc. & Reumaux
Russula fellea (Fr.) Fr.
Russula firmula Jül. Schöff.
Russula foetens Pers.
Russula fuscorubroides Bon
Russula hydrophila Hornicek [= **Russula griseascens** (Bon & Gaugué) Marti]
Russula integra (L.) Fr.
Russula langei Bon
Russula laurocerasi Melzer [= **Russula grata** Britzelm.]
Russula lepida Fr. (= **Russula rosea** Pers.)
Russula longipes (Singer) Moënné-Locc. & Reumaux
Russula mustelina Fr.
Russula nigricans Fr.
Russula ochroleuca Fr.
Russula olivacea (Schaeff.) Fr..
Russula persicina Krombholz
Russula persicina variété intactior (Jul. Schöff.) Bon
Russula puellaris Fr
Russula pumila Rouzeau & Massart.

Russula queletii Fr.
Russula rhodopus Zvara
Russula subaffinis Bidaud & P.A. Moreau
Russula vesca Fr.
Russula vinosa Lindblad
Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn.
Russula violeipes variété citrina (Quél.) Sarnari (= **R. violeipes** d'après Index fungorum).
Russula viscida Kudrna
Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.
Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.
Schizophyllum commune Fr .
Scleroderma citrinum Pers.
Scutiger confluens (Alb. & Schwein.) Bondartsev & Singer
Scutiger ovinus (Schaeff.) Murrill
Spathularia flava Pers.
Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
Stereum subtomentosum Pouzar
Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.
Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd
Trametes versicolor (L.) Lloyd
Tremella foliacea Pers.
Tremella mesenterica Retz.
Trichoderma alutaceum Jaklitsch [= **Podostroma alutaceum** (Pers.) G.F. Atk.]
Tricholoma boudieri Barla
Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.
Tricholoma pseudonictitans Bon
Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.
Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin
Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quél.
Tricholoma sejunctum variété coniferarum Bon
Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm.
Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.
Tricholomopsis decora (Fr.) Singer
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer
Tylopilus felleus (Bull.) P. Karsten.
Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara [= **Xerocomus chrysenteron** (Bull.) Quél.]
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

COMMENTAIRES SUR QUELQUES ESPECES EXPOSÉES

Quelques espèces rares ou intéressantes



- . **Albatrellus citrinus** : Ce taxon devrait être rangé dans le genre Scutiger, mais ce transfert n'est pas validé. Créé en 2003 par Ryman (mycologue suédois), suite à des travaux basés sur des recoupements écologiques et une étude moléculaire, il remet en question la plupart des descriptions concernant certaines espèces du genre Scutiger (anciennement Albatrellus), notamment les espèces décrites sous le nom vernaculaire de « Polypores des brebis ».

Dans notre région, la confusion réside surtout entre 3 espèces de détermination très délicate et souvent confondues : Scutiger ovinus, subrubescens et citrinus.

Albatrellus citrinus, commun dans nos pessières, est caractérisé par un net jaunissement et sa taille ne dépasse guère 5 à 7 cm, alors que Scutiger subrubescens pousse sous les pins et que Scutiger ovinus, beaucoup plus rare peut atteindre 15 cm.

Bien que très recherché des mycophages, le 'Polypore des brebis' a causé une dizaine d'intoxications inexpliquées dans la région grenobloise, à Gap et en Savoie .(voir Bulletin de la SMF n° 90-1).



- . **Bondarzewia mesenterica** : Fructifications formées de plusieurs chapeaux issus d'un tronc commun. Cette espèce ressemble à Meripilus giganteus par son aspect général et par son hyménium poré, mais celle-ci a la particularité de noircir au froissement. Microscopiquement, Bondarzewia mesenterica est bien caractérisé par des spores presque rondes ornées de fortes verrues amyloïdes comme les Russules.



- . **Cordyceps ophioglossoides** : Ascomycète parasite d'*Elaphomyces granulatus*, Facile à reconnaître sur le terrain si l'on prend soin de récolter correctement les 2 champignons sachant que l'un est hypogé.
Il se différencie de *Cordyceps capitata* par sa tête allongée en forme de langue de serpent.



- . **Leccinum brunneogriseolum** : Très rare espèce signalée dans le Massif de Belledonne et décrite en 1991 par Alain Estades (mycologue grenoblois) dont l'holotype provient de la tourbière du Luitel. Reconnaisable à son chapeau feutré et à son pied brun grisâtre orné de squamules laineuses.



- . **Lenzites warnieri** : Rare Polypore à hyménium lamellé, thermophile poussant sur bois mort de divers feuillus. Il est reconnaissable à sa grande taille, à sa silhouette plane et à ses larges lames jaune saturé. Parfois confondu avec *Daedalea quercina* qui se différencie par des lames espacées, rameuses, labyrinthées et épaisses.



. **Phylloporus pelletieri** : Cette espèce assure le passage entre les Bolets et les Agaricales.

Elle est facilement reconnaissable à son revêtement subtomenteux réagissant en bleu vert aux vapeurs d'ammoniaque, et surtout à ses lames d'un beau jaune vif, alvéolées et anastomosées.

Parfois confondue avec Daedalea quercina qui se différencie par des lames espacées, rameuses, labyrinthées et épaisses.



. **Russula emetica variété pseudolongipes** : Espèce des pessières humides décrite en 2003 par Moëgne-Loccoz & Reumaux, intermédiaire macroscopiquement entre le type et Russula longipes. Microscopiquement, elle est bien caractérisée par ses dermatocystides très longues, étroites, dépourvues d'article terminal court et renflé et par des spores pourvues de grosses verrues obtuses.



. **Trichoderma alutaceum** : Très rare Pyrénomycète signalé en montagne, sur bois en décomposition. Les fructifications claviformes sont de couleur alutacé et sont finement ponctuées par les ostioles. Microscopiquement, cette espèce est facilement identifiable par la présence d'asques étroitement cylindriques et contenant 16 spores irrégulièrement globuleuses.

L'EXPOSITION BOTANIQUE

(présentation de Suzanne Chardon)

Cette année encore nous avons poursuivi et tenter d'améliorer la présentation d'espèces végétales afin d'illustrer leur lien avec les champignons.

Quelques exemples de symbiose avec les champignons :

- Sous sapins



Lactarius salmonicolor



Lactarius scrobiculatus

- Sous épicéas



Lactarius deterrimus



Russula queletii

- Sous mélèzes



Suillus grevillei



Lactarius porninsis

- Sous pins sylvestres



Tricholoma terreum




Lactarius sanguifluus

- **Sous cèdres**



Geopora sumneriana

- **Sur faines de hêtres**



Xylaria carpophila

- **Sur feuilles d'érables**



Rhytisma acerinum

- **Sur ombellifères de montagne**



Pleurotus nebrodensis sur Laserpitium siler

- **Sous hêtres**



Russula faginea



Lactarius pallidus

- **Sous chênes**



Boletus aereus



Tuber melanosporum

- **Sous aulnes**



Paxillus rubicundulus



Gyrodon lividus

Les baies et les fruits :

La grande salle mise à notre disposition nous a permis de mettre en valeur baies et fruits divers, comestibles ou toxiques :

- les sorbiers (Sorbier blanc, de Mougeot, des oiseleurs, torminal) et leurs sorbes. .
- l'aubépine et ses cenelles.
- le prunellier et ses prunelles.
- le sureau yèble
- le nerprun purgatif
- le troène
- le cornouiller sanguin avec ses splendides couleurs automnales.

Les herbacées :

Les herbacées étaient également représentées :

- l'éryngium champêtre avec sa pleurote (Pleurotus eryngii)
- les ombellifères de montagne (Laserpitium siler et Laserpitium latifolium)
- de nombreuses fleurs d'automne pour agrémenter notre expo de leur couleur et leur beauté.

LES CHAMPIGNONS EXPOSÉS



Albatrellus citrinus



Amanita muscaria



Amanita phalloides



Amanita porphyria



Amanita rubescens



Amanita umbrinolutea



Amanita virosa



Antrodia serialis



Auricularia auricula - judae



Auricularia mesenterica



Bjerkandera adusta



Boletus calopus



Boletus edulis



Boletus erythropus



Boletus subtomentosus



Bondarzewia mesenterica
(photo A. Tartarat)



Bovista plumbea



Calocera viscosa



Calocera furcata



Cantharellus amethysteus



Cantharellus cibarius



Cerrena unicolor



Chalciporus piperatus



Chlorociboria aeruginascens



Chroogomphus helveticus



Clavariadelphus truncatus



Clavulina coralloides



Clavulina rugosa



Climacocystis borealis



Clitocybe clavipes



Clitocybe gibba



Clitocybe odora



Clitopilus prunulus



Collybia cirrhata



Coltricia perennis



Conocybe tenera



Coprinopsis atramentaria



Cordyceps ophioglossoides



Coriopsis gallica
(photo J. Debroux)



Cortinarius armillatus



Cortinarius bolaris



Cortinarius brunneus



Cortinarius callisteus
(photo A. Tartarat)



Cortinarius camphoratus



Cortinarius caninus



Cortinarius caperatus
(= *Rozites caperata*)



Cortinarius claroturmalis
(photo A. Tartarat)



Cortinarius evernius



Cortinarius multiformis



Cortinarius paleaceus



Cortinarius poecilopus
(photo A. Bidaud)



Cortinarius sanguineus



Cortinarius stilatitius



Cortinarius subtortus



Cortinarius subvalidus
(photo A. Tartarat)



Cortinarius traganus



Cortinarius triumphans



Cortinarius varius



Cortinarius venetus



Cortinarius violaceus



Craterellus lutescens



Craterellus tubaeformis



Cudonia circinans



Cyathus striatus



Cystoderma amianthinum



Cystoderma carcharias



Cystoderma fallax



Daedalea quercina



Daedaleopsis confragosa



Daldinia concentrica



Diatrype disciformis
(photo S. Chardon)



Ditiola peziziformis



Elaphomyces granulatus



Entoloma nitidum



Fomes fomentaria



Fomitopsis betulina



Fomitopsis pinicola



Ganoderma applanatum
(photo J. Debroux)



Ganoderma lucidum



Geastrum fimbriatum



Geastrum quadrifidum



Gloeophyllum abietinum



Gloeophyllum odoratum



Gloeophyllum trabeum



Gomphidius glutinosus



Gomphus clavatus



Guepinia helvelloides



Gymnopus confluens



Gymnopus dryophilus



Gymnopus perforans



Gymnopus peronatus



Gyromitra esculenta



Gyromitra infusa



Hebeloma mesophaeum



Helvella lacunosa



Heterobasidion annosum



Hydrellum peckii



Hydnum repandum



Hydnum rufescens



Hygrocybe coccineocrenata



Hygrophoropsis aurantiaca



Hypholoma capnoides



Hypholoma elongatum



Hypholoma fasciculare



Hypholoma lateritium



Hypholoma marginatum



Hypomyces lateritius
(parasite de *Lactarius salmonicolor*)



Inocybe geophylla



Inocybe geophylla variété lilacina



Inocybe pudica



Inonotus hispidus



Ischnoderma benzoinum



Laccaria amethystina



Laccaria fraterna



Laccaria laccata



Laccaria laccata variété pallidifolia



Laccaria proxima
(photo S. Chardon)



Lactarius albocarneus



Lactarius aurantiacus



Lactarius aurantiofulvus



Lactarius badiosanguineus



Lactarius blennius



Lactarius camphoratus



Lactarius deterrimus



Lactarius glycosmus



Lactarius helvus



Lactarius lacunarum



Lactarius pallidus



Lactarius picinus



Lactarius repraesentaneus



Lactarius rufus



Lactarius salmonicolor



Lactarius scrobiculatus



Lactarius sphagneti



Lactarius theiogalus



Lactarius torminosus



Lactarius trivialis



Lactarius uvidus



Lactarius vellereus



Lactarius vellereus variété hometii



Lactarius vietus



Lactarius violascens



Lactarius volemus



Laetiporus sulphureus



Leccinum brunneogriseolum



Leccinum scabrum



Leccinum variicolor



Lentinellus cochleatus



Lenzites warnieri



Leotia lubrica



Lepista gilva
(photo Y. Deneyer)



Lycoperdon perlatum



Lyophyllum connatum



Lycoperdon umbrinum



Macrolepiota procera



Megacollybia platyphylla



Melanoleuca melaleuca



Morchella elata



Morchella esculenta



Morchella rotunda



Morchella vulgaris



Mycena epipterygia



Mycena galericulata



Mycena galopus



Mycena pura



Mycena renati



Nectria cinnabarina



Oudemansiella radicata



Panaeolus campanulatus



Paxillus atrotomentosus



Paxillus involutus



Peniophora aurantiaca



Phanerochaete sanguinea



Pholiota alnicola



Pholiota astragalina




Pholiota flammans



Pholiota gummosa



Pholiota lenta



Pholiota squarrosa



Phylloporus pelletieri



Pluteus cervinus



Polyporus arcularius



Polyporus durus



Polyporus melanopus



Polyporus varius



Postia stiptica



Psathyrella gracilis



Pseudohydnum gelatinosum



Pycnoporellus fulgens



Pycnoporus cinnabarinus



Ramaria abietina



Ramaria botrytis



Ramaria flava



Ramaria ignicolor



Ramaria larentii



Ramaria pallida



Rhodocollybia maculata



Rhodocollybia proluxa



Russula acetolens



Russula aeruginea



Russula albonigra



Russula alutacea
(Photo A. Bidaud)



Russula anthracina



Russula aquosa



Russula atrorubens



Russula cavipes



Russula cutefracta



Russula cyanoxantha



Russula cyanoxantha fo. peltereaui



Russula emetica var. pseudolongipes



Russula fellea



Russula foetens



Russula fuscorubroides



Russula hydrophila



Russula integra



Russula langei



Russula laurocerasi (= *R. grata*)
(Photo J. Debroux)



Russula lepida



Russula longipes



Russula mustelina



Russula nigricans



Russula ochroleuca



Russula olivacea



Russula persicina



Russula puellaris



Russula queletii



Russula rhodopus



Russula subaffinis



Russula vesca



Russula vinosa



Russula vinosobrunnea
(planche P. Moëgne-Loccoz)



Russula violeipes var. citrina



Russula viscida



Russula xerampelina



Sarcodon imbricatus



Schizophyllum commune



Scleroderma citrinum



Scutiger confluens



Scutiger ovinus
(Photo M. Gannaz)



Spathularia flava



Steccherinum ochraceum



Stereum hirsutum



Stereum subtomentosum



Stropharia aeruginosa



Trametes gibbosa



Trametes hirsuta



Trametes versicolor



Tremella foliacea



Tremella mesenterica



Trichoderma alutaceum



Tricholoma equestre
(Photo A. Tartarat)



Tricholoma pseudonictitans



Tricholoma saponaceum



Tricholoma sciodes



Tricholoma sejunctum var. coniferarum



Tricholoma virgatum



Tricholomopsis decora



Tricholomopsis rutilans



Tylopilus felleus



Xerocomus chrysenteron



Xylaria polymorpha