

Seiglières et Arselle

Encadrement assuré par : Alessandro Cresti et André Tartarat

Les participants : André Bernard, Pablo Cabrero, Jean Cavret, Suzanne Chardon, Alessandro Cresti, Daniel Dico, Rosalie Dico, Jean Debroux, Michèle Debroux, Robert Garcin, Jean-Baptiste Keck, Marcela Maftoul, Cécile Martinez, Robin Michoud, Charles Rougier, Évelyne Tardy, André Tartarat, Floriane Trefouel, Claudine Vicherd

Merci à André, Robert et Charles pour la détermination et à Claudine pour avoir pris note des noms des espèces trouvées.



Chrysomphalina chrysophylla
Charles Rougier



Cortinarius cinnamomeus
Charles Rougier



Neoboletus erythropus
Charles Rougier



Le repas à la salle hors sac de l'Arselle



Robert et André



Un toast au bonheur !



Liste de champignons trouvés

Photos de Charles Rougier et descriptions prises du fichier mycologique de la SMD38



Boletus edulis Bull. nom. sanct.

Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre. Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.

Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide.

Odeur : Fongique, très agréable.



Boletus pinophilus Pilát & Dermek

Chapeau brun-rouge acajou - Pores blancs au début. Stipe blanc puis ocre-roux, avec un réseau concolore.

Habitat : Conifères (pins, sapins, épicéas), rare sous feuillus.

Odeur : Agréable, d'écale de noix, un peu iodée.

Boletus radicans Pers.

Espèce robuste à chapeau blanchâtre puis gris beige. Pores jaunes - Stipe réticulé de jaune - Saveur amère.

Habitat : Sous feuillus (chênes, hêtres ...), en terrain calcaire.

Odeur : Acidulée puis désagréable en vieillissant.



Neoboletus erythropus (Pers.) C.Hahn

Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.

Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne.

Odeur : +/- fruitée. Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté.



Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini nom. sanct.

Stipe rouge, jaune en haut - Réseau blanc, très visible. Chair bleuisant légèrement à la coupe, très amère.

Habitat : Sous conifères et feuillus, en montagne.

Odeur : Un peu acidulée, de vinaigre.



Imleria badia (Fr.) Vizzini nom. sanct.

Chapeau bai à marron, de couleur uniforme. Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.

Habitat : Sous conifères et feuillus.

Odeur : Faible, non caractéristique.



Xerocomus chrysenteron

Chapeau brun clair, rougeâtre dans les blessures. Pores amples, anguleux - Stipe rayé de rouge carminé.

Habitat : Sous feuillus et résineux.

Odeur : De scléroderme.



Chroogomphus tatrensis (Singer) M.M. Moser

Chapeau mamelonné, crème orangé à jaune abricot. Stipe concolore - Lames épaisses, très décurrentes.

Habitat : Sous pins, surtout épicéa.

Odeur : Non caractéristique.



Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire nom. sanct.

Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore. Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries.

Odeur : Faible, non caractéristique.



Paxillus involutus (Batsch) Fr. nom. sanct.

Chapeau roux ochracé, à marge involutée. Lames très serrées, étroites, facilement détachables.

Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs.

Odeur : Faible, de scléroderme.



Cantharellus amethysteus (Qué.) Qué.

Chapeau jaune, moucheté de petites écailles violettes. Plis décurrents - Stipe jaunissant fortement au toucher.

Habitat : Feuillus (hêtres surtout) et conifères de montagne.

Odeur : Agréable de mirabelle.



Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst.

Fructifications dimidiées à surface brun-rouge. L'un des polypores les plus communs.

Habitat : Saprophyte des conifères, parfois des feuillus.

Odeur : Acide, forte, évoquant l'odeur des poulaillers.



Coltricia perennis (L.) Murrill

Chapeau plan à déprimé, cannelle, étroitement zoné. Stipe brun foncé - Pores arrondis, décurrents, 2-4 /mm.

Habitat : Dans les forêts de feuillus et de conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Polyporus tuberaster (Jacq.) Fr.

Chapeau inférieur à 8 cm de diamètre, squamuleux.

Tubes longuement décurrents - Pores oblongs.

Habitat : Sur bois mort de feuillus, surtout chênes et hêtres.

Odeur : Agréable, fongique.



Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar

Chapeau épais, dimidié, spongieux, blanc puis ocre. Pores dédaléens - Trame à 2 couches - Pas de stipe.

Habitat : Souches d'épicéas ou de sapins.

Odeur : Agréable, suave.



Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.

Fructifications sessiles de couleur brun-rouge. Surface strigieuse ou feutrée, zonée.

Habitat : Sur bois mort de conifères exposé à l'air.

Odeur : Non caractéristique.



Calocera furcata (Fr.) Fr. nom. sanct.

Fructifications fourchues aux extrémités. Proche de Calocera cornea mais spores différentes.

Habitat : Sur bois mort de conifères.

Odeur : Inodore.



Lycoperdon perlatum Pers. nom. sanct.

Fructifications blanches recouvertes d'aiguillons. Gléba blanche puis olive - Stipe conique.

Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles.

Odeur : Non caractéristique.



Amanita muscaria (L.) Lam. nom. sanct.

Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs. Anneau membraneux, juvonnant - Lames blanches.

Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.

Odeur : Non caractéristique.



Amanita rubescens (Pers.) Gray nom. sanct.

Rougisement de la chair - Anneau ample et strié. Volve friable - Stipe napiforme.

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Non caractéristique.



Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar nom. sanct.

Chapeau rayé-vergeté - Lames larges et espacées. Présence de rhizoïdes à la base du stipe.

Habitat : Surtout sur souches ou racines de feuillus.

Odeur : Terreuse à herbacée.



Russula cavipes Britzelm.

Chapeau bigarré, violet nuancé d'olive - Lames crème, réagissant en rose avec NH3 - Saveur subdouce.

Habitat : Surtout sous épicéas.

Odeur : Safranée ou de pommes.



Russula integra (L.) Fr.

Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns. Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.

Habitat : Dans les pessières de montagne.

Odeur : Très faible d'iode à la coupe.



Russula mustelina Fr.

Espèce compacte - Chapeau sec, brun noisette. Saveur douce - Lames crème - Chair épaisse.

Habitat : Dans les pessières à myrtilles, en montagne.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Russula rhodopus Zvara

Chapeau rouge vif - Saveur subdouce à un peu âcre. Lames blanches puis crème - Stipe marbré de rose.

Habitat : Dans les pessières humides et siliceuses.

Odeur : Faible, un peu fruitée.

Russula turci Bres.

Chapeau violet à centre noirâtre (aspect cocardé). Stipe blanc - Lames jaunes - Saveur douce.

Habitat : Sous conifères, surtout sous les pins, en terrain acide.

Odeur : D'iodoforme à la base du pied.



Tricholoma pseudonictitans Bon

Chapeau brun fauve, à marge non cannelée. Lames crème - Chair du pied jaune au grattage.

Habitat : Sous conifères, rarement sous feuillus.

Odeur : Subnulle à légèrement farineuse.



Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. nom. sanct.

Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante. Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.

Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne.

Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide.



Laccaria amethystina (Huds.) Cooke

Chapeau hygrophane, violet foncé puis pâlisant. Lames très espacées, larges, épaisses, violettes.

Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères.

Odeur : Légèrement fruitée.



Laccaria laccata (Scop.) Cooke nom. sanct.

Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisse. Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.

Habitat : Dans les bois, au bord des chemins.

Odeur : Insignifiante.



Cortinarius cinnamomeus (L.) Gray nom. sanct.

Chapeau cannelle, subsquamuleux, à mamelon obtus. Lames fauve orangé - Voile jaune à brun-rouge.

Habitat : En plaine ou en montagne, dans les hauts marais.

Odeur : Faible de radis ou d'iode.



Cortinarius violaceus (L.) Gray nom. sanct.

Chapeau fortement velouté, bleu-violet - Lames violettes. Stipe concolore au chapeau - Saveur douce.

Habitat : Sous feuillus, peut être sous conifères.

Odeur : De cuir de Russie ou de bois de cèdre.



Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill nom. sanct.

Chapeau feutré, jaune orangé - Cortine persistante. Lames jaunâtres et saveur amère.

Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus.

Odeur : Légèrement herbacée.



Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.

Chapeau gris brunâtre, sans nuances olivâtres. Lames à arête concolore - Hyphes non bouclées.

Habitat : Sur souches et bois mort de feuillus et de conifères.

Odeur : Nettement raphanoïde.



Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kummer nom. sanct.

Chapeau de forme variable, blanchâtre, cassant. Lames très décurrentes, blanches puis roses.

Habitat : Sous feuillus et résineux, dans les clairières.

Odeur : Fortement farineuse.



Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer nom. sanct.

Chapeau en entonnoir, hygrophane, marron à gris. Lames décurrentes, falciformes, pentues, brun clair.

Habitat : Dans les endroits herbeux, en bordure des chemins.

Odeur : Cyanique.



Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck

Grande espèce - Chapeau blanc, jaunissant.

Lames blanc rosâtre à rose - Anneau membraneux.

Habitat : Forêts de feuillus et de conifères.

Odeur : Forte odeur anisée.



Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. nom. sanct.

En touffes sur les souches ou le bois mort. Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.

Odeur : De polypore.



Kuehneromyces mutabilis (Scop. : Fr.) Singer & A.H. Sm.

Chapeau très hygrophane, brun foncé à miel. Pied orné d'une armille fibrillo-squamuleuse.

Habitat : Surtout sur souches de hêtres.

Odeur : Non caractéristique.



***Chrysomphalina chrysophylla* (Fr.) Clémenton nom. sanct.**

Chapeau brun-beige, finement méchuleux, ombiliqué. Lames espacées, jaune orangé - Stipe concolore.

Habitat : En montagne, sur bois pourrissant de conifères.

Odeur : Non caractéristique.