

| Genre | Espèce | var. fo. | Autorités | Synonyme | Nom français | N° Fiche |
|-------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Abortiporus | biennis | | (Bull.) Singer | Heteroporus biennis | Polypore bisannuel | 1 |
| Agaricus | altipes | | (F.H. Møller) F.H. | Agaricus aestivalis | Agaric d'été | 2 |
| Agaricus | annae | | Pilát | Agaricus silvaticus var. pall | Agaric dédié à Anna | 3 |
| Agaricus | arrillagarum | | L.A. Parra et al. | | Agaric d'Arrillaga | 4 |
| Agaricus | arvensis | | Schaeff. | Agaricus fissuratus | Agaric des jachères | 5 |
| Agaricus | augustus | | Fr. | Agaricus augustus var. per | Agaric auguste | 6 |
| Agaricus | bellanniae | | Guinb., Kerrigan & M. Kuo | | Agaric dédié à Annie Guinberteau | 7 |
| Agaricus | benesii | | (Pilát) | Agaricus squamuliferus | Agaric squamuleux | 8 |
| Agaricus | bernardii | | (Quél.) Sacc. | Agaricus maleolens | Agaric des prés salés | 9 |
| Agaricus | bisporus | | (J.E. Lange) Imb | Agaricus cookeanus - Agar | Champignon dit "De Paris" | 10 |
| Agaricus | bisporus | var. avellaneus | (J.E. Lange ex) S | Agaricus hortensis | Variété de couleur noisette | 11 |
| Agaricus | bitorquis | | (Quél.) Sacc. | Agaricus edulis | Agaric des trottoirs | 12 |
| Agaricus | bohusii | | Bon | Agaricus elvensis | Agaric de Bohus | 13 |
| Agaricus | boisseletii | | Heinem. | | Agaric de Boisselet | 14 |
| Agaricus | bresadolanus | | Bohus | Agaricus romagnesii | Agaric radicant | 15 |
| Agaricus | brunneolus | | J.E. Lange | Agaricus porphyrhizon - Ag | Agaric porphyre | 16 |
| Agaricus | campestris | | L. | Psalliota campestris | Rosé des prés | 17 |
| Agaricus | campestris | var. equestris | (F.H. Møller) Pilat | | Agaric des chevaliers | 18 |
| Agaricus | campestris | var. fuscopilosellus | F.H. Møller | | Agaric à mèches sombres | 19 |
| Agaricus | campestris | var. squamulosus | (Rea) Pilat | | Variété écaillée du rosé des prés | 20 |
| Agaricus | cappellianus | | Hlaváček | Agaricus vaporarius | Agaric de Cappelli | 21 |
| Agaricus | comtulus | | Fr. | | Agaric élégant | 22 |
| Agaricus | coniferarum | | Guinb. & Callac | | Agaric des conifères | 23 |
| Agaricus | crocodilinus | | Murril. | Agaricus macrosporus - Ag | Agaric à grandes spores | 24 |
| Agaricus | cupreobrunneus | | (F.H. Møller) Pilat | | Agaric brun cuivré | 25 |
| Agaricus | cupreobrunneus | var. fuscopilosellus | F.H. Møller | | Agaric à mèches sombres | 26 |
| Agaricus | depauperatus | | (F.H. Møller) Pilat | Agaricus deylii | Agaric loqueteux | 3712 |
| Agaricus | dulcidulus | | Schulzer | | Agaric douceâtre | 27 |
| Agaricus | freirei | | Blanco-Dios | | Agaric de Freire | 29 |
| Agaricus | gennadii | | (Chatin & Boud.) P.D. Orton | | Agaric de Gennady | 30 |
| Agaricus | impudicus | | (Rea) Pilat | Agaricus variegans - Agaric | Agaric impudique | 31 |
| Agaricus | langei | | (F.H. Møller) F.H. | Agaricus mediofuscus | Agaric de Lange | 32 |
| Agaricus | lanipes | | (F.H. Møller & Jul. Schäff.) Hlaváček | | Agaric à pied laineux | 33 |
| Agaricus | litoralis | | (Wakef. & A. Pez | Agaricus spissicaulis - Agar | Agaric à pied épais | 34 |
| Agaricus | luteomaculatus | | (F.H. Møller) F.H. Møller | | Agaric maculé de jaune | 35 |
| Agaricus | lutosus | | F.H. Møller | | Agaric boueux | 36 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------|
| Agaricus | macrocarpus | | (F.H. Møller) F.H. | Psalliota macrocarpa | Agaric macrocarpe | 37 |
| Agaricus | menieri | | Bon | | Agaric des sables | 38 |
| Agaricus | moelleri | | Wasser | Agaricus praeclaresquamo | Agaric pintade | 39 |
| Agaricus | osecanus | | Pilat | Agaricus nivescens | Agaric boule de neige | 40 |
| Agaricus | parvitigrinus | | Guinb. & Callac | | Agaric tigré | 41 |
| Agaricus | phaeolepidotus | | (F.H. Møller) F.H. Møller | | Agaric à écailles sombres | 42 |
| Agaricus | pilatianus | | (Bohus) Bohus | | Agaric de Pilat | 43 |
| Agaricus | porphyrocephalus | | F.H. Møller | Agaric lividonitidus | Agaric à chapeau pourpre | 44 |
| Agaricus | pseudoprattensis | | (Bohus) Bohus | | Faux Agaric des prés | 45 |
| Agaricus | semotus | | Fr. | Agaricus purpurellus | Agaric à chapeau lilacin | 46 |
| Agaricus | subfloccosus | | (J.E. Lange) Hlaváček | | Agaric squamuleux | 47 |
| Agaricus | subperonatus | | (J.E. Lange) Singer | | Agaric guêtré | 48 |
| Agaricus | sylvaticus | | Schaeff. | Agaricus haemorrhoidarius | Agaric des forêts | 49 |
| Agaricus | sylvicola | | (Vittad.) Peck | Agaricus abruptibulbus - A | Agaric sylvicole | 50 |
| Agaricus | xanthodermus | | Genev. | Agaricus pearsonianus | Agaric jaunissant | 51 |
| Agaricus | xanthodermus | var. griseus | (A. Pearson) Bon & Cappelli | | Variété grise de Agaricus xanthodermus | 52 |
| Agaricus | xanthodermus | var. lepiotoides | Maire | | Variété à chapeau écaillé | 53 |
| Agaricus | xanthodermus | var. meleagrioides | (A. Pearson) Bon & Cappelli | | Variété à chapeau méchuleux | 54 |
| Agrocybe | arvalis | | (Fr.) R. Heim & F | Agrocybe tuberosa | Agrocybe tubéreux | 55 |
| Agrocybe | brunneola | | (Fr.) Bon | | Agrocybe brun | 56 |
| Agrocybe | dura | | (Bolton) Singer | Agrocybe molesta | Agrocybe dur | 57 |
| Agrocybe | dura | fo. cutefracta | (J.E. Lange) | Agrocybe dura var. cutefra | Variété à chapeau fragmenté | 58 |
| Agrocybe | dura | var. xanthophylla | (Bres.) P.D. Orton | | Variété à lames jaunes | 59 |
| Agrocybe | elatella | | (P. Karst.) Veste | Agrocybe paludosa | Agrocybe des marais | 60 |
| Agrocybe | firma | | (Peck) Singer | | Agrocybe velouté | 61 |
| Agrocybe | pediades | | (Fr.) Fayod | Agrocybe arenicola, splenc | Agrocybe des pelouses | 62 |
| Agrocybe | pediades | var. bispora | (A.N. Petrov) E.F. Malysheva & kiyashko | | Variété à basides bisporiques | 63 |
| Agrocybe | praecox | | (Pers.) Fayod | Agrocybe sphaleromorpha | Agrocybe précoce | 64 |
| Agrocybe | praecox | var. cutefracta | (J.E. Lange) Singer | | Variété à chapeau craquelé | 65 |
| Agrocybe | putaminum | | (Maire) Singer | | Agrocybe des noyaux | 66 |
| Agrocybe | rivulosa | | Nauta | | Agrocybe rivuleux | 67 |
| Agrocybe | vervacti | | (Fr.) Singer | | Agrocybe des jachères | 68 |
| Agrocybe | xanthocystis | | Bon & Jamoni | | Agrocybe aux cystides jaunes | 69 |
| Albatrellus | citrinus | | Ryman | | Polypore citrin | 70 |
| Albatrellus | confluens | | (Alb. & Schwein | Scutiger confluens - Polyp | Polypore confluent | 3335 |
| Albatrellus | ovinus | | (Schaeff.) Kotl. & | Scutiger ovinus - Polyporus | Polypore des brebis | 3337 |
| Albatrellus | subrubescens | | (Murrill) Pouzar | Scutiger subrubescens - Po | Polypore rougissant | 3339 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|------|
| Albomagister | alesandrii | | P.A. Moreau et al. | Tricholome d'Alesandro | 71 | |
| Alessiopus | ichnusanus | | (Alessio, Galli & Xerocomus ichnusanus | Bolet de Sardaigne | 72 | |
| Aleuria | aurantia | | (Per.) Fuckel | Peziza aurantia | Pézize orangée | 73 |
| Aleuria | splendens | | (Quél.) J. Breitenb. & F. Kränz. ex Bon & Co | Pézize splendide | 74 | |
| Aleurodiscus | amorphus | | (Pers.) J. Schröt. | Aleurodiscus difforme | 75 | |
| Aleurodiscus | disciformis | | (DC.) Pat. | Aleurocystidiellum anellari | Aleurodiscus en forme de disque | 76 |
| Alnicola | alnetorum | | (Maire) Romagn | Naucoria alnetorum | Alnicole des aulnaies | 77 |
| Alnicola | bohemica | var. borealis | (F.H. Møller) P.A. Moreau & P. Roux | Variété boréale de Alnicola bohemica | 81 | |
| Alnicola | citrinella | | P.A. Moreau & A | Alnicola melinoides - Nauc | Alnicole jaune ochracé | 82 |
| Alnicola | citrinella | fo. curtipes | A. de Haan | | Forme à pied court de Alnicola citrinella | 83 |
| Alnicola | luteolofibrillosa | | Kühner | | Alnicole à voile jaune | 87 |
| Alnicola | macrospora | | J. Favre | Alnicola badiolateritia | Alnicole à grandes spores | 88 |
| Alnicola | salabertii | | P.A. Moreau & Guy Garcia | | Alnicole de Salabert | 90 |
| Alnicola | umbrina | | (Maire) Kühner | Tubaria umbrina - Naucori | Alnicole brun d'ombre | 93 |
| Amanita | argentea | | Huijsman | Amanita vaginata var. arge | Amanite à chapeau gris argenté | 94 |
| Amanita | asteropus | | Sabo ex Romagn. | | Amanite à pied étoilé | 95 |
| Amanita | avellanea | | (Traverso) Neville & Poumarat | | Amanite brun noisette | 96 |
| Amanita | badia | | (Schaeff.) Bon & Contu | | Amanite à chapeau bai | 97 |
| Amanita | battarrae | | (Boud.) Bon | | Amanite de Battarra | 98 |
| Amanita | beckeri | | Huijsman | Amanitopsis beckeri | Amanite de Becker | 3713 |
| Amanita | betulae | | Neville & Poumarat | | Amanite du bouleau | 99 |
| Amanita | boudieri | | Barla | | Amanite de Boudier | 100 |
| Amanita | brunneofulginea | | Zhu L. Yang | Amanita ochraceomaculat | Amanite maculée d'ocre | 137 |
| Amanita | caesarea | | (Scop.) Pers. | | Amanite des Césars (Oronge) | 101 |
| Amanita | ceciliae | | (Berk. & Broome | Amanita inaurata | Amanite impériale | 102 |
| Amanita | citrina | | (Schaeff.) Pers. | | Amanite citrine | 103 |
| Amanita | citrina | var. alba | (Pers.) Quél. & Bataille | | Variété blanche de Amanita citrina | 104 |
| Amanita | codinae | | (Maire) Bertault | Amanita vittadinii var. cod | Varété brunissante de Amanita vittadinii | 170 |
| Amanita | coryli | | Neville & Poumarat | | Amanite du noisetier | 106 |
| Amanita | coryli | fo. albida | Neville, Poumarat & M. Rovira | | Forme blanche de Amanita coryli | 107 |
| Amanita | crocea | | (Quél.) Singer | Amanita vaginata var. croc | Amanite safran | 108 |
| Amanita | crocea | fo. alba | P. Laurent | | Forme blanche de l'Amanite safran | 109 |
| Amanita | crocea | var. subnudipes | Romagn. | | Variété à pied lisse de l'Amanite safran | 110 |
| Amanita | dryophila | | Consiglio & Contu | | Amanite des chênes | 111 |
| Amanita | dunensis | | Bon & Andary | | Amanite des dunes | 112 |
| Amanita | echinocephala | | (Vittad.) Quél. | Amanita solitaria | Amanite épineuse | 113 |
| Amanita | echinocephala | var. subbellei | Neville & Poumarat Traverso | | Sosie de Amanita beillei | 114 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|------|
| Amanita | eliae | | Quél. | | Amanite d'Elia Fries | 115 |
| Amanita | eliae | var. griseovelata | Bertault ex Neville & Poumarat | | Variété de Amanita eliae à volve grise | 116 |
| Amanita | excelsa | fo. alba | (Fr.) Neville & Poumarat | | Forme blanche de l'Amanite élevée | 3665 |
| Amanita | excelsa | var. excelsa | (Fr.) Bertillon | Amanita excelsa | Amanite élevée | 117 |
| Amanita | excelsa | var. spissa | (Fr.) Neville & Poumarat | Amanita spissa | Amanite épaisse | 118 |
| Amanita | excelsa | var. valida | (Bertill.) Wasser | Amanita valida | Amanite à taches grises | 3859 |
| Amanita | franchetii | | (Boud.) Fayod | | Amanite à voile jaune | 119 |
| Amanita | friabilis | | (P. Karst.) Bas | Amanita pseudofriabilis | Amanite des aulnes | 120 |
| Amanita | fulva | | (Schaeff.) Fr. | Amanita vaginata var. fulva | Amanite fauve | 121 |
| Amanita | fulvoides | | Neville & Poumarat | | Sosie de Amanita fulva | 122 |
| Amanita | fusco-olivacea | | (Kühner ex Contu) Romagn. | | Amanite à chapeau brun olivacé | 123 |
| Amanita | gemmata | | (Fr.) Bertill. | Amanita jonquillea | Amanite jonquille | 127 |
| Amanita | gioiosa | | S. Curreli | | Amanite joyeuse | 124 |
| Amanita | gracilior | | S. Curreli | | Amanite gracile | 125 |
| Amanita | heterochroma | | S. Curreli | | Amanite de l'eucalyptus | 126 |
| Amanita | intermedia | | (Neville, Poumarat) | Amanita citrina var. intermedia | Amanite intermédiaire | 105 |
| Amanita | lividopallescens | | (Gillet) Bigeard & Bon | Amanita lividopallescens var. livida | Amanite livide | 128 |
| Amanita | mairei | | Foley | | Amanite de Maire | 129 |
| Amanita | muscaria | | (L.) Lam. | | Amanite tue-mouches | 130 |
| Amanita | muscaria | fo. flavivolvata | (Singer) Neville & Poumarat | | Forme à voile jaune de Amanita muscaria | 131 |
| Amanita | muscaria | var. alba | (Peck) Peck | | Variété blanche de Amanita muscaria | 132 |
| Amanita | muscaria | var. aureola | (Kalchbr.) Quél. | | Variété jaune orangé de l'Amanite tue-mouches | 133 |
| Amanita | muscaria | var. formosa, fo. europaea | Neville, Poumarat & B. Clément | | Forme européenne de l'Amanite tue-mouches | 134 |
| Amanita | muscaria | var. fulgineoverrucosa | Neville, Poumarat & Clément | | Variété à voile fuligineux de l'Amanite tue-mouches | 135 |
| Amanita | oblongospora | | Contu | | Amanite à grandes spores | 136 |
| Amanita | ovoidea | | (Bull.) Link | | Amanite ovoïde | 138 |
| Amanita | pachyvolvata | | (Bon) Krieglst. | | Amanite à volve épaisse | 139 |
| Amanita | pantherina | | (DC.) Krombh. | | Amanite panthère | 140 |
| Amanita | pantherina | var. abietum | (E.-J. Gilbert) Veitch | Amanita pantherina fo. abietum | Variété montagnarde de l'Amanite panthère | 141 |
| Amanita | phalloides | | (Fr.) Link | | Amanite phalloïde | 142 |
| Amanita | phalloides | var. alba | Constantin & Dufour | | Variété blanche de l'Amanite phalloïde | 143 |
| Amanita | porphyria | | Alb. & Schw. | | Amanite porphyre | 144 |
| Amanita | porphyria | fo. recutita | (Fr.) Vesely | | Forme à anneau blanc de Amanita porphyria | 145 |
| Amanita | porrinensis | | Castro | | Amanite à chapeau mexicain | 146 |
| Amanita | praelongipes | | Kärcher & Contu | Amanita vaginata var. elongata | Amanite à long pied | 3714 |
| Amanita | proxima | | Dumée | | Amanite à volve rousse | 147 |
| Amanita | pseudoregalis | | Pluvinage | | Sosie de Amanita regalis | 149 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|------|
| Amanita | queletii | | Bon & Dennis | Amanita franchetii fo. queletii | Amanite à voile jaune | 150 |
| Amanita | regalis | | (Fr.) Michael | Amanita muscaria var. regalis | Amanite royale | 151 |
| Amanita | rubescens | | (Pers.) Gray | | Amanite rougissante (Golmotte) | 152 |
| Amanita | rubescens | fo. alba | (Coker) Sartory & L. Maire | | Forme blanche de Amanita rubescens | 153 |
| Amanita | rubescens | fo. annulosulfurea | Gillet | | Amanite rougissante à anneau jaune | 154 |
| Amanita | simulans | | Contu | Amanita malleata | Amanite à chapeau martelé | 155 |
| Amanita | simulans | fo. alba | Contu | | Forme blanche de Amanita simulans | 156 |
| Amanita | singeri | | Bas | | Amanite de Singer | 157 |
| Amanita | spadicea | | Pers. | Amanitopsis spadicea | Amanite couleur brun de datte | 158 |
| Amanita | strobiliformis | | (Vittad.) Bertill. | Amanita solitaria sensu au. | Amanite pomme de pin | 159 |
| Amanita | submembranacea | | (Bon) Gröger | Amanitopsis submembranacea | Amanite à volve grise | 160 |
| Amanita | umbrinolutea | | (Secretan ex Gillet) Bataille | | Amanite ombre jaune | 161 |
| Amanita | vaginata | | (Bull.) Lam. | | Amanite vaginée | 162 |
| Amanita | vaginata | var. alba | Velen. | | Forme blanche de l'Amanite vaginée | 163 |
| Amanita | vaginata | var. plumbea | (Schaeff.) Quél. & Bataille | | | 164 |
| Amanita | verna | | (Bull.) Lam. | | Amanite printanière | 165 |
| Amanita | verna | var. decipiens | Trimbach | | Amanite printanière trompeuse | 166 |
| Amanita | virosa | | (Fr.) Bertill. | | Amanite vireuse | 167 |
| Amanita | virosa | var. levipes | Neville & Poumarat | | Variété à pied lisse de l'Amanite vireuse | 168 |
| Amanita | vittadinii | | (Moretti) Vittad. | Saproamanita vittadinii | Amanite de Vittadini | 169 |
| Amaropostia | stiptica | | (Pers.) B.K. Cui et | Postia stiptica - Tyromyces | Polypore amer | 2619 |
| Amphinema | byssoides | | (Pers.) J. Erikss. | | Amphinema à rhizomorphes | 3724 |
| Ampulloclitocybe | clavipes | | (Pers.) Redhead | Clitocybe clavipes | Clitocybe à pied en massue | 171 |
| Amylostereum | areolatum | | (Chaillet ex) Boiss. | Stereum areolatum | Stereum aréolé | 172 |
| Amylostereum | chailletii | | (Pers.) Boidin | Stereum chailletii | Stereum de Chaillet | 173 |
| Amylostereum | laevigatum | | (Fr.) Boidin | Peniophora laevigata | Stereum à hyménium lisse | 174 |
| Antrodia | albida | | (Fr.) Donk | Trametes albida | Polypore blanchâtre | 175 |
| Antrodia | ramentacea | | (Berk. & Broome) Donk | | Polypore fragmenté | 176 |
| Antrodiella | semisupina | | (Berk. & M.A. Cui) | Antrodia semisupina | Polypore réfléchi | 178 |
| Antrodiella | serpula | | (P.Karst.) Spirin | Antrodiella hoehnelii | Polypore vorace | 179 |
| Aphroditeola | olida | | (Quél.) Redhead | Hygrophoropsis olida - Hygrophora | Hygrophoropsis à odeur agréable | 180 |
| Apioperdon | pyriforme | | (Schaeff.) Vizzini | Lycoperdon pyriforme - M. | Vesse de loup en forme de poire | 2456 |
| Arcyria | denudata | | (L.) Wettst. | | Arcyria dénudé | 181 |
| Arcyria | obvellata | | (Oeder) Onsberg | | | 3725 |
| Arcyria | stipata | | (Schwein.) Listel | Hemitrichia stipata | Arcyria aggloméré | 3726 |
| Armillaria | borealis | | (Marxm.) Korhonen | | Armillaire du Nord | 182 |
| Armillaria | cepistipes | | Velen. | | Armillaire à pied en massue | 183 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Armillaria | cepistipes | fo. pseudobulbosa | Romagn. & Marxm. | | Forme bulbeuse de Amanita cepistipes | 184 |
| Armillaria | griseofusca | | (DC.) Gillet | Armillaria nigrigula | Armillaire à chapeau gris brun | 186 |
| Armillaria | lutea | | Gillet | Armillaria bulbosa - Armillaire | Armillaire à anneau jaune | 187 |
| Armillaria | mellea | | (Vahl.) P. Kumm. | | Armillaire couleur de miel | 188 |
| Armillaria | ostoyae | | (Romagn.) Herin | Armillariella ostoyae | Armillaire d'Ostoya | 189 |
| Armillaria | socialis | | (DC.) Fayod | Armillaria tabescens | Armillaire sans anneau | 190 |
| Arrhenia | acerosa | | (Fr.) Kühner | Leptoglossum acerosum | Omphale flabelliforme | 191 |
| Arrhenia | auriscalpium | | (Fr.) Fr. | Hohenbuehelia auriscalpiu | Omphale cure-oreilles | 192 |
| Arrhenia | baeospora | | (Singer) Redhead | Omphalina baeospora | Omphale à petites spores | 193 |
| Arrhenia | chlorocyanea | | (Pat.) Redhead | Omphalina chlorocyanea | Omphale à chapeau vert de gris | 194 |
| Arrhenia | cyathella | | (Kuyper) Elborne | Gerronema cyathellum | Omphale en forme de coupe | 195 |
| Arrhenia | discorosea | | (Pilát) Herink & | Omphalina xylophila - Omph | Omphale à disque rose | 196 |
| Arrhenia | epichysium | | (Pers.) Redhead | Omphalina epichysium | Omphale lignicole | 197 |
| Arrhenia | gerardiana | | (Peck) Elborne | Arrhenia sphagnicola - Omph | Omphale des sphaignes | 198 |
| Arrhenia | griseopallida | | (Desm.) Watling | Phaeotellus griseopallidus | Omphale gris pâle | 199 |
| Arrhenia | latispora | | (J. Favre) Bon & Courtec. | | Omphale à larges spores | 200 |
| Arrhenia | lilacinicolor | | (Bon) P.A. More | Omphalina lilacinicolor | Omphale lilacine | 201 |
| Arrhenia | lobata | | (Pers.) Lamoure | Leptoglossum lobatum | Omphale à chapeau ondulé | 202 |
| Arrhenia | obatra | | (J. Favre) Redhead | Omphalina obatra | Omphale presque noire | 203 |
| Arrhenia | obscurata | | (D.A. Reid) Redhead | Omphalina obscurata | Omphale sombre | 204 |
| Arrhenia | onisca | | (Fr.) Fr. | Omphalina oniscus | Omphale brune | 205 |
| Arrhenia | parvivelutina | | (Cléménçon) Redhead | Omphalina parvivelutina | Omphale sosie de Arrhenia velutipes | 206 |
| Arrhenia | peltigerina | | (Peck) Redhead | Omphalina peltigerina | Omphale des lichens | 207 |
| Arrhenia | philonotis | | (Lasch) Redhead | Omphalina philonotis | Omphale des tourbières | 208 |
| Arrhenia | retiruga | | (Bull.) Redhead | Leptoglossum retirugum | Omphale à hyménium ridé | 209 |
| Arrhenia | rickenii | | (Singer ex Hora) | Phaeotellus rickenii | Omphale de Ricken | 210 |
| Arrhenia | rigidipes | | (Lamoure) Redhead | Omphalina rigidipes | Omphale à pied rigide | 211 |
| Arrhenia | rustica | | (Fr.) Redhead et | Omphalina rustica | Omphale rustique | 212 |
| Arrhenia | salina | | (Hoil) Bon & Courtec. | Arrhenia littoralis - Leptoglossum | Omphale des mares salées | 213 |
| Arrhenia | spathulata | | (Fr.) Fr. | Leptoglossum muscigenum | Omphale des mousses | 214 |
| Arrhenia | subglobisemen | | Corriol | | Omphale à spores subglobuleuses | 215 |
| Arrhenia | tillii | | (Krisai & Noord | Clitopilus tillii - Rhodocybe | Rhodocybe de Till | 3018 |
| Arrhenia | umbratilis | | (Fr.) Fr. | Omphalina umbratilis | Omphale brun sombre | 216 |
| Arrhenia | velutipes | | (P.D. Orton) Redhead | Omphalina velutipes | Omphale à pied velouté | 217 |
| Arrhenia | violaceoviridis | | (Courtec.) Courtec. | Omphalina violaceoviridis | Omphale verdâtre violacée | 218 |
| Artomyces | pyxidatus | | (Pers. ex Fr.) Jülich | Clavaria pyxidata | Clavaire en chandeliers | 219 |
| Ascobolus | ciliatus | | J.C. Schmdt. | Lasiobolus ciliatus | Ascobole ciliée | 220 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|
| Ascocoryne | cylichnium | | (Tul.) Korf | | Coryne petite coupe | 221 |
| Ascocoryne | sarcoides | | (Jacq.) J.W. Grov | Coryne sarcoides | Coryne pourpre | 222 |
| Ascotremella | faginea | | (Peck) Seaver | | Tremelle du hêtre | 223 |
| Aspropaxillus | candidus | | (Bres.) Kühner & | Clitocybe candida - Leucop | Leucopaxille candide | 224 |
| Aspropaxillus | giganteus | | (Sow.) Kühner & | Leucopaxillus giganteus | Leucopaxille géant | 225 |
| Aspropaxillus | lepistoides | | (Maire) Kühner | Leucopaxillus lepistoides | Leucopaxille en forme de Lépiste | 226 |
| Asterophora | lycoperdoides | | (Bull.) Ditmar | Nyctalis agaricoides - Nyct | Nyctalis porteur d'étoiles | 227 |
| Asterophora | parasitica | | (Bull.) Singer | Nyctalis parasitica | Nyctalis parasite | 228 |
| Astraeus | hygrometricus | | (Pers. : Pers.) M | Geastrum hygrometricum | Géastre hygrométrique | 229 |
| Atheliachaete | sanguinea | | (Fr.) Spirin & Zm | Peniophora sanguinea - Ph | Péniophore sanguin | 230 |
| Atheniella | adonis | | (Bull.) Redhead, | Mycena adonis - Mycena f | Mycène jolie | 231 |
| Atheniella | delectabilis | | (Peck) Lüderitz & | Delicatula delectabilis - My | Mycène délectable | 1604 |
| Atheniella | flavoalba | | (Fr.) Redhead et | Mycena flavoalba | Mycène jaune pâle | 232 |
| Atheniella | leptophylla | | (Peck) Gminder | Mycena leptophylla | Mycène à lames minces | 233 |
| Atractosporocybe | inornata | | (Sowerby) P. Ala | Clitocybe inornata | Clitocybe à odeur de poisson | 234 |
| aurantiolarachnea | solsequia | | (Quél.) Van Voo | Humaria solsequia - Lachn | Qui suit le soleil | 3715 |
| Aureoboletus | gentilis | | (Quél.) Pouzar | Pulveroboletus cramesinus | Bolet cramoisi | 235 |
| Aureoboletus | moravicus | | (Vacek) Herink | Xerocomus leonis - Xeroco | Bolet couleur de lion | 236 |
| Aureonarius | callisteus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius callisteus | Cortinaire à odeur de pressing | 624 |
| Aureonarius | infucatus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius callisteus var. ir | Cortinaire fardé | 783 |
| Aureonarius | limonius | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius limonius | Cortinaire citron | 805 |
| Aureonarius | neocallisteus | | (Kranab. et al.) M | Cortinarius neocallisteus | Sosie de Cortinarius callisteus | 835 |
| Aureonarius | tofaceus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius tophaceus - Co | Cortinaire jaune ferrugineux | 1015 |
| Auricularia | auricula-judae | | (Bull.) Quél. | Hirneola auricula-judae | Oreille de Judas | 237 |
| Auricularia | mesenterica | | (Dicks.) Pers. | Tremella violacea | Auriculaire mésentérique | 238 |
| Auriporia | aurulenta | | A. David, Tortič & Jelić | | Auriporia doré | 3666 |
| Auriscalpium | vulgare | | Gray | Hydnum auriscalpium - Scu | Hydne cure-oreilles | 239 |
| Baeospora | myosura | | (Fr.) Fr. | Collybia conigena | Collybie queue de souris | 240 |
| Baeospora | myriadophylla | | (Peck) Singer | Collybia myriadophylla | Collybie à lames serrées | 241 |
| Baltazaria | galactina | | (Fr.) Leal-Dutra, | Thelephora galactina - Scyt | Corticium laiteux | 3340 |
| Basidioidendron | caesiocinereum | | (Höhn. & Litsch. | Gloeocystidium caesiocine | Basidioidendron gris-bleuâtre | 3727 |
| Battarrea | phalloides | | (Dicks.) Pers. | Lycoperdon phalloides | Battarrée phalloïde | 244 |
| Bertia | moriformis | | (Tode) De Not. | Sphaeria moriformis | Bertia en forme de mûre | 245 |
| Biscogniauxia | fuscella | | (Rehm) F. San M | Biscogniauxia nummularia | Hypoxylon en forme d'écu | 246 |
| Bjerkandera | adusta | | (Fr.) P. Karst. | Leptoporus adustus | Tramète brûlée | 249 |
| Bjerkandera | fumosa | | (Pers.) P. Karst. | | Tramète enfumée | 250 |
| Blasiphalia | pseudogrisella | | (A.H. Smith) Rec | Rickenella pseudogrisella | Omphale des thalles d'hépatique | 251 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|
| Bogbodia | uda | | (Pers.) Redhead | Hypholoma udum | Hypholome des tourbières | 252 |
| Bolbitius | coprophilus | | (Peck) Hongo | | Bolbitie coprophile | 253 |
| Bolbitius | demangei | | (Quél.) Sacc. & D. Sacc. | | Bolbitie dédiée à Demange | 254 |
| Bolbitius | lacteus | | J.E. Lange | | Bolbitie laiteux | 3728 |
| Bolbitius | psittacinus | | Hauskn. | | Bolbitie perroquet | 255 |
| Bolbitius | titubans | | (Bull.) Fr. | Bolbitius vitellinus - Bolbiti | Bolbitie jaune d'œuf | 256 |
| Boletinus | asiaticus | | Singer | Suillus asiaticus | Bolet asiatique | 3410 |
| Boletopsis | grisea | | (Peck) Bondart | Polyporus griseus | Polypore gris | 258 |
| Boletopsis | leucomelaena | | (Pers.) Fayod | Boletopsis subsquamosa - | Polypore blanc et noir | 259 |
| Boletus | aereus | | Bull. | | Cèpe bronzé | 260 |
| Boletus | aestivalis | | (Paulet) Fr. | Boletus reticulatus | Cèpe d'été | 261 |
| Boletus | badorufus | | R. Heim | Xerocomus badorufus | Bolet à tubes courts | 262 |
| Boletus | edulis | | Bull. | | Cèpe de Bordeaux | 263 |
| Boletus | edulis | fo. albus | (Pers.) Muhoz | Boletus persoonii | Cèpe blanc | 264 |
| Boletus | edulis | fo. betulicola | Vassilkov | | Cèpe des bouleaux | 265 |
| Boletus | edulis | fo. citrinus | (Venturi) Munoz | Boletus venturii | Cèpe jaune | 266 |
| Boletus | mamorensis | | Redeuilh | | Cèpe de Maâmora (forêt du Maroc) | 269 |
| Boletus | pinetorum | | M. Korhonen | | Bolet des pinèdes | 270 |
| Boletus | pinophilus | | Pilát & Dermek | Boletus pinicola | Cèpe des pins | 271 |
| Boletus | thalassinus | | (Pilát & Dermek | Leccinum thalassinum | Bolet à base du pied bleu vert | 272 |
| Bondarzewia | mesenterica | | (Schaeff.) Kreise | Bondarzewia montana - Pc | Polypore des montagnes | 274 |
| Bonomyces | sinopicus | | (Fr.) Fr. | Clitocybe sinopica | Clitocybe rouge brique | 275 |
| Botryobasidium | laeve | | (J. Erikss.) Parm | Botryobasidium pruinautum | Botryobasidium lisse | 3729 |
| Bovista | graveolens | | Schwalb | | Boviste à forte odeur | 276 |
| Bovista | nigrescens | | Pers. | | Boviste noircissante | 277 |
| Bovista | paludosa | | Lév. | | Boviste des marais | 278 |
| Bovista | plumbea | | Pers. | | Boviste couleur de plomb | 279 |
| Bovista | pusilla | | (Batsch) Pers. | | Boviste naine | 280 |
| Bovistella | utriformis | | (Bull.) Demoulin | Calvatia utriformis | Calvatie en forme d'outre | 312 |
| Britzelmayria | multipedata | | (Peck) D. Wächt | Psathyrella multipedata | Psathyrelle à pieds multiples | 2913 |
| Brunneoporus | malicola | | (Berk. & M.A. Cu | Antrodia malicola - Tramet | Polypore du pommier | 281 |
| Buchwaldoboletus | hemichrysus | | (Berk. & M.A. Cu | Pulveroboletus hemichrysu | Bolet à moitié jaune | 282 |
| Buchwaldoboletus | lignicola | | (Kallenb.) Pilát | Pulveroboletus lignicola | Bolet lignicole | 283 |
| Bulbillomyces | farinosus | | (Bres.) Jülich | Aegerita candida | Bulbillomyces granuleux | 284 |
| Bulgaria | inquinans | | Pers. | | Bulgarie salissante | 285 |
| Butyriboletus | appendiculatus | | (Fr.) Arora & Fra | Boletus appendiculatus | Bolet appendiculé | 286 |
| Butyriboletus | fechtneri | | (Velen.) Arora & | Boletus fechtneri - Boletus | Bolet de Fechtner | 287 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|------|
| Butyriboletus | fuscroseus | | (Smotl.) Vizzini & | Boletus pseudoregius | Bolet faux royal | 288 |
| Butyriboletus | regius | | (Krombh.) Arora | Boletus regius | Bolet royal | 289 |
| Butyriboletus | subappendiculatus | | (Dermek et al.) A | Boletus subappendiculatus | Bolet des conifères | 290 |
| Byssocorticium | atrovirens | | (Fr.) Bondartsev | Corticium atrovirens | Byssocorticium gris bleu | 3730 |
| Byssomerulius | corium | | (Pers.) Parmastc | Meruliopsis corium - Meru | Mérule coriace | 2447 |
| Byssonectria | fusispora | | (Berk.) Rogersor | Inermisia fusispora - Bysso | Inermisia à spores fusiformes | 3731 |
| Callistosporium | donadinii | | (Bon) Contu | Callistosporium olivascens | Callistospore de Donadini | 291 |
| Callistosporium | luteoolivaceum | | (Berk. & M.A. Cu | Callistosporium xanthophy | Callistospore à lames jaunes | 292 |
| Callistosporium | pinicola | | Arnolds | | Callistospore des pins | 294 |
| Caloboletus | calopus | | (Pers.) Vizzini | Boletus calopus | Bolet à beau pied | 295 |
| Caloboletus | kluzakii | | (Sutara & Spinari) | Vizzini | Bolet de Kluzak | 296 |
| Caloboletus | radicans | | Pers. | Boletus albidus - Boletus p | Bolet radicant | 297 |
| Calocera | cornea | | (Batsch) Fr. | | Calocère cornée | 298 |
| Calocera | furcata | | (Fr.) Fr. | Calocera viscosa var. furca | Calocère fourchue | 299 |
| Calocera | glossoides | | Pers. | | Calocère lancéolée | 300 |
| Calocera | viscosa | | Pers. | . | Calocère visqueuse | 301 |
| Calocybe | carnea | | (Bull.) Donk | Rugosomyces carneus - Lycop | Calocybe couleur chair | 3047 |
| Calocybe | chrysenferon | | (Bull.) Singer | Rugosomyces chrysenfero | Calocybe à chair jaune | 3048 |
| Calocybe | cyanella | | Singer ex Redhe | Rugosomyces cyanellus | Calocybe à chapeau bleu violet | 3049 |
| Calocybe | favrei | | (R. Haller Aar & | Lyophyllum favrei | Lyophylle de Favre | 2361 |
| Calocybe | gambosa | | (Fr.) Donk | Tricholoma georgii | Tricholome de la Saint Georges | 302 |
| Calocybe | gangraenosa | | (Fr.) Hofsten et | Lyophyllum fumatofetens | Tricholome gris brun | 303 |
| Calocybe | graveolens | | (Pers.) Singer | Calocybe gambosa fo. grav | Tricholome de la St George à odeur forte | 3732 |
| Calocybe | hypoxantha | | (Joss. & Riouss.) | Bon | Calocybe des cyprés | 304 |
| Calocybe | littoralis | | Ballero & Contu | Lyophyllum littorale | Lyophylle des dunes | 2364 |
| Calocybe | naucoria | | (Murrill) Singer | Rugosomyces fallax - Lycop | Calocybe trompeur | 3050 |
| Calocybe | obscurissima | | (A. Pearson) M. | Rugosomyces obscurissimu | Calocybe obscur | 3716 |
| Calocybe | ochracea | | (R. Haller Aar) B | Lyophyllum ochraceum - Ly | Lyophylle ochracé | 2367 |
| Calocybe | onychina | | (Fr.) Donk | Lyophyllum onychinum - R | Lyophylle pourpre et or | 2368 |
| Calonarius | atrovirens | | (Kalchbr.) Niska | Cortinarius atrovirens | Cortinaire vert foncé | 583 |
| Calonarius | aureofulvus | | (M.M. Moser) N | Cortinarius aureofulvus | Cortinaire fauve doré | 586 |
| Calonarius | barbarorum | | (Bidaud, Moënn | Cortinarius barbarorum | Cortinaire à voile violet | 600 |
| Calonarius | carviolaceus | | (P.D. Orton) Nisl | Cortinarius carviolaceus | Cortinaire à chair violacée | 634 |
| Calonarius | catharinae | | (Consiglio) Niska | Cortinarius catharinae | Cortinaire dédié à Catherine | 3667 |
| Calonarius | cedretorum | | (Maire) Niskane | Cortinarius cedretorum | Cortinaire des cèdres | 638 |
| Calonarius | cisticola | | (Froslev & T.S. J | Cortinarius cisticola | Cortinaire des cistes | 648 |
| Calonarius | citrinus | | (J.E. Lange ex P. | Cortinarius pseudosulphur | Cortinaire citrin | 651 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--|--------------------|------------------------------|---|------|
| Calonarius | coniferarum | | (Pers.) Niskanen | Cortinarius calochrous fo. | Cortinaire multiforme variété des conifères | 661 |
| Calonarius | corrosus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius corrosus - Phle | Cortinaire corrodé | 3669 |
| Calonarius | cupreorufus | | (Brandrud) Niska | Cortinarius cupreorufus | Cortinaire de couleur rouge cuivre | 3670 |
| Calonarius | dibaphus | | | Cortinarius dibaphus | Cortinaire à deux couleurs | 690 |
| Calonarius | elegantior | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius elegantior | Cortinaire élégant | 704 |
| Calonarius | elegantissimus | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius elegantissimus | Cortinaire très élégant | 705 |
| Calonarius | elotus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius elotus | Cortinaire à lames claires | 706 |
| Calonarius | flavovirens | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius flavovirens | Cortinaire jaune-olivâtre | 723 |
| Calonarius | fulvoincarnatus | | (Joachim ex Bida | Cortinarius fulvoincarnatus | Cortinaire fauve incarnat | 738 |
| Calonarius | glaucescens | | (Jul. Schäff.) Nis | Cortinarius glaucescens | Cortinaire glaucescent | 747 |
| Calonarius | haasii | | (M.M. Moser) N | Cortinarius haasii | Cortinaire de Haas | 754 |
| Calonarius | humolens | | (Brandrud) Nika | Cortinarius humolens | Cortinaire de couleur jaune olivâtre | 773 |
| Calonarius | insignibulbus | | (Bidaud & Moën | Cortinarius insignibulbus | Cortinaire à bulbe remarquable | 784 |
| Calonarius | ionochlorus | | (Maire) Niskane | Cortinarius ionochlorus | Cortinaire vert et violet | 786 |
| Calonarius | meinhardii | | (Bon) Niskanen | Cortinarius splendens var. | Cortinaire dédié à Moser | 815 |
| Calonarius | napus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius napus | Cortinaire navet | 833 |
| Calonarius | nymphicolor | | (Reumaux) Niska | Cortinarius nymphicolor | Cortinaire teinté de rose lilas | 838 |
| Calonarius | odoratus | | (Joguet ex M.M. | Cortinarius odoratus | Cortinaire odorant | 846 |
| Calonarius | odorifer | | (Britzelm.) Niska | Cortinarius odorifer | Cortinaire à bonne odeur | 847 |
| Calonarius | olearioides | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius olearioides - Cc | Cortinaire aux couleurs éclatantes | 849 |
| Calonarius | piceae | | (Frøslev et al.) N | Cortinarius piceae | Cortinaire de l'épicéa | 3671 |
| Calonarius | platypus | | (M.M. Moser) N | Cortinarius platypus | Cortinaire à pied large | 884 |
| Calonarius | prasinus | | (Schaeff.) Niska | Cortinarius prasinus | Cortinaire vert poireau | 899 |
| Calonarius | quercilicis | | (Chevassut & Ro | Cortinarius quercilicis | Cortinaire du chêne vert | 925 |
| Calonarius | rapaceoides | | (Bidaud, G. Riou | Cortinarius rapaceoides | Sosie de Cortinarius rapaceus | 926 |
| Calonarius | rapaceotomentosus | | (Delaporte & Ey | Cortinarius rapaceotomen | Cortinaire rapace tomenteux | 927 |
| Calonarius | saporatus | | (Britzelm.) Niska | Cortinarius subturbinatus | Proche de Cortinarius turbinatus | 1003 |
| Calonarius | selandicus | | (Froslev & T.S. J | Cortinarius selandicus | Cortinaire des hêtraies calcicoles | 964 |
| Calonarius | sodagnitus | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius sodagnitus | Cortinaire reconnaissable par la soude | 969 |
| Calonarius | spectabilis | | (M.M. Moser) N | Cortinarius spectabilis | Cortinaire spectaculaire | 977 |
| Calonarius | splendens | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius splendens | Cortinaire splendide | 980 |
| Calonarius | suaveolens | | (Bataille & Joach | Cortinarius suaveolens | Cortinaire à odeur suave | 988 |
| Calonarius | subgracilis | | (Moëgne-Locc.) | Cortinarius subgracilis | Proche de Cortinarius gracilis | 996 |
| Calonarius | xanthochlorum | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius olivascentiumC | Cortinaire jaune verdâtre | 1057 |
| Calonarius | xanthophyllus | | (Cooke) Niskane | Cortinarius xanthophyllus | Cortinaire à lames jaunes | 1059 |
| Caloscypha | fulgens | | (Pers.) Boud. | | Pezize en forme de coupe | 305 |
| Calvatia | booniana | | A.H. Sm. | | Calvatie de Boone | 306 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|
| Calvatia | cretacea | | (Berk.) Lloyd | Lycoperdon cretaceum | Calvatie créée | 307 |
| Calvatia | cyathiformis | | (Bosc) Morgan | Calvatia fragilis | Calvatie fragile | 309 |
| Calvatia | gigantea | | (Batsch) Lloyd | Lycoperdon giganteum - La | Vesse de loup géante | 310 |
| Calycina | citrina | | (Hedw.) Gray | Bisporella citrina | Bisporelle citrine | 247 |
| Calycina | claroflava | | (Grev.) Kuntze | Bisporella sulfurina | Bisporelle jaune soufre | 248 |
| Calycina | herbarum | | (Pers.) Dennis | Helotium herbarum - Peziz | Pézize des tiges herbacées | 1791 |
| Camarophylloopsis | schulzeri | | (Bres.) Herink | Hygrophorus schulzeri | Hygrophore de Schulzer | 313 |
| Campanella | caesia | | Romagn. | | Campanelle bleue | 314 |
| Candolleomyces | candolleanus | | (Fr.) D. Wächt. & | Psathyrella appendiculata | Psathyrelle de De Candolle | 2896 |
| Candolleomyces | leucotephrus | | (Berk. & Broome | Psathyrella leucotephra | Psathyrelle blanche et cendrée | 2908 |
| Canolarius | lilacinovelatus | | (Reumaux & Rar | Cortinarius lilacinovelatus | Cortinaire à voile violacé | 804 |
| Cantharelloopsis | prescotii | | (Weinem.) Kuyp | Gerronema prescotii | Fausse chanterelle de Prescott | 315 |
| Cantharellula | umbonata | | (J.F. Gmel.) Sing | Hygrophoropsis umbonata | Fausse chanterelle des bruyères | 316 |
| Cantharellus | alborufescens | | (Malençon) Pap | Cantharellus henrici - Cant | Girolle blanche | 317 |
| Cantharellus | amethysteus | | (Quél.) Quél. | Cantharellus cibarius var. a | Girolle amethyste | 318 |
| Cantharellus | atrofuscus | | Cont & Settiu, Vizzini, M. Carbone | | Chanterelle fauve noir | 319 |
| Cantharellus | cibarius | | Fr. | | Chanterelle ou girolle | 320 |
| Cantharellus | cinereus | | Pers. | Craterellus cinereus | Chanterelle cendrée | 1065 |
| Cantharellus | ferruginascens | | P.D. Orton | Cantharellus cibarius var. fi | Chanterelle ferrugineuse | 321 |
| Cantharellus | friesii | | Quél. | | Chanterelle de Fries | 322 |
| Cantharellus | ianthinoxanthus | | (Maire) Kühner | Craterellus ianthinoxanthu | Craterelle jaune et violette | 1070 |
| Cantharellus | melanoxeros | | Desm. | Craterellus melanoxeros | Chanterelle noircissante | 1076 |
| Cantharellus | pallens | | Pilát | Cantharellus subpruinus | Chanterelle prulineuse | 323 |
| Cantharellus | romagnesianus | | Eyssart. & Buyck | Cantharellus cibarius var. t | Chanterelle de Romagnesi | 324 |
| Cantharocybe | gruberi | var. luteosaturatus | (Malençon) Este | Pleurotus dryinus var. lute | Pleurote des cèdres | 325 |
| Capitotricha | bicolor | | (Bull.) Baral | Dasyscyphus bicolor - Lach | Lachnum bicolore | 326 |
| Catathelasma | imperiale | | (Fr.) Singer | Biannularia imperiale | Armillaire impériale | 327 |
| Cellulariella | warnieri | | (Durieu & Mont | Lenzites warnieri - Tramete | Lenzite de Warnier | 2174 |
| Ceratiomyxa | fruticulosa | | (O.F. Müll.) T. Mab. | | Myxomycète en forme de buisson | 329 |
| Ceratiomyxa | fruticulosa | var. porioides | (Alb. & Schwein.) Lister | | Myxomycète en forme de croûte poroïde | 330 |
| Cercopemyces | rickenii | | (Bohus) Wasser | Armillaria rickenii - Floccul | Armillaire de Ricken | 331 |
| Ceriporus | leptocephalus | | (Jacq.) Zmitr. & | Melanopus varius - Polypo | Polypore variable | 332 |
| Ceriporus | squamosus | | (Huds.) Quél. | Melanopus squamosus - Pe | Polypore écailleux | 334 |
| Ceriporia | excelsa | | (S. Lundell) Parn | Polyporus rhodellus | | 3733 |
| Ceriporia | reticulata | | (Hoffm.) Domanski | | Polypore réticulé | 335 |
| Ceriporia | viridans | | (Berk. & Broome | Polyporus viridansPhysispc | Polypore verdissant | 3734 |
| Ceriporiopsis | mucida | | (Pers.) Gilb. & R | Porpomyces mucidus - Por | Polypore spongieux | 336 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|
| Cerrena | unicolor | | (Bull.) Murrill | Coriolus unicolor - Trametes | Tramète unicolore | 338 |
| Chaetocalathus | craterellus | | (Durieu & Léveillé) | Singer | Marasme en forme de cratère | 339 |
| Chalciporus | piperatus | | (Bull.) Bataille | Boletus piperatus - Chalci | Bolet poivré | 342 |
| Chalciporus | rubinus | | (W.G. Smith) Sin | Boletus rubinus | Bolet rubis | 343 |
| Chamaemyces | fracidus | | (Fr.) Donk | Lepiota irrorata | Lépiote guttulée | 344 |
| Chamaemyces | fracidus | var. pseudocastaneus | Bon & Boiffard | | Lépiote guttulée à chapeau châtain | 345 |
| Cheilymenia | aurea | | Boud. | Lachnea aurea | Cheilymenia dorée | 346 |
| Cheilymenia | fimicola | | (Bagl.) Dennis | | Cheilymenia fimicole | 347 |
| Cheilymenia | granulata | | (Bull.) J. Morave | Coprobria granulata | Cheilymenia granuleuse | 348 |
| Cheilymenia | stercorea | | (Pers.) Boud. | | Cheilymenia des bouses de vaches | 349 |
| Cheilymenia | vinacea | | (Rabenh.) Boud. | | Cheilymenia du marc de raisin | 350 |
| Chlorociboria | aeruginascens | | (Nyl.) Ramamurt | Chlorosplenium aeruginasc | Pézize turquoise | 352 |
| Chlorociboria | aeruginosa | | (Nyl.) Ramamurt | Chlorosplenium aeruginos | Pézize vert de gris | 353 |
| Chlorophyllum | brunneum | | (Farl. & Burt) Ve | Macrolepiota rhacodes var | Lépiote vénéneuse | 354 |
| Chlorophyllum | olivieri | | (Barla) Vellinga | Lepiota olivieri - Macrolepi | Lépiote d'Olivier | 355 |
| Chlorophyllum | rhacodes | | (Vittadin.) Vellin | Lepiota rhacodes - Macrole | Lépiote déguenillée | 356 |
| Choiromyces | meandriiformis | | Vittad. | | Fausse truffe | 357 |
| Chondrostereum | purpureum | | (Pers.) Pouzar | Stereum purpureum | Stérée pourpre | 358 |
| Chromosera | cyanophylla | | (Fr.) Redhead, A | Omphalina cyanophylla | Omphale à lames bleues | 359 |
| Chroogomphus | fulmineus | | (R. Heim) Courtec. | | Gomphide aux couleurs éclatantes | 360 |
| Chroogomphus | helveticus | | (Singer) M.M. M | Gomphidius helveticus | Gomphide helvétique | 361 |
| Chroogomphus | helveticus | subsp. tatrensis | (Pilát) Kuthan & Singer | | Gomphide squamuleux | 362 |
| Chroogomphus | rutilus | | (Schaeff.) O.K. M | Gomphidius rutilus - Gomp | Gomphide rutilant | 363 |
| Chrysomphalina | chrysophylla | | (Fr.) Fr. | Chrysobostrychodes chrysc | Omphale à lames jaunes | 364 |
| Chrysomphalina | grossula | | (Pers.) Norvell, F | Cuphophyllum grossulus - C | Omphale à chapeau jaune verdâtre | 365 |
| Chrysomyxa | rhododendri | | (DC.) de Bary | Chrysomyxa ledi | Rouille vésiculeuse de l'épicéa | 366 |
| Ciboria | amentacea | | (Balb.) Fucklel | Peziza amentacea | Ciborie de l'aulne | 367 |
| Ciboria | batschiana | | (Zopf) N.F. Buchw. | | Ciborie de Batsch | 368 |
| Ciboria | betulae | | (Woronin) W.L. | Sclerotinia betulae | Ciborie des bouleaux | 369 |
| Ciboria | caucus | | (Rebent.) Fuckel | | Ciborie en forme de coupe | 370 |
| Cinereomyces | lindbladii | | (Berk.) Jülich | | Polypore de Lindblad | 371 |
| Clathrus | archeri | | (Berk.) Dring. | Anthurus archeri | Clathre d'Archer | 372 |
| Clathrus | ruber | | P. Micheli ex Pe | Clathrus cancellatus | Clathre grillagé | 373 |
| Clavaria | argillacea | | Pers. | | Clavaire argilacée | 374 |
| Clavaria | rosea | | Fr. | | Clavaire rose | 375 |
| Clavariadelphus | helveticus | | Rahm & Schild | | Clavaire de Suisse | 376 |
| Clavariadelphus | ligula | | (Schaeff.) Donk | Clavaria ligula | Clavaire petite langue | 377 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| Clavariadelphus | pistillaris | | (L.) Donk | Clavariadelphus flavoimmatus | Clavaire en pilon | 378 |
| Clavariadelphus | truncatus | | Donk | Clavaria truncata | Clavaire tronquée | 379 |
| Claviceps | purpurea | | (Fr.) Tul. | | Ergot du seigle | 380 |
| Clavicornia | mairei | | (Battetta) Corner | | Clavaire de Maire | 381 |
| Clavicornia | taxophila | | (Thom) Doty | Clavicornia tuba | Clavaire en forme de petite massue | 382 |
| Clavulina | amethystina | | (Bull.) Donk | Clavaria amethystina | Clavaire améthyste | 383 |
| Clavulina | cinerea | | Bull. | Clavaria cinerea | Clavaire cendrée | 384 |
| Clavulina | coralloides | | (L.) J. Schröt. | Clavaria cristata - Clavulina | Clavaire à crêtes de coq | 385 |
| Clavulina | fragilis | | Holmsk. | Clavaria fragilis - Clavulina | Clavaire vermicelle | 386 |
| Clavulina | incarnata | | (Corner) Olariag | Clavaria incarnata - Clavulina | Clavaire rose carné | 387 |
| Clavulina | rugosa | | (Bull.) J. Schröt. | Clavaria rugosa | Clavaire rugueuse | 388 |
| Clavulinopsis | corniculata | | (Schaeff.) Corner | Clavaria corniculata | Clavaire cornue | 389 |
| Clavulinopsis | fusiformis | | (Fr.) Corner | Clavaria fusiformis | Clavaire en fuseau | 390 |
| Clavulinopsis | helvola | | (Fr.) Corner | Clavaria helvola | Clavaire lumineuse | 391 |
| Clavulinopsis | laeticolor | | (Berk. & M.A. Curtis) H. Petersen | | Clavaire de couleur gaie | 392 |
| Clavulinopsis | luteoalba | | (Rea) Corner | Clavaria luteoalba | Clavaire jaune pâle | 393 |
| Cleistocybe | pleurotoides | | J. Favre ex Vizzini | Hygrophorus pleurotoides | Cleistocybe à silhouette de pleurote | 394 |
| Climacocystis | borealis | | (Fr.) Kotl. & Pouzar | Spongipellis borealis | Polypore boréal | 395 |
| Clitocella | fallax | | (Quél) Kluting et al. | Rhodocybe fallax - Clitopilus | Rhodocybe trompeur | 396 |
| Clitocella | mundula | | (Lasch) Kluting et al. | Clitopilus mundulus - Rhodocybe | Rhodocybe tacheté | 397 |
| Clitocella | popinalis | | (Fr.) Fr. | Clitopilus popinalis - Rhodocybe | Rhodocybe des gargottes | 398 |
| Clitocybe | agrestis | | Harmaja | Clitocybe graminicola | Clitocybe des graminées | 399 |
| Clitocybe | amarescens | | Harmaja | Clitocybe nitrophila | Clitocybe amarescent | 401 |
| Clitocybe | angustissima | | (Lasch) P. Kumm. | | Clitocybe à lames très serrées | 402 |
| Clitocybe | augeana | | (Mont.) Sacc. | Clitocybe dealbata var. augeana | Clitocybe à odeur de farine | 403 |
| Clitocybe | barbularum | | (Romagn.) P.D. Corner | Omphalina barbularum | Clitocybe des barbules | 404 |
| Clitocybe | bresadolana | | Singer | Infundibulicybe bresadolana | Clitocybe de Bresadola | 1831 |
| Clitocybe | brumalis | | (Bull.) P. Kumm. | | | 405 |
| Clitocybe | catinus | | (Fr.) Quél. | Infundibulicybe catinus | Clitocybe déprimé | 1832 |
| Clitocybe | costata | | Kühner & Romagn. | Infundibulicybe costata | Clitocybe côtelé | 1833 |
| Clitocybe | diatreta | | (Fr.) Fr. | | Clitocybe rosé | 407 |
| Clitocybe | dionysae | | Bon | Clitocybe gracilipes sensu lato | Clitocybe de Denise (Lamoure) | 408 |
| Clitocybe | ditopa | | (Fr.) Fr. | | Clitocybe à odeur de farine rance | 409 |
| Clitocybe | fasciculata | | H.E. Bigelow & Arnold | Rhodopaxillus caespitosus | Lépiste cespiteuse | 2230 |
| Clitocybe | foetens | | Melot | | Clitocybe fétide | 410 |
| Clitocybe | fragrans | | (With.) P. Kumm. | Clitocybe suaveolens - Clitocybe | Clitocybe parfumé | 412 |
| Clitocybe | glareosa | | Rollin & Monthec | Infundibulicybe glareosa | Clitocybe des garides | 1837 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|------|
| Clitocybe | leucodiatreta | | Bon | | Clitocybe à col blanc | 418 |
| Clitocybe | lituus | | (Fr.) Métrod | | Clitocybe en trompette | 419 |
| Clitocybe | martiorum | | J. Favre | Lepista martiorum | Clitocybe des Marti | 2236 |
| Clitocybe | mediterranea | | (Vizzini et Contu) | Infundibulicybe mediterranea | Clitocybe méditerranéen | 1838 |
| Clitocybe | metachroa | | (Fr.) Fr. | Clitocybe bicolor - Clitocybe | Clitocybe à chapeau bicolore | 420 |
| Clitocybe | nebularis | | (Batsch) P. Kumm. | Lepista nebularis | Clitocybe nébuleux | 421 |
| Clitocybe | nebularis | var. alba | Bataille | | Clitocybe nébuleux variété blanche | 422 |
| Clitocybe | obsoleta | | (Batsch) Quél. | | Clitocybe anisé de couleur rosâtre | 423 |
| Clitocybe | odora | | (Bull.) P. Kumm. | | Clitocybe anisé | 424 |
| Clitocybe | odora | var. alba | J.E. Lange | | Clitocybe odora à chapeau blanc | 425 |
| Clitocybe | odora | var. albidovirens | Raitelh. | | Variété à chapeau vert pâle. | 3717 |
| Clitocybe | odora | var. fallax | Kuyper | | Clitocybe odora à chapeau brun isabelle | 426 |
| Clitocybe | phaeophtalma | | (Pers.) Kuyper | Clitocybe fritilliformis | Clitocybe en forme de cornet | 413 |
| Clitocybe | phaeophtalma | var. gibboides | (Raitelh.) Bon | Clitocybe gibboides | Sosie de Clitocybe gibba | 427 |
| Clitocybe | phaeophtalma | var. weneri | (Malençon) Quadr. | | Clitocybe de Werner | 428 |
| Clitocybe | phyllophila | | Pers. | Clitocybe cerussata - Clitocybe | Clitocybe des feuilles | 429 |
| Clitocybe | pruniodora | | (Maire) Singer | | Clitocybe à odeur de prune | 430 |
| Clitocybe | pseudoobbata | | (J.E. Lange) Kuyper | | Sosie d'une omphale grise | 431 |
| Clitocybe | rivulosa | | Pers. | Clitocybe dealbata | Clitocybe blanc d'ivoire | 432 |
| Clitocybe | robusta | | Peck | | Clitocybe nébuleux de couleur blanche | 433 |
| Clitocybe | senilis | | (Fr.) Gillet | | Clitocybe ridé | 434 |
| Clitocybe | subspadicea | | (J.E. Lange) Bon | Gerronema subspadiceum | Clitocybe couleur de date | 3672 |
| Clitocybe | truncicola | | (Peck) Sacc. | | Clitocybe des troncs | 437 |
| Clitocybe | umbilicata | | P.Kumm. | | Clitocybe ombiliqué | 438 |
| Clitocybe | vibecina | | (Fr.) Quél. | | Clitocybe tardif | 439 |
| Clitocybula | abundans | | (Peck) Singer | | Clitocybe fasciculé | 440 |
| Clitocybula | lacerata | | (Scop.) Métrod | Collybia lacerata | Collybie lacérée | 441 |
| Clitocybula | lacerata | var. odorata | Bon | | Variété aromatique de Clitocybula lacerata | 442 |
| Clitopaxillus | alexandrii | | (Gillet) Gillet | Clitocybe alexandrii | Clitocybe d'Alexandre | 400 |
| Clitopaxillus | fibulatus | | P.A. Moreau, Dima, Consiglio, Visini | | Clitocybe bouclé | 3860 |
| Clitopilopsis | hirneola | | (Fr.) Kühner | Rhodocybe hirneola | Rhodocybe en forme d'omphale | 443 |
| Clitopilus | amarus | | A. de Haan | | Clitopile amer | 444 |
| Clitopilus | caelatus | | (Fr.) Vila & Contu | Rhodocybe caelata - Rhodocybe | Rhodocybe ombiliqué | 3012 |
| Clitopilus | cupreus | | (J. Favre ex Contu) | Collybia cuprea - Rhodocybe | Rhodocybe cuivré | 3013 |
| Clitopilus | cystidiatus | | Hauskn. & Noordel. | | Meunier de couleur grise | 445 |
| Clitopilus | daamsii | | Noordel. | Clitopilus hobsonii var. daamsii | Clitopile de Daams | 446 |
| Clitopilus | fasciculatus | | Noordel. | | Clitopile fasciculé | 447 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|--|-----------------------------|---|------|
| Clitopilus | finnmarchiae | | (Noordel.) Noord | Rhodocybe finnmarchiae | Rhodocybe des bouleaux nains | 3014 |
| Clitopilus | geminus | | (Paulet) Noorde | Rhodocybe gemina - Rhod | Rhodocybe tronqué | 3015 |
| Clitopilus | geminus | var. mauretanicus | (Maire) Noordel | Rhodocybe gemina var. ma | Rhodocybe tronqué à silhouette de Clitocybe | 3016 |
| Clitopilus | hobsonii | | (Berk.) P.D. Orto | Clitopilus pleurotelloides | Clitopile de Hobson | 448 |
| Clitopilus | nevillei | | P. Roux, P.A. Moreau, A. Charret & Contu | | Clitopile de Neville | 449 |
| Clitopilus | prunulus | | (Scop.) P. Kummer | | Meunier | 450 |
| Clitopilus | reticulosporus | | Noordel. | | Clitopile à spores réticulées | 451 |
| Clitopilus | scyphoides | | (Fr.) Fr. | | Clitopile en forme de gobelet | 453 |
| Clitopilus | scyphoides | var. intermedius | (Romagn.) Noord | Clitopilus intermedius | Clitopilus scyphoides à odeur fruitée | 454 |
| Clitopilus | scyphoides | var. omphaliformis | (Joss.) E. Ludw. | Clitopilus omphaliformis | Clitopilus scyphoides en forme d'omphale | 455 |
| Clitopilus | scyphoides | var. reductus | (Noordel.) E. Ludw. | | Clitopilus scyphoides à silhouette de crépidote | 456 |
| Collybia | cirrhatta | | (Schumach) Qué | Collybia amanitae - Microc | Collybie filiforme | 457 |
| Collybia | cookei | | (Bres.) J.D. Arno | Microcollybia cookei | Collybie à sclérote jaune | 458 |
| Collybia | ozes | | (Fr.) P. Karst. | Tephroclybe ozes - Lyophyl | Collybie négligée | 3440 |
| Collybia | tuberosa | | Bull. | Microcollybia tuberosa | Collybie à sclérote noir | 461 |
| Collybia | zonata | | (Peck) Sacc. | Crinipellis zonata | Marasme zoné | 1109 |
| Collybiopsis | confluens | | (Pers.) R.H. Pete | Collybia confluens - Maras | Collybie en touffe | 1495 |
| Collybiopsis | luxurians | | (Peck) R.H. Pete | Collybia luxurians - Gymno | Collybie luxuriante | 1512 |
| Collybiopsis | peronatus | | (Bolton) R.H. Pe | Collybia peronata - Marasr | Collybie guêtrée | 1516 |
| Collybiopsis | quercophila | | (Pouzar) R.H. Pe | Setulipes quercophilus - M | Collybie des feuilles de chênes | 1519 |
| Collybiopsis | ramealis | | (Bull.) Millsp. | Marasmius ramealis - Micr | Marasme des rameaux | 2396 |
| Collybiopsis | vaillantii | | (Pers.) R.H. Pete | Marasmius vaillantii - Mara | Marasme de Vaillant | 2398 |
| Colpoma | quercinum | | (Pers.) Wallr. | | Colpoma des chênes | 462 |
| Coltricia | perennis | | (L.) Murrill | | Coltricie pérenne | 463 |
| Colus | hirudinosus | | Cav. & Sech. | | Clathre à colonnes | 464 |
| Conferticium | ochraceum | | (Fr.) Hallenb. | Gloeocystidiellum ochrace | Conferticium ochracé. | 3735 |
| Coniophora | puteana | | (Schumach.) P. Karst. | | Coniophore des caves | 465 |
| Connopus | acervatus | | (Fr.) Fr. | Gymnopus acervatus - Coll | Collybie en touffes | 466 |
| Conocybe | aeruginosa | | Romagn. | Pholiotina aeruginosa | Conocybe vert de gris | 2798 |
| Conocybe | albipes | | (G.H. Otth) Haus | Conocybe lactea | Conocybe à pied blanc | 467 |
| Conocybe | antipus | | (Lasch) Fayod | | Conocybe radica | 468 |
| Conocybe | apala | | (Fr.) Arnolds | | Conocybe délicat | 469 |
| Conocybe | aporos | | Kits van Wav. | Pholiotina aporos | Conocybe printanier | 2799 |
| Conocybe | arrhenii | | (Fr.) Kits van Wa | Pholiotina arrhenii | Conocybe annelé | 470 |
| Conocybe | aurea | | (Jul. Schäff.) Hongo | | Conocybe doré | 471 |
| Conocybe | brunnea | | J.E. Lange & Küh | Pholiotina brunnea | Conocybe brun | 2801 |
| Conocybe | exannulata | | Kühner & Watlir | Pholiotina exannulata | Conocybe sans anneau | 2802 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|
| Conocybe | filaris | | (Fr.) Kühner | Pholiotina filaris | Conocybe à pied grêle | 2803 | |
| Conocybe | gigasperma | | Enderle & Hauskn. | | Conocybe à grandes spores | 472 | |
| Conocybe | hexagonospora | | Métrod ex Hausknecht & Enderle | | Conocybe à spores hexagonales | 473 | |
| Conocybe | macrocephala | | Kühner & Watling | Conocybe abruptibulbosa | Conocybe bulbilleux | 474 | |
| Conocybe | macrospora | | (G.F. Atk.) Hausk | Conocybe rubiginosa | Conocybe rubigineux | 475 | |
| Conocybe | mesospora | | Kühner & Watling | | Conocybe à spores moyennes | 476 | |
| Conocybe | nemoralis | | Harmaja | Pholiotina nemoralis | Conocybe des bosquets | 3673 | |
| Conocybe | pubescens | | (Gillet) Kühner | | Conocybe pubescent | 477 | |
| Conocybe | pygmaeoaffinis | | (Fr.) Kühner | Pholiotina pygmaeoaffinis | Conocybe de Fries | 2804 | |
| Conocybe | rickeniana | | P.D. Orton | | Conocybe dédié à Ricken | 478 | |
| Conocybe | rickenii | | (Jul. Schäff.) Küh | Conocybe siliginea fo. ricke | Conocybe de Ricken. | 3736 | |
| Conocybe | rugosa | | (Peck) Watling | Pholiotina rugosa | Conocybe à chapeau ridé | 2805 | |
| Conocybe | striipes | | (Cooke) S. Lund | Pholiotina striipes - Pholiot | Conocybe à pied strié-sillonné | 2806 | |
| Conocybe | subovalis | | Kühner & Watling | | Conoybe à bulbe marginé | 479 | |
| Conocybe | tenera | | (Schaeff.) Fayod | | Conocybe délicat | 480 | |
| Conocybe | velata | | (Velen.) Watling | Conocybe appendiculata - | Conocybe appendiculé | 2808 | |
| Conocybe | vestita | | (Velen.) Watling | Pholiotina vestita | Conocybe à marge décorée | 2809 | |
| Conocybe | vexans | | P.D. Orton | Pholiotina vexans | Conocybe déconcertant | 481 | |
| Conocybe | watlingii | | Hauskn. | | Conocybe de watling | 482 | |
| Contumyces | brunneolilacinus | | (Contu et al.) Re | Rickenella brunneolilacina | Omphale brun lilacin | 483 | |
| Contumyces | rosellus | | (M.M. Moser) R | Omphalina rosella | Omphale rose | 484 | |
| Contumyces | vesuvianus | | (Brig.) Redhead et al. | | Omphale du Vésuve | 485 | |
| Coprinellus | angulatus | | (Peck) Redhead | Coprinus angulatus - Copri | Coprin de Boudier | 486 | |
| Coprinellus | bipellis | | (Romagn.) P. Ro | Coprinus bipellis | Coprin à double voile | 487 | |
| Coprinellus | deliquescens | | (Bull.) P. Karst. | Coprinus deliquescens - Co | Coprin deliquescent | 488 | |
| Coprinellus | disseminatus | | Pers. | | Coprinus disseminatus | Coprin disséminé | 489 |
| Coprinellus | domesticus | | (Bolt.) Redhead | Coprinus domesticus | Coprin domestique | 490 | |
| Coprinellus | ellisii | | (P.D. Orton) Red | Coprinus ellisii | Coprin d'Ellis | 491 | |
| Coprinellus | flocculosus | | (DC.) Redhead e | Coprinus flocculosus | Coprin floconneux | 492 | |
| Coprinellus | heptemerus | | (M. Lange & A.H | Coprinus heptemerus | Coprin de 7 jours | 493 | |
| Coprinellus | impatiens | | (Fr.) Fr. | Coprinus impatiens | Coprin éphémère | 495 | |
| Coprinellus | micaceus | | Bull. | | Coprinus micaceus | Coprin micacé | 496 |
| Coprinellus | pallidissimus | | (Romagn.) P. Ro | Coprinus pallidissimus | Coprin très pâle | 497 | |
| Coprinellus | radians | | (Desm.) Vilgalys | Coprinus radians | Coprin radié | 498 | |
| Coprinellus | saccharinus | | (Romagn.) P. Ro | Coprinus saccharinus | Coprin saupoudré de sucre | 499 | |
| Coprinellus | truncorum | | (Scop.) Redhead | Coprinus truncorum | Coprin des troncs | 501 | |
| Coprinellus | verrucispermus | | (Joss. & Enderle | Coprinus verrucispermus | Coprin à spores verruqueuses | 502 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Coprinellus | xanthothrix | | (Romagn.) Vilga | Coprinus xanthothrix | Coprin à voile jaune | 503 |
| Coprinopsis | acuminata | | (Romagn.) Redh | Coprinus acuminatusCopri | Coprin à chapeau acuminé | 504 |
| Coprinopsis | atramentaria | | Bull. | Coprinus atramentarius | Coprin noir d'encre | 505 |
| Coprinopsis | bellula | | (Uljé) P. Roux & | Coprinus bellulus | Coprin gentillet | 506 |
| Coprinopsis | bicornis | | (Uljé & Horv.) Re | Coprinus bicornis | Coprin à basides bisporiques | 507 |
| Coprinopsis | cinerea | | (Schaeff.) Redhe | Coprinus cinereus | Coprin cendré | 508 |
| Coprinopsis | cothurnata | | (Godey) Redhea | Coprinus cothurnatus | Coprin à chapeau recouvert d'un voile | 509 |
| Coprinopsis | echinospora | | (Buller) Redhead | Coprinus echinosporus | Coprin à spores échinulées | 510 |
| Coprinopsis | ephemeroides | | (DC.) G. Moreno | Coprinus ephemeroides - C | Coprin à pied bulbilleux | 511 |
| Coprinopsis | erythrocephala | | (Lév.) Redhead, | Coprinus erythrocephalus | Coprin à tête rouge | 512 |
| Coprinopsis | gonophylla | | (Quél.) Redhead | Coprinus gonophyllus | Coprin à spores subsphériques | 513 |
| Coprinopsis | insignis | | (Peck) Redhead, | Coprinus alopecia sensu au | Coprin chauve | 514 |
| Coprinopsis | jonesii | | (Peck) Redhead, | Coprinus jonesii | Coprin laineux des charbonnières | 515 |
| Coprinopsis | kimurae | | (Hongo & Aoki) | Coprinus kimurae | Miniature de Coprinopsis picacea | 516 |
| Coprinopsis | laani | | (Kits van Wav.) F | Coprinus laani | Coprin gris souris | 517 |
| Coprinopsis | lagopus | | (Fr.) Fr. | Coprinus lagopus | Coprin pied de lièvre | 518 |
| Coprinopsis | macrocephala | | (Berk.) Redhead | Coprinus macrocephalus | Coprin à grosse tête | 519 |
| Coprinopsis | marcescibilis | | (Britzelm.) Orsta | Psathyrella marcescibilis | Coprin gris blanchâtre | 520 |
| Coprinopsis | melanthina | | (Fr.) Orstadius & | Psathyrella melanthina | Coprin gris lilas | 521 |
| Coprinopsis | mitrispora | | (Bohus) L. Nagy, | Coprinopsis spelaiophila | Coprin à spores submitriformes. | 3737 |
| Coprinopsis | narcotica | | (Batsch) Redhea | Coprinus narcoticus | Coprin à odeur de bitume | 522 |
| Coprinopsis | nivea | | (Pers.) Redhead | Coprinus niveus | Coprin blanc de neige | 523 |
| Coprinopsis | ochraceolanata | | (Bas) Redhead, | Coprinus citrinovelatus - C | Coprin à chapeau méchuleux | 524 |
| Coprinopsis | pachyderma | | (Bogart) Redhea | Coprinus pachydermus | Sosie de Coprinus lagopus | 525 |
| Coprinopsis | pachysperma | | (Pers.) Redhead | Coprinus pachyspermus | Coprin à grandes spores | 526 |
| Coprinopsis | phlyctidospora | | (Romagn.) Redh | Coprinus phlyctidosporus | Coprin à spores pustuleuses | 527 |
| Coprinopsis | picacea | | Bull. | Coprinus picaceus | Coprin pie | 528 |
| Coprinopsis | pseudonivea | | (Bender & Uljé) | Coprinus pseudoniveus | Sosie de Coprinopsis niveus | 529 |
| Coprinopsis | pseudoradiata | | (Watling) Redhe | Coprinus pseudoradiatus | Sosie de Coprinopsis radiata | 530 |
| Coprinopsis | romagnesiana | | (Singer) Redhea | Coprinus atramentarius va | Coprin squamuleux | 531 |
| Coprinopsis | rugosobispora | | (Geesink & Imle | Coprinus rugosobisporus | Coprin bispore à spores rugueuses | 532 |
| Coprinopsis | sclerotiorum | | (Horvers & de C | Coprinus sclerotiorum | Coprin à sclérote | 533 |
| Coprinopsis | stangliana | | (Enderle, Bende | Coprinus stanglianus | Coprin dédié à Stangl | 534 |
| Coprinopsis | stercorea | | (Fr.) Redhead, V | Coprinus stercoreus | Coprin des crottes | 535 |
| Coprinopsis | strossmayeri | | (Schulzer) Redhe | Coprinus strossmayeri | Coprin du peuplier | 536 |
| Coprinopsis | trispورا | | (Kemp & Watlin | Coprinus trisporus | Coprin à basides trisporiques | 537 |
| Coprinopsis | tuberosa | | (Quél.) P. Roux & | Coprinus tuberosus | Coprin radicaant à longs rhizoïdes | 538 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------|
| Coprinus | comatus | | Pers. | | Coprin chevelu | 539 |
| Coprinus | levisticolens | | E. Ludwig & P. Roux | | Coprin à odeur de chicorée | 540 |
| Coprinus | spadiceisporus | | Van de Bogart | | Coprin à spores en forme de mitre | 541 |
| Coprinus | sterquilinus | | (Fr.) Fr. | | Coprin annelé | 542 |
| Cordyceps | militaris | | (L.) Fr. | | Cordyceps militaire | 543 |
| Corinectria | fuckeliana | | (C. Booth) C.D. C | Neonectria fuckeliana | Nectrie de Fuckel | 2614 |
| Coriolopsis | gallica | | (Fr.) Ryvarden | Funalia gallica - Trametes g | Tramète des Gaules | 544 |
| Corticium | roseum | | Pers. | Laeticorticium roseum | Corticie rose | 545 |
| Cortinarius | aberrans | | Rob. Henry | | Cortinaire trompeur | 546 |
| Cortinarius | acetosus | | (Velen.) Melot | | Cortinaire à odeur de vinaigre | 547 |
| Cortinarius | acutovelatus | | Rob. Henry | | Cortinaire à chapeau aigu et voilé | 3674 |
| Cortinarius | acutus | | (Pers.) Fr. | | Cortinaire à mamelon pointu | 548 |
| Cortinarius | adalbertii | | J. Favre ex A. Pe | Cortinarius pateriformis | Cortinaire d'Adalbert | 549 |
| Cortinarius | addamascenus | | Rob. Henry | | Cortinaire à chapeau brun-rouge | 550 |
| Cortinarius | agathosmus | | Brandr., Lindstr. & Melot | | Cortinaire à odeur agréable | 551 |
| Cortinarius | albertii | | Dima, Froslev & T.S. Jeppesen | | Cortinaire d'Albert | 552 |
| Cortinarius | albidodiscus | | Bidaud & Fillion | | Cortinaire à disque blanc | 553 |
| Cortinarius | albocyaneus | | Fr. | | Cortinaire blanc et violet | 554 |
| Cortinarius | alborufescens | | Imler | Cortinarius lanigeroides | Cortinaire blanc puis roussissant | 555 |
| Cortinarius | albovariegatus | | (Velen..) Melot | | Cortinaire à pied panaché de blanc | 556 |
| Cortinarius | alboviolaceus | | Pers. | | Cortinaire blanc violacé | 557 |
| Cortinarius | alcalinophilus | | Rob. Henry | | Cortinaire éclatant | 558 |
| Cortinarius | allutus | | Fr. | | Cortinaire humide | 560 |
| Cortinarius | alpicola | | (Bon) Bon | Cortinarius epsomiensis va | Cortinaire des alpages | 710 |
| Cortinarius | alpinus | | Boud. | Cortinarius favrei | Cortinaire de Favre | 562 |
| Cortinarius | amigochrous | | Kühner | | Cortinaire aux couleurs non mêlées | 564 |
| Cortinarius | anfractoides | | Rob. Henry | | Sosie de Cortinarius infractus | 566 |
| Cortinarius | anomalus | | (Fr.) Fr. | Cortinarius azureus | Cortinaire irrégulier | 567 |
| Cortinarius | anomalus | var. lepidopus | (Cooke) J.E. Lang | Cortinarius lepidopus | Cortinaire à beau pied | 798 |
| Cortinarius | anomalus | var. subcaligatus | (Bidaud, Moënn | Cortinarius azureovelatus v | Cortinaire à voile bleu azur | 591 |
| Cortinarius | anserinus | | (Velen.) Rob. Henry | | Cortinaire à odeur d'oie rotie | 568 |
| Cortinarius | anthracinus | | (Fr.) Fr. | Cortinarius purpureobadiu | Cortinaire anthracite | 569 |
| Cortinarius | araneosovolva | | (Bon & Gaugué) | Cortinarius diosmus var. ar | Variété à voile abondant | 696 |
| Cortinarius | arcifolius | | Rob. Henry | | Cortinaire à lames arquées | 570 |
| Cortinarius | arcuatorum | | Rob. Henry | | Cortinaire de la section Arcuati | 571 |
| Cortinarius | arenatus | | (Pers.) Fr. | Cortinarius phrygianus | Cortinaire sablé | 572 |
| Cortinarius | argentatus | | (Pers.) Fr. | | Cortinaire argenté | 573 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|--|------------------------------|------------------------------------|------|
| Cortinarius | argenteolilacinus | | M.M. Moser | | Cortinaire gris argenté | 574 |
| Cortinarius | argenteopileatus | | Nezdojm. | Cortinarius subargentatus | Cortinaire à chapeau argenté | 575 |
| Cortinarius | argillopallidus | | Jul. Schäff. | | Cortinaire à chapeau argilacé pâle | 576 |
| Cortinarius | armeniacus | | (Schaeff.) Zawad | Cortinarius privignorum | Cortinaire abricot | 578 |
| Cortinarius | armillatus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire armillé | 579 |
| Cortinarius | armillatus | var. miniatus | Reumaux | | Variété à chapeau rouge minium | 580 |
| Cortinarius | arquatus | | Fr. | | Cortinaire à chapeau jaune vif | 581 |
| Cortinarius | arvinaceus | | Fr. | | Cortinaire gluant | 582 |
| Cortinarius | atrocaeruleus | | M.M. Moser | Cortinarius decipiens var. s | Variété à chapeau brun noirâtre | 684 |
| Cortinarius | attenuatus | | (Velen.) G. Garnier | | Cortinaire ténu | 584 |
| Cortinarius | aureifolius | | Peck | | Cortinaire aux lames jaune d'or | 585 |
| Cortinarius | aureovelatus | | E. Bendiksen, K. Bendiksen & H. Lindstr. | | Cortinaire à voile jaune | 587 |
| Cortinarius | auroripes | | Carteret & Reun | Cortinarius subgracilior | Proche de Cortinarius gracilior | 995 |
| Cortinarius | avellaneocoeruleus | | (M.M. Moser) M | Phlegmacium avellaneoco | Cortinaire bleu ciel et noisette | 589 |
| Cortinarius | badiovinaceus | | M.M. Moser | | Cortinaire brun-roux | 592 |
| Cortinarius | balaustinus | | Fr. | | Cortinaire du bouleau | 593 |
| Cortinarius | balteatoalbus | | Rob. Henry | | Cortinaire feutré | 594 |
| Cortinarius | barbaricus | | (Brandrud) Frosle et al. | | Cortinaire à bulbe tronconique | 599 |
| Cortinarius | basillaceus | | P.D. Orton | | Cortinaire au mycélium lilas | 601 |
| Cortinarius | bataillei | | (J. Favre ex M.M. Moser) Hoil. | | Cortinaire de Bataille | 602 |
| Cortinarius | bergeronii | | (Melot) Melot | Cortinarius caesiolatens se | Cortinaire de Bergeron | 603 |
| Cortinarius | betuletorum | | M.M. Moser | | Cortinaire des boulaies | 604 |
| Cortinarius | betulinus | | J. Favre | | Cortinaire bétulicole | 605 |
| Cortinarius | bibulus | | Quéf. | Cortinarius pulchellus | Cortinaire bibelot | 606 |
| Cortinarius | biformis | | Fr. | | Cortinaire dimorphe | 607 |
| Cortinarius | biveloides | | Rob. Henry | | Cortinaire à deux voiles | 3861 |
| Cortinarius | bivelus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à deux voiles | 608 |
| Cortinarius | bolaris | | Pers. | | Cortinaire ocre rouge | 609 |
| Cortinarius | boreasensis | | A.H. Sm. | Cortinarius ionosmus | Cortinaire à odeur de violette | 788 |
| Cortinarius | boudieri | | Rob. Henry | Cortinarius caerulescentiu | Cortinaire de Boudier | 610 |
| Cortinarius | bovinus | | Fr. | | Cortinaire des bouviers | 611 |
| Cortinarius | brunneofulvus | | Fr. | | Cortinaire brun fauve | 612 |
| Cortinarius | brunneus | | (Pers.) Fr. | Cortinarius glandicolor | Cortinaire brun rouge | 613 |
| Cortinarius | bulbosus | | (Sowerby) Gray | | Cortinaire bulbeux | 614 |
| Cortinarius | bulliardii | | (Pers.) Fr. | Cortinarius colus - Cortinar | Cortinaire de Bulliard | 615 |
| Cortinarius | caerulescens | | (Schaeff.) Fr. | Cortinarius caesiocyaneus | Cortinaire bleuissant | 616 |
| Cortinarius | caesiocanescens | | (M.M. Moser) Kühner & Romagn. | | Cortinaire à chapeau gris violet | 617 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------|
| Cortinarius | caesiogriseus | | Jul. Schäff. | | Cortinaire bleu grisâtre | 619 |
| Cortinarius | caesiostramineus | | Rob. Henry | Cortinarius amarescens - C | Cortinaire amarescent | 621 |
| Cortinarius | cagei | | Melot | Cortinarius bicolor | Cortinaire bicolore | 622 |
| Cortinarius | calochrous | | Pers. | | Cortinaire aux belles couleurs | 625 |
| Cortinarius | calochrous | subs. coniferarum | (M.M. Moser) N | Cortinarius calochrous var. | Cortinaire calochrous, variété des conifères | 626 |
| Cortinarius | camphoratus | | (Fr.) Fr. | Cortinarius amethystinus - | Cortinaire camphré (à odeur de bouc) | 627 |
| Cortinarius | candelaris | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire couleur de cire | 630 |
| Cortinarius | caninus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à collier | 631 |
| Cortinarius | caperatus | | Pers. | Rozites caperata | Pholiote ridée | 632 |
| Cortinarius | casimiri | | (Velen.) Huijsma | Cortinarius subserotipes | Cortinaire à pied polychrome | 635 |
| Cortinarius | castaneus | | (Bull.) Fr. | | Cortinaire châtain | 3738 |
| Cortinarius | castaneus | var. erythrinus | (Fr.) Moëgne-Lo | Cortinarius erythrinus - Co | Cortinaire printanier | 636 |
| Cortinarius | cedretorum | var. suberetorum | Maire | | Cortinarius cedretorum des chênes verts | 639 |
| Cortinarius | cephalixus | | Secr. ex Fr. | | Cortinaire à chapeau gluant | 640 |
| Cortinarius | cereifolius | | (M.M. Moser) M.M. Moser | | Cortinaire à lames cireuses | 641 |
| Cortinarius | chrysolitus | | Kauffman | Cortinarius huronensis - Cc | Cortinaire à voile jaune olivâtre | 642 |
| Cortinarius | cingulatus | | (Velen.) Moëgne-Locc. & Reumaux | | Cortinaire à bracelets | 643 |
| Cortinarius | cinnabarinus | | Fr. | | Cortinaire rouge cinabre | 644 |
| Cortinarius | cinnamomeoluteus | | P.D. Orton | | Cortinaire jaune cannelle | 645 |
| Cortinarius | cinnamomeus | | (L.) Gray | | Cortinaire cannelle | 646 |
| Cortinarius | cinnamoviolaceus | | M.M. Moser | | Cortinaire à pied voilé de blanc | 647 |
| Cortinarius | circinans | | Rob. Henry | Cortinarius melitosarx | Cortinaire à chapeau brun jaune | 817 |
| Cortinarius | citrinofulvescens | | M.M. Moser | | Cortinaire fauve citrin | 649 |
| Cortinarius | citrinovirens | | Rob. Henry | Cortinarius pseudosulphur | Cortinaire jaune verdâtre | 650 |
| Cortinarius | claricolor | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire de couleur claire | 652 |
| Cortinarius | claroflavus | | Rob. Henry | | Cortinaire jaune clair | 654 |
| Cortinarius | claroturmalis | | Rob. Henry | | Cortinaire turmalin | 3862 |
| Cortinarius | collinitus | | (Sowerby) Gray | Cortinarius muscigenus | Cortinaire visqueux | 829 |
| Cortinarius | comatus | | J. Favre | | Cortinaire chevelu | 658 |
| Cortinarius | comptulus | | M.M. Moser | | Cortinaire élégant | 659 |
| Cortinarius | confirmatus | | Rob. Henry | Cortinarius assiduusCortin | Cortinaire affirmé | 660 |
| Cortinarius | contractus | | Rob. Henry | | Cortinaire contracté | 662 |
| Cortinarius | cotoneus | | Fr. | | Cortinaire cotonneux | 663 |
| Cortinarius | cotoneus | var. melinoides | Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux | | Variété jaune de Cortinarius cotoneus | 664 |
| Cortinarius | craticius | | Fr. | | Cortinaire au mycélium rose | 666 |
| Cortinarius | croceocingulatus | | N. Arnolds & E. Ludw. | | Cortinaire ceinturé de jaune | 669 |
| Cortinarius | croceocristallinus | | Rob. Henry | | Cortinaire blanc jaunâtre ochracé | 670 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|------|
| Cortinarius | croceocrystallinus | var. alneti | Bidaud | | Variété des aulnes verts | 671 |
| Cortinarius | croceolutescens | | Rob. Henry ex B | Cortinarius mucifluoides fo | Cortinaire jaune safrané | 3739 |
| Cortinarius | croceus | | (Schaeff.) Gray | | Cortinaire safran | 672 |
| Cortinarius | croceus | var. norvegicus | Brandr. & H. Lindstr. | | Variété norvégienne de Cortinarius croceus | 673 |
| Cortinarius | crustulinicolor | | (Bon & Gaugué) Bidaud et al. | | Cortinaire couleur croûte de pain | 674 |
| Cortinarius | crustulinus | | Malençon | | Cortinaire à lames bleues | 675 |
| Cortinarius | crystallinus | | Fr. | | Cortinaire blanc d'ivoire | 667 |
| Cortinarius | cumatilis | | Fr. | | Cortinaire à chapeau bleu violacé | 676 |
| Cortinarius | cumatilis | var. robustus | (M.M. Moser) Quadr. | | Variété robuste de Cortinarius cumatilis | 677 |
| Cortinarius | cyaneus | | (Bres.) M.M. Moser | | Cortinaire bleu foncé | 678 |
| Cortinarius | cyanites | | Fr. | | Cortinaire à chair bleue rosissante | 679 |
| Cortinarius | cyanobasalis | | Rob. Henry | | Cortinaire à base du pied violette | 680 |
| Cortinarius | cyprinus | | Bidaud et al. | | Cortinaire à voile en couronne | 681 |
| Cortinarius | damascenus | | Fr. | | Cortinaire fasciculé | 682 |
| Cortinarius | decepiens | | (Pers.) Zawadzki | Cortinarius sertipes | Cortinaire trompeur | 683 |
| Cortinarius | delibutus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à lames lilas | 687 |
| Cortinarius | depressus | | Fr. | | Cortinaire déprimé | 688 |
| Cortinarius | diasemospermus | | Lamoure | | Cortinaire pailleté | 689 |
| Cortinarius | dibaphus | var. nemorosus | (Rob. Henry) Rol | Cortinarius nemorosus | Cortinaire des bois feuillus | 691 |
| Cortinarius | diffRACTOSUAVIS | | Rob. Henry | | Cortinaire à chapeau craquelé | 692 |
| Cortinarius | dilutus | | (Pers.) Fr. | | Cortinaire luisant | 693 |
| Cortinarius | dionysae | | Rob. Henry | | Cortinaire de Denise | 694 |
| Cortinarius | diosmus | | Kühner | | Cortinaire à deux odeurs | 695 |
| Cortinarius | dumetorum | | J. Favre | | Cortinaire des buissons | 697 |
| Cortinarius | duracinellus | | Rob. Henry | Cortinarius pyrophyllus | Cortinaire à lames couleur de feu | 923 |
| Cortinarius | duracinus | | Fr. | Cortinarius subduracinus | Cortinaire à pied dur | 698 |
| Cortinarius | earinus | | Romagn. | | Cortinaire hinnuloïde printanier | 700 |
| Cortinarius | ectypus | | J. Favre | | Cortinaire ectype | 3863 |
| Cortinarius | elator | | Fr. | Cortinarius pumilus - Corti | Cortinaire élevé | 702 |
| Cortinarius | elator | fo. ochraceoplicatus | Bidaud | | Forme à chapeau ochracé-plissé | 703 |
| Cortinarius | emunctus | | (Fr.) Fr. | Cortinarius epipoleus sens | Cortinaire à voile visqueux | 708 |
| Cortinarius | eufulmineus | | Rob. Henry | | Cortinaire aux couleurs vives | 713 |
| Cortinarius | evernius | | Rob. Henry | | Cortinaire florissant | 714 |
| Cortinarius | expallens | | M.M. Moser | Cortinarius Hemitrichus fo | Cortinaire des saules nains | 760 |
| Cortinarius | fagineti | | Britzelm. | | Cortinaire du hêtre | 715 |
| Cortinarius | fasciatus | | Fr. | | Cortinaire fasciculé | 716 |
| Cortinarius | fennoscandicus | | E. Bendiks., E. Bendiks & Brandr. | | Cortinaire de Fennoscandie | 717 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------|
| Cortinarius | fervidus | | P.D. Orton | | Cortinaire couleur de feu | 718 |
| Cortinarius | finitimus | | (Weinm.) P. Karst | Cortinarius traganus var. finitimus | Cortinaire à odeur fruitée | 719 |
| Cortinarius | firmus | | Fr. | | Cortinaire à chair épaisse | 720 |
| Cortinarius | flabellus | | (Fr.) Fr. | Cortinarius flexipes var. flabellus | Cortinaire pailleté dépourvu de violet | 725 |
| Cortinarius | flavescentium | | Rob. Henry | | Cortinaire flavescent | 721 |
| Cortinarius | flavidolilacinus | | Bidaud | | Cortinaire jaune et lilacin | 722 |
| Cortinarius | flexipes | | Pers. | Cortinarius paleaceus sensu lato | Cortinaire pailleté | 724 |
| Cortinarius | flos-paludis | | Melot | | Cortinaire fleur des marais | 727 |
| Cortinarius | fluryi | | (M.M. Moser) M.M. Moser | | Cortinaire de Flury | 728 |
| Cortinarius | foetens | | (M.M. Moser) M.M. Moser | | Cortinaire à odeur fétide | 729 |
| Cortinarius | fragrantior | | Gaugué | Cortinarius velenovskyi | Cortinaire à odeur de cuir de Russie | 730 |
| Cortinarius | francescae | | Reumaux | Cortinarius caput-medusae | Cortinaire tête de méduse | 633 |
| Cortinarius | fulgens | | Fr. | | Cortinaire au chapeau lumineux | 732 |
| Cortinarius | fulminatus | | Reumaux | Cortinarius alcalinophilus s.l. | Cortinaire aux belles couleurs | 733 |
| Cortinarius | fulmineus | | Fr. | | Cortinaire aux couleurs éclatantes | 734 |
| Cortinarius | fulminoides | | (M.M. Moser) M.M. Moser | | Sosie de Cortinarius fulmineus | 735 |
| Cortinarius | fulvaureus | | Rob. Henry | | Cortinaire fauve doré | 736 |
| Cortinarius | fulvescens | | Fr. | | Cortinaire fauvâtre | 737 |
| Cortinarius | fuscoperonatus | | Kühner | | Cortinaire à bracelets sombres | 741 |
| Cortinarius | gausapatus | | J. Favre | | Cortinaire barbu | 743 |
| Cortinarius | gentilis | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à lames espacées | 744 |
| Cortinarius | geophilus | | Rob. Henry | | Sosie de l'Inocybe geophila variété lilacina | 3679 |
| Cortinarius | geraniolens | | Bidaud | Cortinarius subcarcharias | Cortinaire à odeur de géranium | 3680 |
| Cortinarius | giacomoi | | Bidaud et al. | Cortinarius cristallinus fo. g. | Cortinaire à odeur de chenille cossus | 746 |
| Cortinarius | glaucoprasinus | | (M.M. Moser) M.M. Moser | | Cortinaire couleur vert de poireau | 748 |
| Cortinarius | glaucopus | var. acyaneus | (M.M. Moser) Nezdobjm. | | Cortinaire privé de bleu | 750 |
| Cortinarius | glaucopus | var. defossus | (Batsch) Reumaux | | Variété defossus du cortinaire à pied glauque | 3681 |
| Cortinarius | gossypinus | | Lindstr. | | Cortinaire à voile cotonneux | 751 |
| Cortinarius | gracilior | | (Schaeff. In M.M. Moser) M.M. Moser | | Cortinaire gracile | 752 |
| Cortinarius | guttatus | | Rob. Henry | | Cortinaire moucheté | 753 |
| Cortinarius | haematochelis | | Bull. | | Cortinaire aux bracelets rouges | 755 |
| Cortinarius | helobius | | Romagn. | | Cortinaire des marécages | 756 |
| Cortinarius | helvelloides | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire des zones humides | 757 |
| Cortinarius | helvolus | | (Bull.) Fr. | | Cortinaire jaunâtre | 758 |
| Cortinarius | hemitrichus | | Kalchbr. | | Cortinaire velouté | 759 |
| Cortinarius | hemitricus | | (Persoon) Fries | | Cortinaire semi-poilu, Cortinaire velouté | 3740 |
| Cortinarius | henrici | | Reumaux | | Cortinaire dédié à Henry | 761 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------------|--|-------------------------------|--|------|
| Cortinarius | herbarum | | Rob. Henry | | Cortinaire des graminées | 762 |
| Cortinarius | herculeus | fo. violascens | Rob. Henry | | Forme violette de Cortinarius herculeus | 764 |
| Cortinarius | hercynicus | | (Pers.) M.M. Moser | Cortinarius violaceus var. h | Cortinaire violet des conifères | 765 |
| Cortinarius | heterocyclus | | Soop | | Cortinaire aux multiples guirlandes | 767 |
| Cortinarius | hillieri | | Rob. Henry | | Cortinaire de Hillier | 768 |
| Cortinarius | hinnuleus | | Fr. | | Cortinaire couleur de faon | 769 |
| Cortinarius | hinnuloides | | Rob. Henry | | Sosie de Cortinarius hinnuleus | 770 |
| Cortinarius | holophaeus | | J.E. Lange | | Cortinaire entièrement brun | 771 |
| Cortinarius | humicola | | (Quél.) Maire | | Cortinaire humicole | 772 |
| Cortinarius | hydrotelamonioides | | Rob. Henry | Cortinarius pseudoprivignu | Faux cortinaire privignus | 914 |
| Cortinarius | ignipes | | M.M. Moser | | Cortinaire à pied rouge | 774 |
| Cortinarius | ignipes | | M.M. Moser | | Cortinaire à pied rouge | 845 |
| Cortinarius | iliopodius | | (Bull.) Fr. | Cortinarius alnetorum | Cortinaire des aulnes | 559 |
| Cortinarius | illibatus | | Fr. | | Cortinaire jaune pâle | 775 |
| Cortinarius | imbutus | | Fr. | | Cortinaire imbu | 776 |
| Cortinarius | immissus | | Schläpf.-Bernh. | Cortinarius claricolor fo. in | Cortinaire à chapeau roux foncé | 777 |
| Cortinarius | impennis | | Fr. | | Cortinaire à chapeau lisse | 778 |
| Cortinarius | incisior | | Bidaud, Moëgne-Loccoz, Reumaux & Henry | | Cortinaire à marge du chapeau incisée. | 3741 |
| Cortinarius | incisus | | (Pers.) Fr. | | Cortinaire à chapeau incisé | 779 |
| Cortinarius | inconspicuus | | J. Favre | Cortinarius erubescens | Cortinaire rougissant | 711 |
| Cortinarius | infractus | | (Pers.) Fr. | Cortinarius obscurocyaneu | Cortinaire à marge brisée | 781 |
| Cortinarius | infractus | var. olivellus | M.M. Moser | | Cortinaire à chapeau gris vert olivâtre | 782 |
| Cortinarius | intermedius | | Rob. Henry | | C. intermédiaire entre C. splendens et claroflavus | 785 |
| Cortinarius | ionophyllus | | M.M. Moser | | Cortinaire à lames violettes | 787 |
| Cortinarius | isabellinus | | (Batsch) Fr. | | Cortinaire de couleur isabelle | 789 |
| Cortinarius | junghuhnii | | Fr. | | Cortinaire de Junghuhn | 790 |
| Cortinarius | lacustris | | Moëgne-Locc. & | Cortinarius altae-herbae | Cortinaire des étangs | 791 |
| Cortinarius | lacustris | fo. alboannulatus | Moëgne-Locc. & Reumaux | | Cortinaire des étangs à anneau blanc | 792 |
| Cortinarius | laniger | | Fr. | | Cortinaire à pied laineux | 793 |
| Cortinarius | largus | | Fr. | Cortinarius lividoviolaceus | Cortinaire à voile abondant | 794 |
| Cortinarius | latobalteatus | | (Jul. Schäff.) M.M. | Phlegmacium latobalteatu | Cortinaire voilée de blanc | 795 |
| Cortinarius | latus | | (Pers.) Fr. | | Cortinaire large | 796 |
| Cortinarius | lebretonii | | Quél. | | Cortinaire de Lebreton | 797 |
| Cortinarius | leproleptopus | | Chevassut & Rob. Henry | | Cortinaire à pied grêle | 800 |
| Cortinarius | leptocephalus | | Rob. Henry | | Cortinaire à chapeau lisse | 801 |
| Cortinarius | leucopus | | (Bull.) Fr. | | Cortinaire à pied blanc | 803 |
| Cortinarius | lignicola | | Bidaud | | Cortinaire lignicole | 3682 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|---|--|------|
| Cortinarius | lividomalvaceus | | Eyssart., Trendel, L. Albert & Dima | Cortinaire mauve et livide | 806 |
| Cortinarius | lubricus | | Poirier & Reumaux | Cortinaire à chapeau lubrifié | 3683 |
| Cortinarius | lucorum | | (Fr.) P. Karst. Cortinarius umidicola | Cortinaire des peupliers | 807 |
| Cortinarius | luteoperonatus | | Bidaud & Cheype | Cortinaire à pied ornementé de jaune | 809 |
| Cortinarius | mairei | | M.M. Moser | Cortinaire de Maire | 812 |
| Cortinarius | malachus | | (Fr.) Fr. | Cortinaire mauve | 813 |
| Cortinarius | malicorius | | Fr. Cortinarius croceifolius | Cortinaire à chair olive | 814 |
| Cortinarius | melanotus | | Kalchbr. | Cortinaire à squames brunes | 816 |
| Cortinarius | metrodi | | Rob. Henry | Cortinaire de Metrod | 819 |
| Cortinarius | mucifluoides | | Rob. Henry | Sosie de Cortinarius mucifluus | 822 |
| Cortinarius | mucifluus | | Fr. | Cortinaire à mucus fluide | 823 |
| Cortinarius | mucosoamarissimus | | Rob. Henry | Cortinaire à viscosité très amère | 824 |
| Cortinarius | mucosus | | (Bull.) J.J. Kickx | Cortinaire muqueux | 825 |
| Cortinarius | multivagus | | Britzelm. | Cortinaire inconstant | 827 |
| Cortinarius | muricinus | | Fr. | Cortinaire pourpre violacé | 828 |
| Cortinarius | myxoanomalus | | Kühner | Cortinaire à bracelets visqueux | 831 |
| Cortinarius | nanceiensis | | Maire | Cortinaire de Nancy | 832 |
| Cortinarius | nigrocupidatus | | Kauffman Cortinarius flexipes var. inc | Cortinaire pailleté inodore | 726 |
| Cortinarius | niveotraganus | | Kytov. | Sosie de Cortinarius traganus | 836 |
| Cortinarius | nothosanius | | M.M. Moser | Cortinaire mamelonné à voile abondant | 837 |
| Cortinarius | obtusus | | (Fr.) Fr. | Cortinaire obtus | 841 |
| Cortinarius | occidentalis | var. obscurus | (M.M. Moser) Quadr. | Variété sombre de cortinarius occidentalis | 843 |
| Cortinarius | odorifer | var. luteolus | M.M. Moser | Forme jaune de Cortinarius odorifer | 848 |
| Cortinarius | olidoamarus | fo. valentinus | Mahiques & A. Favre | Variété à voile très développé | 851 |
| Cortinarius | olivaceofuscus | | Kühner Cortinarius carpineti | Cortinaire du charme | 854 |
| Cortinarius | olivascens | | (Batsch) Fr. | Cortinaire olivâtre | 856 |
| Cortinarius | opimus | | Fr. | Cortinaire obèse | 858 |
| Cortinarius | oreinus | | (Rob. Henry ex F Cortinarius alutaceofulvus | Cortinaire montagnard | 859 |
| Cortinarius | orellanus | | Fr. | Cortinaire couleur de rocou | 860 |
| Cortinarius | orichalceus | | Rob. Henry | Cortinaire cuivré | 861 |
| Cortinarius | osmophorus | | P.D. Orton Cortinarius evosmus | Cortinaire à odeur de fleur d'oranger | 862 |
| Cortinarius | pallidogriseus | | (Rob. Henry) Bid Cortinarius infractus var. p | Cortinaire gris pâle | 863 |
| Cortinarius | parafulmineus | | Rob. Henry | Voisin de Cortinarius fulmineus | 867 |
| Cortinarius | paragaudis | | Fr. | Cortinaire à pied chiné de rouge | 868 |
| Cortinarius | paramoenolens | | Rob. Henry | Voisin de Cortinarius amoenolens | 869 |
| Cortinarius | parevernus | | Rob. Henry | Voisin de Cortinarius evernius | 870 |
| Cortinarius | parherpeticus | | Rob. Henry | Voisin de Cortinarius herpeticus | 871 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|------|
| Cortinarius | parvannulatus | | Kühner | Cortinarius cedriolens | Cortinaire à odeur de bois de cèdre | 872 |
| Cortinarius | pavonius | | Fr. | | Cortinaire superbe | 873 |
| Cortinarius | paxilloides | | (M.M. Moser) M.M. Moser | | Cortinaire ressemblant à un Paxille | 874 |
| Cortinarius | pescolanensis | | Picillo & Marchi | Cortinarius mellinusCortin | Cortinaire couleur de miel | 818 |
| Cortinarius | petroselinus | | Chevassut & Rob. Henry | | Cortinaire à odeur de persil | 876 |
| Cortinarius | petroselinus | | Chevassut & Rob. Henry | | Cortinaire à odeur de persil | 956 |
| Cortinarius | phaeochrous | | J. Favre | | Cortinaire brunâtre | 877 |
| Cortinarius | phaeopygmaeus | | J. Favre | | Cortinaire nain brun foncé | 878 |
| Cortinarius | pholideus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à armille écailleuse | 880 |
| Cortinarius | pilatii | | Svrcek | | Cortinaire de Pilat | 881 |
| Cortinarius | pistorius | | Jül. Schaff. | | Cortinaire à odeur de pain frais | 883 |
| Cortinarius | plumbosus | | Fr. | | Cortinaire couleur de plomb | 885 |
| Cortinarius | plumiger | | Fr. | | Cortinaire à chapeau méchuleux | 886 |
| Cortinarius | poecilopus | | Rob. Henry | | Cortinaire à pied bulbeux | 889 |
| Cortinarius | polaris | | Hoil. | | Cortinaire nordique | 890 |
| Cortinarius | polychrous | | Rob. Henry | Cortinarius herpeticus var. | Cortinaire multicolore | 891 |
| Cortinarius | polymorphus | | Rob. Henry | Cortinarius luteoimmargin | Cortinaire polymorphe | 892 |
| Cortinarius | poppyzon | | Melot | | Cortinaire à chapeau fauve ochracé | 893 |
| Cortinarius | praestans | | Fr. | | Cortinaire remarquable | 896 |
| Cortinarius | praestigiosus | | (Fr.) M.M. Moser | | Cortinaire trompeur | 897 |
| Cortinarius | privignofulvus | | Rob. Henry | | Cortinaire aux couleurs fauves | 900 |
| Cortinarius | privignoides | | Rob. Henry | | Sosie de Cortinarius privignus | 901 |
| Cortinarius | privignus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à pied napiforme | 903 |
| Cortinarius | psammocephalus | | Bull. | | Cortinaire à chapeau méchuleux | 904 |
| Cortinarius | pseudocyanites | | Rob. Henry ex Bidaud & Reumaux | | Faux cortinarius cyanites | 907 |
| Cortinarius | pseudodionysae | | Bidaud | | Faux cortinarius dionysae | 908 |
| Cortinarius | pseudofulmineus | | Rob. Henry | | Faux cortinaire fulmineus | 909 |
| Cortinarius | pseudogracilior | | Reumaux | | Faux cortinaire gracilior | 910 |
| Cortinarius | pseudomalachus | | Reumaux | | Faux Cortinarius malachus | 911 |
| Cortinarius | pseudophlegmus | | Rob. Henry | | Cortinaire à chapeau très hygrophane | 913 |
| Cortinarius | pseudorubricosus | | Reumaux | | Faux cortinaire rubricosus | 915 |
| Cortinarius | pseudorugulosus | | Rob. Henry | | Faux cortinaire rugulosus | 916 |
| Cortinarius | pseudosalor | | J.E. Lange | | Faux cortinaire salor | 917 |
| Cortinarius | pseudovenetus | | Rob. Henry | | Cortinaire proche de Cortinarius venatus | 3684 |
| Cortinarius | psittacinus | | M.M. Moser | | Cortinaire perroquet | 918 |
| Cortinarius | pulchripes | | J. Favre | | Cortinaire à beau pied | 919 |
| Cortinarius | pulverobtusus | | Rob. Henry | | Cortinaire à chapeau obtus et voilé | 920 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----|
| Cortinarius | purpureus | | (Bull.) Bidaud. M | Cortinarius phoeniceus | Cortinaire de Phénicie | 879 |
| Cortinarius | quarciticus | | Lindstr. | Cortinarius malachus sens | Cortinaire des pins | 924 |
| Cortinarius | rapaceus | | Fr. | | Cortinaire rapace | 928 |
| Cortinarius | raphanoides | | Pers. | | Sosie de Cortinarius raphanicus | 930 |
| Cortinarius | rheubarbarinus | | Rob. Henry | | Cortinaire à odeur de rhubarbe | 933 |
| Cortinarius | rickenii | | Rob. Henry | Cortinarius trivialis var. ric | Cortinaire de Ricken | 934 |
| Cortinarius | rigens | | (Pers.) Fr. | | Cortinaire à pied raide | 935 |
| Cortinarius | rigidus | | (Scop.) Fr. | | Cortinaire rigide | 936 |
| Cortinarius | romagnesii | | Rob. Henry | | Cortinaire de Romagnesi | 937 |
| Cortinarius | roseolimbatus | | Secr. ex Quél. | | Cortinaire à pied voilé de rose | 938 |
| Cortinarius | rubellopes | | Rob. Henry | | Cortinaire à pied rougeâtre | 939 |
| Cortinarius | rubellus | | Cooke | Cortinarius orellanoidesCo | Cortinaire très joli | 976 |
| Cortinarius | rubricosus | | (Fr.) Fr. | Cortinarius safranopes | Cortinaire couleur de brique | 941 |
| Cortinarius | rufoolivaceus | | Pers. | | Cortinaire roux olivâtre | 943 |
| Cortinarius | rufoolivaceus | var. pallidus | (M.M. Moser) M.M. Moser ex Quadr. | | Variété pâle de Cortinarius rufoolivaceus | 944 |
| Cortinarius | rufoolivaceus | var. vinosus | (Cooke) Moëgne-Locc. & Reumaux | | Cortinaire rufoolivaceus à lames violacées | 945 |
| Cortinarius | rugosus | | Rob. Henry | | Cortinaire ridé | 946 |
| Cortinarius | russeus | | Rob. Henry | | Cortinaire rouge foncé | 947 |
| Cortinarius | rusticus | | P. Karst. | Cortinarius canabarba | Cortinaire à voile très épais | 629 |
| Cortinarius | sacchariosmus | | Bon | | Cortinaire à odeur d'iris | 948 |
| Cortinarius | salmoneobasalis | | Bidaud | | Cortinaire à mycélium rose saumon | 951 |
| Cortinarius | salor | | Fr. | | Cortinaire bleu outremer | 952 |
| Cortinarius | sanguineus | | (Wulfen) Gray | Cortinarius cruentus - Cort | Cortinaire sanguin | 953 |
| Cortinarius | saniosus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire des bourbiers | 954 |
| Cortinarius | saturatus | | J.E. Lange | | Cortinaire saturé | 955 |
| Cortinarius | saturninus | | (Fr.) Fr. | Cortinarius salicis - Cortina | Cortinaire à chair violacée | 957 |
| Cortinarius | scandens | | Fr. | | Cortinaire à pied évasé | 958 |
| Cortinarius | scaurotraganoides | | Rob. Henry | | Sosie de Cortinarius scaurus | 959 |
| Cortinarius | scobinaceus | | Malençon & Bertault | | Cortinaire finement squamuleux | 961 |
| Cortinarius | scutulatus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à odeur de rave | 962 |
| Cortinarius | sebaceus | | Fr. | | Cortinaire sébacé | 963 |
| Cortinarius | sejonctifolius | | Rob. Henry | Cortinarius raphanicus | Cortinaire à forte odeur de rave | 929 |
| Cortinarius | semisanguineus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire semi-sanguin | 965 |
| Cortinarius | septentrionalis | | E. Bendiks, K. Bendiks & brandr. | | Cortinaire septentrionalis | 966 |
| Cortinarius | silvae-monachi | | (Reid, Murton & Westwood) Melot | | Cortinaire de la forêt des moines | 967 |
| Cortinarius | solis-occasus | | Melot | | Cortinaire coucher de soleil | 970 |
| Cortinarius | solitarius | | Rob. Henry | | Cortinaire solitaire | 971 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---|------|
| Cortinarius | sordescens | | Rob. Henry | Cortinarius aprinus | Cortinaire gris brunâtre sale | 972 |
| Cortinarius | sordescentipes | | Bidaud et al. | | Cortinaire à pied sordescent | 973 |
| Cortinarius | spadicellus | | (M.M. Moser) Brandrud | | Cortinaire couleur de datte | 974 |
| Cortinarius | spadiceus | | Fr. | | Cortinaire brun châtain | 975 |
| Cortinarius | sphagneti | | P.D. Orton | Cortinarius palustris var. sp | Cortinaire des sphaignes | 978 |
| Cortinarius | spilomeus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à pied guirlandé | 979 |
| Cortinarius | stemmaus | | Fr. | | Cortinaire à pied chiné | 982 |
| Cortinarius | stenospermus | | Lamoure | Cortinarius diasemosperm | Cortinaire à spores étroites | 983 |
| Cortinarius | stillatitius | | Fr. | Cortinarius integerrimus | Cortinaire dégoulinant | 984 |
| Cortinarius | strenuipes | | Rob. Henry | | Cortinaire à pied vigoureux | 985 |
| Cortinarius | striaepileus | | J. Favre | | Cortinaire à chapeau strié | 986 |
| Cortinarius | strobilaceofulvus | | D. Antonini & M. Antonini | | Cortinaire à fines écailles brunâtres | 987 |
| Cortinarius | subbalaustinus | | Rob. Henry | | Proche de cortinarius balaustinus | 989 |
| Cortinarius | subbuliardioides | | Rob. Henry | | Cortinaire ressemblant à Cortinarius bulliardii | 3685 |
| Cortinarius | subferrugineoides | | Reumaux | Cortinarius disjungendus | Proche de Cortinarius ferrugineoides | 992 |
| Cortinarius | subferrugineus | | (Batsch) Fr. | | Proche de Cortinarius ferrugineus | 993 |
| Cortinarius | subhygrophanicus | | (M.M. Moser) M.M. Moser | | Proche de Cortinarius hygrophanicus | 997 |
| Cortinarius | subionochlorus | | (M.M. Moser) M.M. Moser | | Proche de Cortinarius ionochlorus | 998 |
| Cortinarius | sublanatus | | (Sowerby) Fr. | | Proche de Cortinarius lanatus | 999 |
| Cortinarius | submelanotus | | Bidaud | | Cortinaire sosie de Cortinarius melanotus | 3686 |
| Cortinarius | submyrtilinus | | Britzelm. | | Cortinaire des myrtilles | 3864 |
| Cortinarius | subtortus | | (Persoon) Zawal | Cortinarius opimatus | Cortinaire jaune olivacé | 3687 |
| Cortinarius | subtorvus | | (Pers.) Fr. | | Proche de Cortinarius torvus | 1002 |
| Cortinarius | subvalidus | | Rob. Henry | | Proche de Cortinarius validus | 1004 |
| Cortinarius | subviolascens | | Rob. Henry ex Nezdobjm. | | Proche de Cortinarius violascens | 1005 |
| Cortinarius | suillus | | Fr. | | Cortinaire de porc | 1006 |
| Cortinarius | sulphurinus | | Quéf. | | Cortinarius sulfurin | 1007 |
| Cortinarius | sulphurinus | var. fageticola | Brandr. | | Variété du hêtre de Cortinarius sulphurinus | 1008 |
| Cortinarius | tabularis | | (Fr.) Fr. | Cortinarius decoloratus | Cortinaire en forme de table | 1009 |
| Cortinarius | tigrinipes | | Bergeron | | Cortinaire à pied tigré | 1012 |
| Cortinarius | tiliaceus | | Arnolds | | Cortinaire à odeur pèlargoninée | 1013 |
| Cortinarius | tophaceoides | | M.M. Moser | | Semblable à Cortinarius tofaceus | 1017 |
| Cortinarius | tortuosus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire sinueux | 1018 |
| Cortinarius | torvus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à chaussettes | 1019 |
| Cortinarius | traganus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire à odeur de poire | 1020 |
| Cortinarius | transiens | | (Melot) Soop | Cortinarius salor subsp. tra | Cortinaire aux couleurs variables | 1022 |
| Cortinarius | triformis | | Fr. | Cortinarius melleopallens | Cortinaire tricolore | 1023 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|------|
| Cortinarius | trivialis | | J.E. Lange | Cortinarius collinitus | Cortinaire trivial | 1025 |
| Cortinarius | trossingenensis | | Melot | Cortinarius hebes | | 3742 |
| Cortinarius | tubarius | | Ammirati & A.H. | Cortinarius sphagnogenus | Cortinaire des sphaignes | 1026 |
| Cortinarius | turbinatus | | (Bull.) Fr. | | Cortinaire turbiné | 1027 |
| Cortinarius | turgidus | | Fr. | Cortinarius ornithopus | Cortinaire à pied renflé | 1028 |
| Cortinarius | turibulosus | | (Schaeff.) E. Hor | Cortinarius scriptor | Cortinaire à odeur d'encens | 1029 |
| Cortinarius | uliginosus | | Berk. | Cortinarius concinnus | Cortinaire des marais | 1031 |
| Cortinarius | umbrinolens | | P.D. Orton | | Cortinaire terre d'ombre | 1032 |
| Cortinarius | uraceovernus | | Rob. Henry ex A. | Favre & Vialard | Cortinaire printanier à pied voilé de blanc | 3688 |
| Cortinarius | uraceus | | Fr. | Cortinarius rigidipes | Cortinaire brûlé | 1033 |
| Cortinarius | urbicus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire citadin | 1034 |
| Cortinarius | vaginatopus | | Bidaud, Moëne | Cortinarius volvatus sensu | Cortinaire volvé | 1035 |
| Cortinarius | valgus | | Fr. | Cortinarius camurus - Cort | Cortinaire à pied bancal | 1036 |
| Cortinarius | varicolor | | (Pers.) Fr. | Cortinarius largiusculus - C | Cortinaire de couleur variable | 1037 |
| Cortinarius | varius | | (Schaeff.) Fr. | | Cortinaire variable | 1040 |
| Cortinarius | venetus | | (Fr.) Fr. | | Cortinaire vert olive | 1041 |
| Cortinarius | venetus | var. viridis | Moëne-Locc. | | Variété vert jaune de Cortinarius venetus | 1042 |
| Cortinarius | venustus | | P. Karst. | Cortinarius calopus | Cortinaire élégant | 1043 |
| Cortinarius | veraprilis | | Chevassut, Rob. Henry & Rioussset | | Cortinaire d'Avril | 1044 |
| Cortinarius | veregregius | | Rob. Henry | | Cortinaire vraiment remarquable | 1045 |
| Cortinarius | versicolor | | A. Blytt | | Cortinaire versicolore | 1046 |
| Cortinarius | violaceus | | (L.) Gray | | Cortinaire violet | 1050 |
| Cortinarius | violilamellatus | | A. Pearson ex P. | Cortinarius flexipes var. vic | Petit cortinaire des pins | 1051 |
| Cortinarius | viridicaeruleus | | Chevassut & Rol | Cortinarius versicolorum | Cortinaire jaune olivâtre | 1052 |
| Cortinarius | viridipes | | M.M. Moser | | Cortinaire à pied vert | 1053 |
| Cortinarius | vitiosus | | (M.M. Moser) Niskanen et al. | | Cortinaire trompeur | 1054 |
| Cortinarius | xanthocephalus | | P.D. Orton | Cortinarius diabolicus sens | Cortinaire à chapeau jaune | 1056 |
| Cortinarius | xanthophyllus | var. corsicoamethystinus | Chevassut, Rob. Henry & Tristani | | Variété corse à chapeau améthyste | 1060 |
| Cortinarius | zinziberatus | | (Scop.) Fr. | | Cortinaire couleur de gingembre | 1061 |
| Cotylidia | pannosa | | (Sowerby) D.A. Reid | | Cotylidie épanouie | 1063 |
| Cotylidia | undulata | | (Fr.) P. Karst. | | Cotylidie ondulée | 1064 |
| Craterellus | cornucopioides | | Pers. | Cantharellus cornucopioid | Trompette des morts | 1066 |
| Craterellus | cornucopioides | fo. lutea | Aramendi & Hidalgo | | Trompette des morts forme jaune | 1067 |
| Craterellus | konradii | | Bourdot & Maire | | Craterelle de Konrad | 1071 |
| Craterellus | lutescens | | Pers. | Cantharellus lutescens - Ca | Chanterelle jaunissante | 1072 |
| Craterellus | lutescens | fo. luteocomus | (Bigelow) Eyssar | Cantharellus luteocomus | Craterelle lutescens forme jaune | 1073 |
| Craterellus | lutescens | fo. niveipes | (Schild & Wafler) Vila | | Craterelle lutescens à pied blanc | 1074 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|--|------|
| Craterellus | lutescens | var. albidus | (Bon & Pacaud) Vila | Craterelle lutescens variété blanche | 1075 |
| Craterellus | sinuosus | var. crispus | (Fr.) Quél. | Craterelle sinueuse à chapeau crispé | 1078 |
| Craterellus | sinuosus | var. luteolus | (Bon, F. Massart) | Pseudocraterellus undulatus Craterelle sinueuse jaune pâle | 1079 |
| Craterellus | tubaeformis | | Bull. | Cantharellus tubaeformis - Chanterelle en tube | 1080 |
| Craterellus | tubaeformis | fo. pallidus | (Gillet) Vila | Cantharellus tubaeformis var. pallidus Chanterelle en tube forme jaune pâle | 1081 |
| Craterellus | undulatus | | (Pers.) E. Camp | Craterellus sinuosus Craterelle sinueuse | 1077 |
| Crepidotus | applanatus | | (Pers.) P. Kumm. | Crépidote aplani | 1083 |
| Crepidotus | autochthonus | | J.E. Lange | Crepidotus fragilis Crépidote terrestre | 1084 |
| Crepidotus | bresadolae | | Pilát | Crepidotus pubescens - Crépido Crépidote de Bresadola | 1085 |
| Crepidotus | brunneoroseus | | Courtec. | Crépidote brun rose | 1086 |
| Crepidotus | calolepis | | (Fr.) P. Karst. | Crepidotus mollis var. calolepis Crépidote à belle écailles | 1087 |
| Crepidotus | carpaticus | | Pilát | Crépidote des Carpates | 1088 |
| Crepidotus | caspari | | Velen. | Crepidotus lundellii Crépidote de Lundell | 1095 |
| Crepidotus | cesatii | | (Rabenh.) Sacc. | Crépidote à spores sphériques | 1089 |
| Crepidotus | cinnabarinus | | Peck | Crépidote rouge cinabre | 1090 |
| Crepidotus | crocophyllus | | (Berk.) Sacc. | Crepidotus nephrodes sensu lato Crépidote à lames safranées | 1091 |
| Crepidotus | ehrendorferi | | Hauskn. & Krisai | Crépidote abricot | 1092 |
| Crepidotus | epibryus | | (Fr.) Fr. | Pleurotellus hypnophilus Crépidote des mousses | 1093 |
| Crepidotus | kubickae | | Pilát | Crepidotus cesatii var. subsp. kubickae Crépidote de Kubicka | 1094 |
| Crepidotus | luteolus | | (Lambotte) Sacc. | Crépidote jaune pâle | 1097 |
| Crepidotus | luteolus | | Sacc. | Crepidotus luteolus var. curvatus Crépidote jaunâtre | 3743 |
| Crepidotus | macedonicus | | Pilát | Crépidote de Macédoine | 1098 |
| Crepidotus | malachioides | | Consiglio, Prydiuk & Setti | Proche de Crepidotus malachius | 1099 |
| Crepidotus | malachius | | (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. | Crépidote mauve | 1100 |
| Crepidotus | mollis | | (Schaeff.) Staude | Crépidote gélatineux | 1101 |
| Crepidotus | neotrichocystis | | Consiglio & Setti | Crepidotus variabilis var. tricolor Crépidote des cistes | 1102 |
| Crepidotus | roseornatus | | Pöder & Ferrari | Crépidote à chapeau rose | 1103 |
| Crepidotus | variabilis | | Pers. | Crépidote variable | 1104 |
| Crinipellis | mezzanensis | | Antonin et al. | Marasme de la vallée de Mezzano | 1105 |
| Crinipellis | sardoa | | Candusso | Marasme sarde | 1106 |
| Crinipellis | scabella | | (Alb. & Schwein.) Singer | Crinipellis stipitaria - Collybia Marasme des chaumes | 1107 |
| Crinipellis | subtomentosa | | (Peck) Singer | Crinipellis mauretana Marasme subtomenteux | 1108 |
| Crucibulum | laeve | | (Huds.) Kambly | Crucibulum lisse | 1110 |
| Cryptomarasmius | corbariensis | | (Roum.) T.S. Jenkinson & Desjardin | Marasme des feuillus sempervirents | 1111 |
| Cryptomarasmius | minutus | | (Peck) T.S. Jenkinson | Marasmius capillipes Marasme à pied filiforme | 1112 |
| Crystallicutis | serpens | | (Tode) El-Gharrab | Merulius serpens - Ceraceae Mérule rampante | 328 |
| Cudonia | circinans | | (Pers.) Fr. | Cudonie à chapeau sinueux | 1113 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
| Cudonia | confusa | | Bres. | | Cudonie confuse | 1114 |
| Cudoniella | clavus | | (Alb. & Schwein.) | Dennis | Cudonie en forme de clou | 1115 |
| Cuphophyllus | borealis | | (Peck) Bon ex Cc | Camarophyllus borealis - H | Hygrophore boréal | 1117 |
| Cuphophyllus | colemannianus | | (A. Bloxam) Bon | | Hygrophore de Coleman | 1119 |
| Cuphophyllus | flavipes | | (Britzelm.) Bon | | Hygrophore à pied jaune | 1120 |
| Cuphophyllus | fornicatus | | (Fr.) Lodge, Pad | Hygrophorus fornicatus - C | Hygrocybe forniqué | 1700 |
| Cuphophyllus | pratensis | | (Pers.) Bon | Hygrocybe pratensis - Hygr | Hygrophore des prés | 1121 |
| Cuphophyllus | pratensis | var. pallidus | (Cooke) Bon | | Forme blanche de Cuphophyllus pratensis | 1122 |
| Cuphophyllus | russocoriaceus | | (Berk. & Jos. K. N | Hygrophorus russocoriace | Hygrophore à odeur de cuir de Russie | 1123 |
| Cuphophyllus | virgineus | | (Wulfen) Kovale | Hygrocybe virginea - Cuph | Hygrophore virginal | 1124 |
| Cuphophyllus | virgineus | var. fuscescens | (Bres.) E. Camp | Cuphophyllus fuscescens | Variété brunâtre de Cuphophyllus virgineus | 1125 |
| Cuphophyllus | virgineus | var. ochraceopallidus | (P.D. Orton) E. C | Cuphophyllus ochraceopal | Cuphophyllus virgineus variété brun ochracé | 1126 |
| Cupreoboletus | poikilochromus | | (Pöder et al.) Viz | Boletus poikilochromus | Bolet multicolore | 1127 |
| Cyanoboletus | pulverulentus | | (Opat.) Gelardi, | Xerocomus pulverulentus - | Bolet pulvérulent | 1128 |
| Cyanosporus | caesius | | (Schrad.) Mc Gir | Postia caesia - oligoporus c | Polypore bleuté des conifères | 2617 |
| Cyanosporus | luteocaesius | | (A. David) B.K. C | Postia luteocaesia - Oligop | Polypore jaune bleuissant | 2618 |
| Cyanosporus | mediterraneocaesius | | (M. Pieri & B. Ri | Oligoporus mediterraneoc | Polypore gris bleuté | 2885 |
| Cyathicula | cyathoidea | | (Bull.) Thüm. | | Cyathicule des ombellifères | 1129 |
| Cyathus | olla | | (Batsch : Pers.) | Pers. | Cyathe en forme de vase | 1130 |
| Cyathus | stercoreus | | (Schwein.) De Toni | | Cyathe coprophile | 1131 |
| Cyathus | striatus | | (Huds. : Pers.) | Pers. | Cyathe strié | 1132 |
| Cyclocybe | cylindracea | | (DC) Vizzini & Ar | Agrocybe aegerita - Agrocy | Pholiote du peuplier | 1133 |
| Cyclocybe | erebia | | (DC) Vizzini & Ar | Agrocybe erebia - Pholiota | Agrocybe brunâtre | 1134 |
| Cyclocybe | erebioides | | Angelini & Vizzini | | Semblable à Cyclocybe erebia | 1135 |
| Cylindrobasidium | evolvens | | (Fr.) Jülich | | Corticium étalé | 1136 |
| Cyptotrama | fagiphila | | Vila et al. | | Collybie du hêtre | 1137 |
| Cystinarius | crassus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius crassus | Cortinaire charnu | 665 |
| Cystinarius | pseudocrassus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius pseudocrassus | Faux Cortinarius crassus | 906 |
| Cystinarius | rubicundulus | | (Rea) Niskanen & | Cortinarius pseudobolaris - | Cortinaire rubicond | 940 |
| Cystoagaricus | hirtosquamulosus | | (Peck) Orstadius | Psathyrella hirtosquamulo | Psathyrelle à chapeau méchuleux | 1138 |
| Cystoagaricus | silvestris | | (Gillet) Orstadiu | Psathyrella silvestris - Psat | Psathyrelle des bois | 1139 |
| Cystoderma | amianthinum | | (Scop.) Fayod | | Cystoderme furfuracé | 1140 |
| Cystoderma | amianthinum | fo. album | (Maire) Locquin | | Cystoderme furfuracé forme blanche | 1141 |
| Cystoderma | amianthinum | fo. rugosoreticulatum | (F. Lorinser) A.H | Cystoderma amianthinum | Cystoderme à chapeau ridé | 3689 |
| Cystoderma | carcharias | | (Pers.) Fayod | | Cystoderme à dents de requin | 1142 |
| Cystoderma | fallax | | A.H. Sm. & Singe | Cystoderma carcharias var | Cystoderme trompeur | 1143 |
| Cystoderma | jasonis | | (Cooke & Masee | Cystoderma longisporum | Cystoderme de Jason | 1144 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| Cystoderma | lilacipes | | Harmaja | Cystoderma jasonis var. lil | Cystoderme de Jason à pied lilas | 1145 |
| Cystoderma | niveum | | Harmaja | Cystoderma jasonis var. ni | Cystoderme de Jason variété blanche | 1146 |
| Cystoderma | saarenoksae | | Harmaja | Cystoderma jasonis var. sa | Cystoderme de Jason à chapeau lisse | 1147 |
| Cystoderma | subvinaceum | | A.H. Sm. | | Cystoderme brun vineux | 1148 |
| Cystoderma | superbum | | Huijsman | | Cystoderme superbe | 1149 |
| Cystodermella | ambrosii | | (Bres.) I Saar | Cystoderma granulosa var. | Cystoderme d'Ambrosi | 1152 |
| Cystodermella | cinnabarina | | (Alb. & Schwein | Cystoderma terreyi sensu a | Cystoderme cinabre | 1150 |
| Cystodermella | granulosa | | (Batsch) Harmaj | Cystodermella granulorum | Cystoderme granuleux | 1151 |
| Cystolepiota | adulterina | | (F.H. Møller) Bo | Lepiota adulterina | Lépiote adultérine | 1153 |
| Cystolepiota | adulterina | var. reidii | (Bon) Bon | | Lépiote adultérine variété rose | 1154 |
| Cystolepiota | bucknallii | | (Berk. & Broome) Singer & Cléménçon | | Lépiote soufrée | 1155 |
| Cystolepiota | cystophora | | (Malençon) Bon | | Lépiote des chênes verts | 1156 |
| Cystolepiota | hetieri | | (Boud.) Singer | Lepiota rufescens | Lépiote de Hétier | 1157 |
| Cystolepiota | moelleri | | Knudsen | Cystolepiota rosea | Lépiote rose | 1158 |
| Cystolepiota | pulverulenta | | (Huijsman) Velli | Pulverolepiota pulverulenta | Lépiote pulvérulente | 2959 |
| Cystolepiota | seminuda | | (Lasch) Bon | Cystolepiota sistrata | Lépiote demie-nue | 1159 |
| Cystolepiota | sinopica | | (Romagn.) Bon | Lepiota sinopica - Echinode | Lépiote couleur de brique | 1216 |
| Cystostereum | murrayi | | (Berk. & M.A. Cl | Stereum murrayi | Stérée de Murray | 1160 |
| Cytidia | salicina | | (Fr.) Burt | Cytidia rutilans | Cytide des saules | 1161 |
| Dacrymyces | minor | | Peck | Dacrymyces deliquescens v | Dacrymyces minuscule | 3744 |
| Dacrymyces | stillatus | | Nees | Dacrymyces deliquescens | Dacrymyces en forme de bouton | 1162 |
| Dacrymyces | stillatus | | Nees | Calloria stillata - Dacrymyc | Dacrymyces en forme de goutte | 3745 |
| Dacrymyces | variisporus | | McNabb | | Dacrymyces à spores variables | 1163 |
| Dacryobolus | karstenii | | (Bres.) Oberw. ex Parmasto | | Dacryobole de Karsten | 1164 |
| Dacryobolus | sudans | | (Alb. & Schwein | Gloeocystidium exsudans - Grandinia agardhiiGrandinia exsudans | | 3746 |
| Dactylosporina | kuehneri | | (Romagn.) R.H. F | Xerula kuehneri - Oudem | Collybie de Kuehner | 3690 |
| Daedalea | quercina | | L. | Lenzites quercinus | Lenzite du chêne | 1165 |
| Daedalea | xantha | | (Fr.) A. Roy & A. | Antrodia xantha | Polypore jaune | 177 |
| Daedaleopsis | confragosa | | (Bolt.) J. Schröt. | Trametes rubescens | Tramète rougissante | 1166 |
| Daedaleopsis | nitida | | (Durieu & Mont | Hexagonia nitida - Apoxon | Polypore nid d'abeilles | 3747 |
| Daedaleopsis | tricolor | | (Bull.) Bondrtsev | Daedaleopsis confragosa v | Tramète tricolore | 1167 |
| Daldinia | childiae | | J.D. Rogers & Y.M. Ju | | Daldinie de Child | 1168 |
| Daldinia | concentrica | | (Bolton) Ces. & De Not. | | Daldinie concentrique | 1169 |
| Daldinia | fissa | | C.G. Lloyd | | Daldinie fissile | 1170 |
| Daldinia | raimundi | | Stadler, Venturella & Wollweber | | Daldinie de Raimundi | 1171 |
| Daldinia | vernica | | Ces. & De Not. | | Daldinie vernie | 1172 |
| Dasyscyphella | nivea | | (R. Hedw.) Sacc. | Dasyscyphus niveus - Lach | Dasyscyphelle blanc de neige | 1173 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------|
| Deconica | castanella | | (Peck) Noordel. | Psilocybe apeliculosa - Psi | Psilocybe brun roussâtre | 1174 |
| Deconica | coprophila | | Bull. | Psilocybe coprophila | Psilocybe coprophile | 1175 |
| Deconica | crobula | | (Fr.) Romagn. | Psilocybe crobula | Psilocybe à toupet | 1176 |
| Deconica | horizontalis | | (Bull.) Noordel. | Melanotus horizontalis | Deconica en forme de Crépide | 1177 |
| Deconica | inquilina | | (Fr.) Fr. | Psilocybe inquilina | Psilocybe sur végétaux | 1178 |
| Deconica | merdaria | | (Fr.) Fr. | Psilocybe merdaria | Psilocybe des excréments | 1179 |
| Deconica | merdicola | | (Huijsman) Noor | Psilocybe merdicola | Psilocybe du fumier | 1180 |
| Deconica | moelleri | | (Guzman) Noor | Psilocybe moelleriStrophar | Psilocybe de Moeller | 1181 |
| Deconica | montana | | Pers. | Psilocybe atrorufa - Psilocy | Psilocybe montagnard | 1182 |
| Deconica | phillipsii | | (Berk. & Broome | Melanotus phillipsii - Mela | Crépide de Phillips | 1183 |
| Deconica | phyllogena | | (Sacc.) Noordel. | Psilocybe phyllogena - Psilo | Psilocybe des feuilles | 1184 |
| Deconica | xeroderma | | (Huijsman) Noor | Psilocybe xeroderma | Psilocybe à chapeau sec | 1186 |
| Delicatula | integrella | | Pers. | | Mycène blanc pur | 1187 |
| Dendrocollybia | racemosa | | Pers. | Collybia racemosa. | Collybie ramifiée | 1188 |
| Dentipellis | fragilis | | (Pers.) Donk | Dentipellis echinospora - H | Dentipelle fragile | 3748 |
| Dentipratulum | bialoviesense | | Domański | | | 3749 |
| Dermoloma | cuneifolium | | (Fr.) Fr. | Dermoloma atrocinerum | Tricholome à lames triangulaires | 1190 |
| Dermoloma | josserandii | | Dennis ex P.D. C | Dermoloma hygrophorus - | Tricholome de Josserand | 1191 |
| Dermoloma | pseudocuneifolium | | Herink ex Bon | | Sosie de Dermoloma cuneifolium | 1192 |
| Desarmillaria | ectypa | | (Fr.) R.A. Koch & | Armillaria ectypa | Armillaire des sphagnes | 185 |
| Dialonectria | episphaeria | | (Tode) Cooke | Nectria episphaeria | Nectria hôte des pyrénomycètes | 1193 |
| Diatrype | bullata | | (Hoffm.) Fr. | | Diatrype en forme de bulle | 1194 |
| Diatrype | disciformis | | (Hoffm.) Fr. | | Diatrype en forme de disque | 1195 |
| Diatrype | stigma | | (Hoffm.) Fr. | | Diatrype à stroma étalé | 1196 |
| Diatrypella | quercina | | (Pers.) Cooke | | Diatrype du chêne | 1197 |
| Diatrypella | verrucaeformis | | (Ehrh.) Fr. | | Diatrype verruqueux | 1198 |
| Diderma | europareum | | (Buyck) Kuhnt | Diderma globosum var. eu | Diderma européen | 3750 |
| Diplomitoporus | flavescens | | (Bres.) Domanski | | Diplomitopore jaunissant | 1201 |
| Discina | ancilis | | (Pers.) Sacc. | Discina perlata - Gyromitra | Discine perlée | 1202 |
| Discina | gigas | | (Krombh.) Eckbl | Gyromitra gigas | Gyromitre géant | 1524 |
| Discina | melaleuca | | Bres. | | Discine noire et blanche | 1203 |
| Disciotis | venosa | | (Pers.) Boud. | | Pézize veinée | 1204 |
| Dissingia | leucomelaena | | (Pers.) K. Hanse | Acetabula leucomelaena - | Helvelle blanche et noire | 1593 |
| Ditiola | peziziformis | | (Lév.) D.A. Reid | Ditiola pezizaeformis - Fem | Ditiolle en forme de pézize | 1205 |
| Ditiola | radicata | | (Alb. & Schwein | Coryne gyrocephala - Dacr | Ditiola à stipe radica | 3751 |
| Dumontinia | tuberosa | | (Bull.) L.M. Kohr | Sclerotinia tuberosa | Sclérotinie tubéreuse | 1206 |
| Echinoderma | asperum | | Pers. | Lepiota acutesquamosa - C | Lépiote à lames fourchues | 1207 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------|
| Echinoderma | calcicola | | (Knudsen) Bon | Lepiota calcicola | Lépiote des terrains calcaires | 1208 |
| Echinoderma | carinii | | (Bres.) Bon | Lepiota carinii | Lépiote de Carini | 1209 |
| Echinoderma | echinaceum | | (J.E. Lange) Bon | Cystolepiota echinacea - Lepiota | Lépiote épineuse | 1210 |
| Echinoderma | echinaceum | var. cedriolens | Bon | | Lépiote à odeur de bois de cèdre | 1211 |
| Echinoderma | hystrix | | (F.H. Møller & J. | Cystolepiota hystrix | Lépiote hérissée | 1212 |
| Echinoderma | jacobi | | (Vellinga & Knud | Lepiota jacobi - Lepiota lar | Lépiote de Jacob | 1213 |
| Echinoderma | perplexum | | (Knudsen) Bon | Cystolepiota perplexa - Lepiota | Lépiote hispide | 1214 |
| Echinoderma | pseudoasperulum | | (Knudsen) Bon | Lepiota pseudoasperula | Lépiote proche de Lepiota asperula | 1215 |
| Elaphomyces | granulatus | | Fr. | | Truffe des cerfs | 1217 |
| Encoelia | furfuracea | | (Roth) P. Karst. | | Encélie furfuracée | 1218 |
| Entocybe | nitida | | (Quél.) T.J. Baro | Entoloma nitidum | Entolome brillant | 1302 |
| Entocybe | pseudoturbida | | (Romagn.) T.J. B | Entoloma pseudoturbidum | Proche de Entoloma turbidum | 1321 |
| Entocybe | turbida | | Fr.) T.J. Baroni, | Entoloma turbidum | Entolome gris olivâtre | 1347 |
| Entoloma | albotomentosum | | Noordel. et al. | | Entolome blanc et tomenteux | 1219 |
| Entoloma | alliodorum | | Esteve-Rav. et al. | | Entolome à odeur d'ail | 1220 |
| Entoloma | allochrom | | Noordel. | | Entolome de couleurs originales | 1221 |
| Entoloma | alnetorum | | Monthoux & Rö | Entoloma tjallingiorum var | Variété des aulnes | 1346 |
| Entoloma | alpicola | | (J. Favre) Noordel. | | Entolome alpin | 1222 |
| Entoloma | ameides | | (Berk. & Broome) Sacc. | | Entolome à odeur douceâtre | 1223 |
| Entoloma | aprile | | (Britzelm.) Sacc. | | Entolome d'Avril | 1224 |
| Entoloma | araneosum | | (Quél.) M.M. Moser | | Entolome aranéeux | 1225 |
| Entoloma | asprellum | | (Fr.) Fayod | | Entolome ruguleux | 1226 |
| Entoloma | atrosericeum | | (Kühner) Noordel. | | Entolome à chapeau brun noir | 1227 |
| Entoloma | bicorne | | Noordel. | | Entolome à cystides lagéniformes | 1228 |
| Entoloma | bipellis | | Noordel. & Borgen | | Entolome à deux pigments | 1229 |
| Entoloma | bisporigerum | | (P.D. Orton) Noordel. | | Entolome à basides bisporiques | 1230 |
| Entoloma | bloxamii | | (Berk. & Broome) Sacc. | | Entolome de Bloxam | 1231 |
| Entoloma | byssisedum | | Pers. | | Entolome à pied rudimentaire | 1232 |
| Entoloma | caccabus | | (Kühner) Noordel. | | Entolome à chapeau infundibuliforme | 1233 |
| Entoloma | caeruleum | | (P.D. Orton) Noordel. | Leptonia caerulea | Entolome bleu-noir | 3752 |
| Entoloma | caesiocinctum | | (Kühner) Noordel. | | Entolome à marge bleue | 1234 |
| Entoloma | callichroum | | E. Horak & Noordel. | | Entolome aux belles couleurs | 1235 |
| Entoloma | catalaunicum | | (Singer) Noordel. | | Entolome à chapeau rose | 1236 |
| Entoloma | cephalotrichum | | (P.D. Orton) Noordel. | | Entolome à poils capités | 1237 |
| Entoloma | cetratum | | (Fr.) M.M. Moser | Nolanea cetrata | Entolome à chapeau ocellé | 1238 |
| Entoloma | cettoi | | Noordel. et al. | | Entolome dédié à Cetto | 1239 |
| Entoloma | chalybaeum | | (Fr.) Noordel. | | Entolome bleu acier | 1240 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|------------------|--------------------------------|--|---|------|
| Entoloma | chalybaeum | var. lazulinum | (Fr.) Noordel. | Entoloma lazulinum | Entolome à chair bleue | 1241 |
| Entoloma | chionoderma | | (Pilát) Noordel. | Entoloma eximium | Entolome remarquable | 1260 |
| Entoloma | chlorophyllum | | Noordel. | | Entolome vert olive | 1242 |
| Entoloma | chloropolium | | (Fr.) M.M. Moser | | Entolome teinté de vert | 1243 |
| Entoloma | chytrophilum | | Wölfel, Noordel. | Entoloma lepidissimum va | Entolome à lames blanches et chapeau bleu | 1244 |
| Entoloma | cinereo-opacum | | (Noordel.) Vila e | Entoloma terreumEntolom | Entolome gris noir | 1245 |
| Entoloma | clandestinum | | (Fr.) Fr. | | Entolome discret | 1246 |
| Entoloma | clypeatum | | (L.) P. Kumm. | | Entolome en bouclier | 1247 |
| Entoloma | coelestinum | | (Fr.) Hesler | | Entolome élégant | 1248 |
| Entoloma | conferendum | | (Britzelm.) Noor | Entoloma staurosporium | Entolome à spores étoilées | 1249 |
| Entoloma | conicosericeum | | Vila, F. Caball & Eyssart. | | Entolome soyeux conique | 1250 |
| Entoloma | corvinum | | (Kühner) Noordel. | | Entolome couleur de corbeau | 1251 |
| Entoloma | cuneatum | | (Bres.) M.M. Mo | Entoloma cetratum var. cuneatumHyporrhodius cuneatus | | 3753 |
| Entoloma | decastes | | Contu, Consiglio & Noordel. | | Entolome cespiteux | 1252 |
| Entoloma | depluens | | (Batsch) Hesler | | Entolome de la pluie | 1253 |
| Entoloma | dichroum | | Pers. | | Entolome dicolor | 1254 |
| Entoloma | elodes | | (Fr.) P. Kumm. | | Entolome brun violacé | 1255 |
| Entoloma | euchroum | | Pers. | | Entolome violet | 1256 |
| Entoloma | excentricum | | Bres. | | Entolome au pied excentré | 1257 |
| Entoloma | exiguum | | Esteve-Rav et al. | | Entolome minuscule | 1258 |
| Entoloma | exile | | (Fr.) Fr. | | Entolome taché de feu | 1259 |
| Entoloma | formosum | | (Fr.) Fr. | | Entolome fauve | 1261 |
| Entoloma | fuscobrunneipes | | Vila & F. Caball | | Entolome à pied brun sombre | 1262 |
| Entoloma | fuscohebes | | Vila et al. | | Entolome brun sombre | 1263 |
| Entoloma | fuscotomentosum | | F.H. Møller | | Entolome à chapeau sombre et feutré | 1264 |
| Entoloma | griseocyaneum | | (Fr.) P. Kumm. | | Entolome gris cyan | 1265 |
| Entoloma | griseoluridum | | (Kühner) M.M. Moser | | Entolome gris chocolat | 1266 |
| Entoloma | hebes | | (Romagn.) Trimbach | | Entolome à pied grêle | 1267 |
| Entoloma | hirtipes | | (Schumach.) M. | Nolanea hirtipes | Entolome à pied hérissé | 1268 |
| Entoloma | huijsmanii | | Noordel. | | Entolome de Huijsman | 1269 |
| Entoloma | ianthinum | | (Romagn. & J. Favre) Noordel. | | Entolome à chapeau lilas | 1270 |
| Entoloma | incanum | | (Fr.) Fr. | | Entolome à pied vert | 1271 |
| Entoloma | incarnatofuscenscens | | (Britzelm.) Noordel. | | Entolome gris lilas | 1272 |
| Entoloma | infula | | (Fr.) Fr. | | Entolome à chapeau zoné | 1273 |
| Entoloma | infula | var. chlorinosum | (Arnolds & Noordel.) Noordel. | | Entoloma infulum à odeur nitreuse | 1274 |
| Entoloma | inusitatum | | Noordel., Enderle & H. Lammers | | Entolome inusité | 1275 |
| Entoloma | jahnii | | Wölfel & Winterh. | | Entolome de Jahn | 1276 |

| | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--|------|
| Entoloma | jubatum | | (Fr.) Fr. | | Entolome brun rougeâtre | 1277 |
| Entoloma | juncinum | | (Kühner & Romagn.) Noordel. | | Entolome à spores subisodiamétriques | 1278 |
| Entoloma | juniperinum | | Bakman & Noordel. | | Entolome des genévriers | 1279 |
| Entoloma | klofacianum | | Noordel. et al. | | Entolome bleu violacé | 1280 |
| Entoloma | kuehnerianum | | Noordel. | | Entolome dédié à Kuhner | 1281 |
| Entoloma | lampropus | | Pers. | | Entolome à pied brillant | 1282 |
| Entoloma | lanuginosipes | | Noordel. | | Entolome à pied prumineux | 1283 |
| Entoloma | lepidissimum | | (Svrcek) Noordel. | | Entolome gracieux | 1284 |
| Entoloma | lilacinoroseum | | Bon & Guinb. | | Entolome rose lilas | 1285 |
| Entoloma | lividoalbum | | (Kühner & Romagn.) Kubicka | | Entolome à pied blanc | 1286 |
| Entoloma | lividocyanulum | | Noordel. | | Entolome à chapeau brun jaune pâle | 1287 |
| Entoloma | longistriatum | | (Peck) Noordel. | Entoloma sarcitulum | Entolome au chapeau fortement strié | 1288 |
| Entoloma | longistriatum | var. microsporum | (Noordel.) Noordel. | | Variété à petites spores | 1289 |
| Entoloma | longistriatum | var. sarcitulum | (P.D. Orton) Noordel. | | Entolome à lames crénelées | 1290 |
| Entoloma | madidum | | Gillet | | Entolome humide | 1291 |
| Entoloma | mammosum | | (L.) Hesler | | Entolome mamelonné | 1292 |
| Entoloma | mediterraneense | | Noordel & Hauskn. | | Entolome méditerranéen | 1293 |
| Entoloma | minutisporum | | (Vila & Llimona) J. Carbó et al. | | Entolome à petites spores | 1294 |
| Entoloma | minutum | | (P. Karst.) Noordel. | | Entolome miniature | 1295 |
| Entoloma | mougeotii | | (Fr.) Hesler | | Entolome de Mougeot | 1296 |
| Entoloma | mougeotii | var. fuscomarginatum | Noordel. | | Variété à arête des lames brune | 1297 |
| Entoloma | mutabilipes | | Noordel. & Liiv. | | Entolome à pied décolorant | 1298 |
| Entoloma | niphoides | | Romagn. ex Noordel. | | Entolome blanc de neige | 1300 |
| Entoloma | nitens | | (Velen.) Noordel. | | Entolome à reflets soyeux | 1301 |
| Entoloma | ochreoprunuloides | | Morgado & Noo | Entoloma prunuloides var. | Entoloma prunuloides à chapeau brun sombre | 1317 |
| Entoloma | olidum | | Noordel. | | Entolome à odeur désagréable | 1303 |
| Entoloma | olorinum | | (Romagn. & J. Favre) Noordel. | | Entolome blanc de cygne | 1304 |
| Entoloma | papillatum | | (Bres.) Dennis | | Entolome à chapeau papillé | 1305 |
| Entoloma | parasiticum | | (Quél.) Keisel | | Entolome parasite | 1306 |
| Entoloma | percandidum | | Noordel. | | Entolome candide | 1307 |
| Entoloma | placidum | | (Fr.) Fr. | | Entolome placide | 1309 |
| Entoloma | platyphylloides | | (Romagn.) Largent | | Entolome à lames larges | 1310 |
| Entoloma | plebejum | | (Kalchbr.) Nordel. | | Entolome de mai | 1311 |
| Entoloma | pleopodium | | Bull. | Entoloma icterinum | Entolome jaune | 1312 |
| Entoloma | poliopus | | (Romagn.) Noordel. | | Entolome à pied poli | 1313 |
| Entoloma | politum | | (Pers.) Noodel. | Entoloma pernitrosum | Entolome brillant | 1314 |
| Entoloma | porphyrophaeum | | (Fr.) P. Karst. | | Entolome porphyre | 1315 |

| | | | | | |
|----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|
| Entoloma | porphyrophibullosum | Noordel. | Entoloma porphyrofibrillum | 3865 | |
| Entoloma | prunuloides | (Fr.) Fr. | Entolome faux meunier | 1316 | |
| Entoloma | pseudocoelestinum | Arnolds | Proche de Entoloma coelestinum | 1318 | |
| Entoloma | pseudoexcentricum | (Romagn.) Kreisel | Proche de Entoloma excentricum | 1319 | |
| Entoloma | pseudoparasiticum | Noordel. | Proche de Entoloma parasiticum | 1320 | |
| Entoloma | pseudoturci | Noordel. | Proche de Entoloma turci | 1322 | |
| Entoloma | queletii | (Boud.) Noordel. | Entolome de Quélet | 1323 | |
| Entoloma | querquedula | (Romagn.) Noordel. | Entolome couleur sarcelle | 1324 | |
| Entoloma | rhodopolium | (Fr.) P. Kumm. | Entoloma nidorosumEntol | Entolome à chapeau gris brun | 1325 |
| Entoloma | ritae | Noordel. | Entolome de Rita | 1326 | |
| Entoloma | roseum | (Longyear) Hesler | Entolome rose | 1327 | |
| Entoloma | rubellum | (Scop.) Gillet | Entolome rose-rouge | 1328 | |
| Entoloma | rugosum | (Malençon) Bon | Entolome rugueux | 1329 | |
| Entoloma | rusticoides | (Gillet) Noordel. | Entolome campagnard | 1330 | |
| Entoloma | sarcitum | (Fr.) Noordel. | Entolome réactualisé | 1331 | |
| Entoloma | saundersii | (Fr.) Sacc. | Entolome de Saunders | 1332 | |
| Entoloma | saussetiense | Eyssart. & Noordel. | Entolome à long pied | 1333 | |
| Entoloma | scabiosum | (Fr.) Quéél. | Entolome rugueux | 1334 | |
| Entoloma | sepium | (Noulet & Dass.) Richon & Roze | Entolome des haies | 1335 | |
| Entoloma | sericatum | (Britzelm.) Sacc. | Entolome soyeux nitreux | 1336 | |
| Entoloma | sericellum | (Fr.) Fr. | Entolome à pied soyeux | 1337 | |
| Entoloma | sericeoides | (J.E. Lange) Noordel. | Entolome soyeux farineux | 1338 | |
| Entoloma | sericeum | Bull. | Entolome soyeux | 1339 | |
| Entoloma | serrulatum | (Fr.) Hesler | Entolome à arête des lames serrulée | 1340 | |
| Entoloma | sinuatum | Bull. | Entoloma lividum | Entolome livide | 1341 |
| Entoloma | sodale | Noordel. | Entolome bleu des montagnes | 1342 | |
| Entoloma | sordidulum | (Kühner & Romagn.) P.D. Orton | Entolome sordide | 1343 | |
| Entoloma | speculum | (Fr.) Quéél. | Rhodophyllus speculum | Entolome blanc par temps humide | 1344 |
| Entoloma | sphagnorum | (Romagn. & J. F. | Rhodophyllus sphagnorum | Entolome des sphaignes | 3691 |
| Entoloma | testaceum | (Bres.) Noordel. | Entoloma cetratum var. te | Entolome témoin | 3692 |
| Entoloma | tjallingiorum | Noordel. | Entolome à pied squamuleux | 1345 | |
| Entoloma | turci | (Bres.) M.M. Moser | Entolome de Turco | 1348 | |
| Entoloma | undatum | (Fr. ex Gillet) M.M. Moser | Entolome ondoyeux | 1349 | |
| Entoloma | vernum | S. Lundell | Entolome printanier | 1350 | |
| Entoloma | versatile | (Gillet) M.M. Moser | Entolome versatile | 1351 | |
| Entoloma | violaceozonatum | Noordel. & Liiv. | Entolome à chapeau violet et zoné | 1352 | |
| Entoloma | xanthochroum | (P.D. Orton) Noordel. | Entolome jaunâtre | 1353 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|--|-------------------------------------|---|
| Entoloma | xanthoserrulatum | | Noordel. & Vauras | Entolome jaune du groupe serrulatum | 1354 |
| Entoloma | zuccherellii | | (Noordel. & Hau Rhodocybe zuccherellii | Rhodocybe de Zuccherelli | 3019 |
| Epichloe | typhina | | (Pers.) Tul. & C. Tul. | Epichloe des graminées | 1355 |
| Erythricium | laetum | | (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam | Corticium de couleur gaie | 1356 |
| Eutypa | flavovirens | | (Pers.) Tul. & C. Tul. | Eutypa vert et jaune | 1357 |
| Eutypa | spinosa | | (Pers.) Tul. & C. Tul. | Eutypa à surface rugueuse | 1358 |
| Exidia | badioumbrina | | (Bres.) Killerm. | Exidie brun sombre | 1359 |
| Exidia | glandulosa | | (Bull.) Fr. | Exidia truncata | Exidie glanduleuse |
| Exidia | nigricans | | (With.) P. Rober | Exidia pithya - Exidia plana | Exidie noirâtre |
| Exidia | recisa | | (Ditmar) Fr. | | Exidie obconique |
| Exidia | repanda | | Fr. | | Exidie bosselée |
| Exidia | saccharina | | Fr. | | Exidie couleur caramel |
| Exidia | thuretiana | | (Lév.) Fr. | | Exidie de Thuret |
| Exidiopsis | calcea | | (Pers.) K. Wells | Sebacina calcea | Exidiopsis couleur de chaux |
| Exidiopsis | effusa | | (Bref. ex Sacc.) N | Sebacina laccata - Sebacina | Exidiopsis étalé |
| Exobasidium | rhododendri | | (Fuckel) C.E. Cramer | | Exobasidium du rhododendron |
| Exobasidium | vaccinii | | (Fuckel) Woronin | | Exobasidium de l'airielle rouge |
| Exobasidium | vaccinii-uliginosi | | Boud. | | Exobasidium de l'airielle des marais |
| Faerberia | carbonaria | | (Alb. & Schwein | Geopetalum carbonarium | Chanterelle des charbonnières |
| Fayodia | anthracobia | | (J. Favre) Knuds | Fayodia bisphaerigera var. | Omphale des charbonnières |
| Fayodia | bisphaerigera | | (J.E. Lange) Sing | Mycena bisphaerigera - Or | Omphale gracile |
| Fayodia | gracilipes | | (Britzelm.) Bresinsky & Stangl | | Omphale gracile |
| Fistulina | hepatica | | (Schaeff.) With. | | Langue-de-bœuf |
| Flammula | alnicola | | (Fr.) P. Kummer | Pholiota alnicola - Flammula | Flammule des aulnes |
| Flammula | alnicola | var. salicicola | (Fr.) P. Karst. | Pholiota amara | Flammule des saules |
| Flammula | pinicola | | (Jacobson) Jaco | Pholiota pinicola | Flammule des pins |
| Flammulaster | carpophilus | | (Fr.) Earle | Flocculina carpophila | Flammule du hêtre |
| Flammulaster | granulosus | | (J.E. Lange) Watling | | Flammule à chapeau granuleux |
| Flammulaster | limulatus | | (Fr.) Watling | Flammulaster limulatoides | Flammule à chapeau hérissé |
| Flammulaster | muricatus | | (Fr.) Watling | Flammulaster denticulatus | Flammule à chapeau verruqueux |
| Flammulina | elastica | | (Lasch) Redhead & Petersen | | Flammule élastique |
| Flammulina | fennae | | Bas | | 3755 |
| Flammulina | ononidis | | Arnolds | | Flammule de la Bugrane épineuse |
| Flammulina | populicola | | Redhead & Petersen | | Flammule du peuplier |
| Flammulina | velutipes | | (Curtis) Singer | | Collybie à pied velouté |
| Flammulina | velutipes | var. lactea | (Quél.) Bas | | Variété blanche de Flammulina velutipes |
| Floccularia | luteovirens | | (Alb. & Schwein | Floccularia straminea | Flocculaire jaune verdâtre |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|
| Fomes | fomentarius | | Fr. | Ungulina fomentaria | Amadouvier | 1389 |
| Fomes | fomentarius | fo. inzengae | (Ces. et de Not.) | R. Heim | Amadouvier variété de couleurs pâles | 1390 |
| Fomitiporia | hippochaicola | | H. Jahn | Phellinus hippochaicola | Polypore de l'argousier | 1391 |
| Fomitiporia | punctata | | (P.Karst.) Murril | Phellinus friesianus - Phelli | Polypore pointillé | 1392 |
| Fomitiporia | robusta | | (P. Karst.) Fiasso | Phellinus robustus - Polypc | Polypore robuste | 1393 |
| Fomitopsis | betulina | | (Bull.) B.K. Cui, N | Piptoporus betulinus - Poly | Polypore du bouleau | 2814 |
| Fomitopsis | officinalis | | (Vill.) Bondartse | Laricifomes officinalis - Pol | Polypore officinal | 1394 |
| Fomitopsis | pinicola | | (Swartz) P. Karst | Ungulina marginata | Polypore marginé | 1395 |
| Fomitopsis | pinicola | fo. effusa | (Bourdot & Galz | Ungulina marginata | Polypore marginé | 3866 |
| Fomitopsis | pinicola | fo. resupinata | (Bourdot & Galzin) | Bondartsev | Polypore marginé forme résupinée | 1396 |
| Fuligo | septica | var. candida | (Pers.) R.E. Fr. | Fuligo septica fo. candida | Fleur de Tan var. blanche | 3756 |
| Fuligo | septica | var. flava | (Pers.) Morgan | Fuligo septica fo. flava | Fleur de Tan | 1397 |
| Fuscoporia | contigua | | (Pers.) G. Cunn. | Phellinus contiguus - Polyp | Polypore voisin d'autres espèces | 1398 |
| Fuscoporia | ferrea | | (Pers.) G. Cunn. | Phellinus ferreus - Polypor | Polypore ferreux | 1399 |
| Fuscoporia | ferruginosa | | (Schrad.) Murrill | Phellinus ferruginosus - Po | Polypore ferrugineux | 1400 |
| Fuscoporia | torulosa | | (Pers.) T. Wagne | Phellinus torulosus - Polyp | Polypore massif | 1401 |
| Fuscopostia | fragilis | | (Fr.) B.K. Cui, L.L | Oligoporus fragilis - Tyrom | Polypore fragile | 2883 |
| Fuscopostia | leucomallella | | (Murrill) B.K. Cu | Oligoporus leucomallellus | Polypore blanc crème | 2884 |
| Galerina | atkinsoniana | | A.H. Smith | Galerina vittiformis var. atl | Galère d'Atkinson | 1402 |
| Galerina | badipes | | (Fr.) Kühner | | Galère à pied bai | 1403 |
| Galerina | camerina | | (Fr.) Kühner | Galerina pseudobadipes | Galère campanulée | 1404 |
| Galerina | clavata | | (Velen.) Kühner | Galerina heterocystis | Galère à cystides clavées | 1405 |
| Galerina | dimorphosystis | | Sm. & Singer | | | 3757 |
| Galerina | graminea | | (Velen.) Kühner | Galerina laevis | Galère des graminées | 1406 |
| Galerina | hypnorum | | (Schrank) Kühner | | Galère des mousses | 1407 |
| Galerina | Jaapii | | A.H. Sm. & Singer | | Galère de Jaap | 1408 |
| Galerina | karstenii | | A.H. Sm. & Singer | | Galère de Karsten. | 3758 |
| Galerina | marginata | | (Batsch) Kühner | Galerina unicolor - Galerina | Galère marginée | 1409 |
| Galerina | mniophila | | (Lasch) Kühner | | Galère des pelouses | 1410 |
| Galerina | paludosa | | (Fr.) Kühner | | Galère des marais | 1411 |
| Galerina | perplexa | | A.H. Sm. | | Galère perplexe | 1412 |
| Galerina | pseudomniophila | | Kühner | | Sosie de Galerina mniophila | 1413 |
| Galerina | pseudomycenopsis | | Pilát | | Sosie de galèrina mycenopsis | 1414 |
| Galerina | pumila | | (Pers.) M. Lange | | Galère naine | 1415 |
| Galerina | sphagnicola | | (G.F. Atk.) A.H. Smith & Singer | | Galère des sphaignes | 1416 |
| Galerina | sphagnorum | | Pers. | | Galère des marais | 1417 |
| Galerina | stagnina | | (Fr.) Kühner | Phaeogalera stagnina | Galère des marécages | 2732 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------|
| Galerina | stordalii | | A.H. Sm. | Galerina saxicola | | 3759 |
| Galerina | stylifera | | (G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer | | Galère visqueuse | 1418 |
| Galerina | subclavata | | Kühner | Galerina clavata fo. bispori | Galère à basides bisporiques | 1419 |
| Galerina | tibiicystis | | (G.F. Atk.) Kühner | | Galère à cystides capitées | 1420 |
| Galerina | triscopa | | (Fr.) Kühner | | Galère à chapeau bai-cannelle | 1421 |
| Galerina | uncialis | | (Britzelm.) Kühn | Galera uncialis - Naucoria uncialis | | 3760 |
| Galerina | vittiformis | | (Fr.) Singer | Galerina rubiginosa | Galère à grandes spores | 1422 |
| Galerina | walleyniana | | A. de Haan | | Galère de Walley | 1423 |
| Gamundia | striatula | | (Kühner) Raithe | Fayodia pseudoclusilis - Ga | Fayodie à lames blanches | 3867 |
| Ganoderma | adpersum | | (Schulz.) Donk | Ganoderma europaeum | Ganoderme d'Europe | 1424 |
| Ganoderma | applanatum | | (Schaeff.) With. | Ganoderma lipsiense | Ganoderme plat | 1425 |
| Ganoderma | carnosum | | Pat. | | Ganoderme charnu | 1426 |
| Ganoderma | lucidum | | (Curtis) P. Karst. | | Ganoderme luisant | 1427 |
| Ganoderma | pfeifferi | | Bres. | | Ganoderme de Pfeiffer | 1428 |
| Ganoderma | resinaceum | | Boud. | | Ganoderme résineux | 1429 |
| Ganoderma | valesiacum | | Boud. | | Ganoderme du mélèze | 1430 |
| Geastrum | coronatum | | Pers. | | Geastre en forme de couronne | 1431 |
| Geastrum | fimbriatum | | Fr. | Geastrum sessile | Geastre sessile | 1432 |
| Geastrum | fornicatum | | (Huds.) Hook. | | Geastre en forme de voute | 1433 |
| Geastrum | melanocephalum | | (Czern.) V.J. Stanek | | Geastre à tête noire | 1434 |
| Geastrum | minimum | | Schwein, | | Geastre minuscule | 1435 |
| Geastrum | pectinatum | | Pers. | | Géastre peigné | 1437 |
| Geastrum | quadrifidum | | DC. ex Pers. | | Géastre à 4 lobes | 1438 |
| Geastrum | rufescens | | Pers. | Geastrum vulgatum | Géastre rougeâtre | 1439 |
| Geastrum | striatum | | DC. | Geastrum nanum | Geastre à péristome strié | 1440 |
| Geastrum | triplex | | Jungh. | | Geastre à trois couches | 1441 |
| Geoglossum | cookeanum | | Nannf. ex Minter & P.F. Cannon | | Géoglosse de Cooke | 1443 |
| Geopora | arenicola | | (Lév.) Kers | Geopora arenosa - Sepulta | Géopore arénicole | 1444 |
| Geopora | foliacea | | (Schaeff.) S. Ahmad. | | Géopore en forme de feuille | 1445 |
| Geopora | sumneriana | | (Cooke) M. Tore | Sepultaria sumneriana | Géopore des cèdres | 1446 |
| Geopora | tenuis | | (Fuckel) T. Schumach. | | Géopore gracile | 1447 |
| Geoscypha | violacea | | (Pers.) Lambotte | Aleuria violacea - Galactini | Pézize violacée | 2724 |
| Gerronema | nitriolens | | (J. Favre) Cléme | Clitocybe nitriolens | Clitocybe nitreux | 1448 |
| Gerronema | umbilicatum | | Singer | Agaricus umbilicatus - Clitc | Clitocybe ombiliqué | 3761 |
| Giacomia | mirabilis | | (Bres.) Vizzini & | Leucopaxillus mirabilis | Leucopaxille étonnant | 1449 |
| Gliophorus | europplexus | | Dentinger et al. | | Hygrophore brun-rose | 1450 |
| Gliophorus | irrigatus | | (Pers.) A.M. Ains | Hygrocybe unguinosa - Hyg | Hygrophore baveux | 1455 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--|--|------|
| Gliophorus | laetus | | Pers. | Hygrocybe laeta - Hygroph | Hygrophore aux couleurs gaies | 1451 |
| Gliophorus | psittacinus | | (Schaeff.) Herin | Hygrocybe psittacina - Hyg | Hygrocybe perroquet | 1452 |
| Gliophorus | psittacinus | var. perplexus | (A.H. Sm.& Hesn | Hygrophorus perplexus | Hygrocybe perroquet aux couleurs rouge brique | 1453 |
| Gliophorus | psittacinus | var. sciophanoides | (Rea) Boertm. & | Hygrocybe sciophanoides | Hygrocybe perroquet aux couleurs roses | 1454 |
| Gloeocystidiellum | clavuligerum | | (Höhn. & Litsch. | Corticium clavuligerum - Gloeocystidium clavuligerum | | 3762 |
| Gloeocystidiellum | luridum | | (Bresadola) Boic | Corticium luridumGloeocystidium luridum | | 3763 |
| Gloeophyllum | abietinum | | (Bull.) P.Karst. | Lenzites abietina | Lenzite du sapin | 1456 |
| Gloeophyllum | odoratum | | (Wulfen) Imazek | Trametes odorata | Tramète odorante | 1457 |
| Gloeophyllum | sepiarium | | (Wulfen) P. Kars | Gloeophyllum saepiarium | Lenzite des clôtures | 1458 |
| Gloeophyllum | trabeum | | (Pers.) Murrill | Lenzites trabeus | Lenzite des poutres | 1459 |
| Gloeoporus | pannocinctus | | (Romell) J. Eriks | Ceriporiopsis pannocincta | Gelatoporia pannocincta - Polyporus pannocinctus | 3764 |
| Gloiothele | citrina | | (Pers.) Ginns & | Vesiculomyces citrinus - Gl | Gloiothèle jaune citron | 1461 |
| Gloiothele | lactescens | | (Berk.) Hjortstar | Corticium epigaeum | | 3765 |
| Gloioxanthomyces | vitellinus | | (Fr.) Lodge, Vizzi | Hygrocybe vitellina - Hygrc | Hygrophore jaune d'œuf | 1462 |
| Gomphidius | glutinosus | | (Schaeff.) Fr. | | Gomphide glutineux | 1463 |
| Gomphidius | maculatus | | (Scop.) Fr. | Gomphidius gracilis | Gomphide taché | 1465 |
| Gomphidius | roseus | | (Fr.) Fr. | | Gomphide rose | 1466 |
| Gomphus | clavatus | | (Pers.) Gray | Nevrophyllum clavatum | Chanterelle violette | 1467 |
| Grifola | frondosa | | Dicks) Gray | | Poule des bois | 1468 |
| Guepinia | helvelloides | | (DC.) Fr. | Tremiscus helvelloides | Guépinie en helvelle | 1469 |
| Gymnopilus | alpinus | | (Singer) Singer | | Gymnopile alpin | 1470 |
| Gymnopilus | arenophilus | | A. Ortega & Esteve-Rav. | | Gymnopile arénicole | 1471 |
| Gymnopilus | bellulus | | (Peck) Murrill | | Gymnopile mignon | 1472 |
| Gymnopilus | decipiens | | (W.G. Sm.) P.D. Orton | | Gymnopile trompeur | 1473 |
| Gymnopilus | dilepis | | (Berk. & Broome) Singer | | Gymnopile des serres | 1474 |
| Gymnopilus | fulgens | | (J. Favre & Maire) Singer | | Gymnopile lumineux | 1475 |
| Gymnopilus | hispidellus | | Murrill | | Gymnopile hispide | 1476 |
| Gymnopilus | igniculus | | Deneyer | | Gymnopile des terrils | 1477 |
| Gymnopilus | josserandii | | Antonin | | Gymnopile de Josserand | 1478 |
| Gymnopilus | junonius | | (Fr.) P.D. Orton | Gymnopilus spectabilis | Gymnopile remarquable | 1489 |
| Gymnopilus | liquiritiae | | Pers. | | Gymnopile aux couleurs vives | 1479 |
| Gymnopilus | maritimus | | Contu et al. | | Gymnopile maritime | 1481 |
| Gymnopilus | neerlandicus | | (Huijsman) Cont | Hebeloma neerlandica | Gymnopile des Pays-Bas | 1482 |
| Gymnopilus | odini | | (Fr.) Bon & P. Roux | | Gymnopile d'Odini | 1483 |
| Gymnopilus | penetrans | | (Fr.) Murrill | Gymnopilus stabilis - Gymr | Gymnopile pénétrant | 1484 |
| Gymnopilus | picreus | | Pers. | | Gymnopile amer | 1485 |
| Gymnopilus | pseudofulgens | | Romagn. | | Sosie de Gymnopilus fulgens | 1486 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|------|
| Gymnopilus | sapineus | | (Fr.) Murrill | | Gymnopile du sapin | 1487 |
| Gymnopilus | satur | | Kühner | Gymnopilus liquiritiae var. | Gymnopile aux couleurs saturés | 1480 |
| Gymnopilus | sordidostipes | | Hesler | Gymnopilus sapineus var. | Gymnopile à pied sordide | 1488 |
| Gymnopilus | suberis | | (Maire) Singer | | Gymnopile du chêne-liège | 1490 |
| Gymnopus | alpinus | | (Vilgalys & Mille | Collybia alpina | Collybie alpine | 1491 |
| Gymnopus | androsaceus | | (L.) J .L. Mata & | Marasmius androsaceus - S | Marasme androsace | 1492 |
| Gymnopus | aquosus | | Bull. | Collybia aquosa - Collybia c | Collybie aqueuse | 1493 |
| Gymnopus | brassicolens | | (Romagn.) Anto | Micromphale brassicolens | Marasme à odeur de chou | 1494 |
| Gymnopus | dryophilus | | (Bull.) Murrill | Collybia dryophyla - Maras | Collybie des chênes | 1496 |
| Gymnopus | dysosmus | | Polemis & Noordel. | | Collybie malodorante | 1498 |
| Gymnopus | erythropus | | Pers. | Collybia kuehneriana - Coll | Collybie à pied rouge | 1499 |
| Gymnopus | fagiphilus | | (Velen.) Antonin | Collybia fagiphila | Collybie des feuilles de hêtres | 1500 |
| Gymnopus | foetidus | | (Sowerby) P.M. | Micromphale foetidum - M | Marasme fétide | 1501 |
| Gymnopus | fuscopurpureus | | (Pers.) Antonin, | Collybia alkalivirens sensu | Collybie pourpre | 1502 |
| Gymnopus | fusipes | | Bull. | Collybia fusipes | Collybie à pied en fuseau | 1503 |
| Gymnopus | fusipes | var. rugosus | (Romagn.) Bon & Courtec. | | Collybia fusipes à chapeau ridé | 1504 |
| Gymnopus | hariolorum | | (Bull.) Antonin e | Collybia hariolorum - Mara | Collybie des devins | 1505 |
| Gymnopus | herinkii | | Antonin & Noor | Collybia herinkii | Collybie d'Herink | 1506 |
| Gymnopus | hybridus | | (Kühner & Roma | Collybia hybrida | Collybie hybride | 1507 |
| Gymnopus | impudicus | | (Fr.) Antonin et | Collybia impudica - Marasr | Collybie fétide | 1508 |
| Gymnopus | inuitatus | | (Vila & Llimona | Collybia inuitata | Collybie des pins d'Alep | 1509 |
| Gymnopus | inuitatus | var. cystidiatus | Antonin, Finy & Tomsovsky | | Collybie cystidiée des Pins d'Alep | 1510 |
| Gymnopus | lanipes | | (Malençon & Be | Gymnopus dryophylus var. | Collybie des chênes à pied velouté | 1497 |
| Gymnopus | loiseleurietorum | | (M.M. Moser et al.) Antonin et al. | | Collybie de l'Azalée des Alpes | 1511 |
| Gymnopus | ocior | | (Pers.) Antonin & | Collybia ocior - Collybia dry | Collybie ambrée | 1513 |
| Gymnopus | oreadoides | | (Passer.) Antoni | Collybia oreadoides - Mara | Sosie de Marasmius oreades | 1514 |
| Gymnopus | pubipes | | Antonin, A. Orte | Collybia benoistii sensu au | Collybie de Benoist | 1517 |
| Gymnopus | putillus | | (Fr.) Fr. | Marasmius putillus | Collybie minuscule | 1518 |
| Gymnopus | vernus | | (Ryman) Antonin | Gymnopus nivalis - Marasr | Collybie printanière | 1520 |
| Gymnosporangium | clavariiforme | | (Wulfen) DC. | | Rouille du genévrier | 3766 |
| Gymnosporangium | tremelloides | | R. Hartig | | Rouille du cyprès | 3767 |
| Gyrodon | lividus | | (Bull.) Sacc. | Boletus lividus | Bolet livide | 1521 |
| Gyromitra | accumbens | | Harmaja | Discina accumbens | Gyromitre étalée | 3694 |
| Gyromitra | esculenta | | Pers. | Physomitra esculenta | Fausse morille | 1522 |
| Gyromitra | esculenta | var. fragilis | Marchand ex Reaudin | | Variété fragile de Gyromitra esculenta | 1523 |
| Gyromitra | grandis | | (A. Cumino) Van | Helvella grandis | Gyromytre gigantesque | 3768 |
| Gyromitra | leucoxantha | | (Bres.) Harmaja | Discina leucoxantha | Gyromitre jaune et blanche | 1526 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--|------|
| Gyroporus | castaneus | | Bull. | Boletus castaneus - Gyropo | Bolet châtain | 1528 |
| Gyroporus | castaneus | var. afibulatus | Heinem. & Rammeloo | | Variété de Gyroporus castaneus non bouclée | 1529 |
| Gyroporus | castaneus | var. velutinus | Estades & Bidaud | | Variété veloutée de Gyroporus castaneus | 1530 |
| Gyroporus | cyanescens | | (Bull.) Quél. | Boletus cyanescens - Gyro | Bolet indigotier | 1531 |
| Gyroporus | cyanescens | fo. immutabilis | Charbonnel, Lejeune & Xavier | | Variété immuable du bolet indigotier | 1532 |
| Gyroporus | cyanescens | var. vinosovirescens | Riousset & Bertéa | | Bolet indigotier virant au brun vineux | 1533 |
| Gyroporus | pseudolacteus | | G. Moreno et al. | | Sosie de Gyroporus lacteus | 1535 |
| Haasiella | splendidissima | | Kotl. & Pouzar | Haasiella venustissima var. | Variété magnifique de Haasiella venustissima | 1537 |
| Haasiella | venustissima | | (Fr.) Kotl. & Pou | Omphalina venustissima | Omphale très gracieuse | 1536 |
| Hapalopilus | rutilans | | (Fr.) P. Karst. | Hapalopilus nudilans - Pha | Polypore rutilant | 1538 |
| Harmajaea | harperi | | (Murrill) Dima & | Clitocybe harperi | Clitocybe de Harper | 415 |
| Hebeloma | aestivale | | Vesterh. | | Hébélome d'été | 1539 |
| Hebeloma | album | | Peck | | Hébélome de couleur blanche | 1540 |
| Hebeloma | angustispermum | | A. Pearson | Hebeloma cylindrosporum | Hébélome à spores cylindracées | 1541 |
| Hebeloma | anthracophilum | | Maire | | Hébélome des charbonnières | 1542 |
| Hebeloma | birrus | | (Fr.) Gillet | Hebeloma pumilumHebelc | Hébélome à chapeau brun roux | 1543 |
| Hebeloma | bruchetii | | Bon | Hebeloma repandum | Hébélome de Bruchet | 3868 |
| Hebeloma | bulbiferum | | Maire | Hebeloma custuliniforme v | Hébélome à bulbe marginé | 1544 |
| Hebeloma | cavipes | | Huijsman | Hebeloma lutense | Hébélome à pied creux | 1545 |
| Hebeloma | circinans | | (Quél.) Sacc. | | Hébélome en ronds de sorcières | 1546 |
| Hebeloma | cistophilum | | Maire | | Hébélome des cistes | 1547 |
| Hebeloma | crustuliniforme | | (Bull.) Quél. | Hebeloma longicaudum | Hébélome croûte de pain | 1548 |
| Hebeloma | dunense | | L. Corb. & R. Hei | Hebeloma aprile - Hebelon | Hébélome des dunes | 1550 |
| Hebeloma | eburneum | | Malençon | Hebeloma perpallidum - H | Hébélome ivoirin | 1551 |
| Hebeloma | erumpens | | Contu | | Hébélome érumpant | 1552 |
| Hebeloma | fragilipes | | Romagn. | | Hébélome à pied fragile | 1553 |
| Hebeloma | fusisporum | | Gröger & Zschiesch. | | Hébélome à spores fusiformes | 1554 |
| Hebeloma | helodes | | J. Favre | | Hébélome des marais | 1555 |
| Hebeloma | hiemale | | Bres. | | Hébélome hivernal | 1556 |
| Hebeloma | incarnatum | | A.H. Smith | | Hébélome à chapeau beige rosâtre | 1557 |
| hebeloma | ingratum | | Bruchet | Hebelomatis ingratum | Hebelome inacceptable | 3769 |
| Hebeloma | ischnostylum | | (Cooke) Sacc. | | Hébélome à pied grêle | 1558 |
| Hebeloma | laterinum | | (Batsch) Vesterh | Hebeloma edurum | Tante à Nanon | 1559 |
| Hebeloma | lateritium | | Murrill | Hebeloma strophosum - H | Hébélome à centre sombre | 1563 |
| Hebeloma | leucosarx | | P.D. Orton | Hebeloma velutipes | Hébélome à chair blanche | 1560 |
| Hebeloma | marginatum | | (J. Favre) Bruche | Hebeloma versipelle var. n | Hebelome hourlé de blanc | 3770 |
| Hebeloma | nauseosum | | Sacc. | Hebeloma fusipes - Hebelc | Hébélome nauséux | 1564 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--|------|
| Hebeloma | odoratissimum | | (Britzelm.) Sacc. | Hebeloma hetieri - Hebelo | Hébélome très odorant | 1565 |
| Hebeloma | pallidoluctuosum | | Gröger & Zschie | Hebeloma latifolium Hebelo | Hébélome à lames larges ; Hébélome blême | 3771 |
| Hebeloma | plesiocistum | | Beker et al. | | Hébélome associé aux cistes | 1566 |
| Hebeloma | populinum | | Romagn. | | Hébélome du peuplier | 1567 |
| Hebeloma | porphyrosporum | | Maire | Hebeloma sarcophyllum | Hébélome à sporée porphyre | 1568 |
| Hebeloma | psammophilum | | Bon | | Hébélome psammophile | 1569 |
| Hebeloma | pseudoamarens | | (Kühner & Roma | Alnicola pseudoamarens | Hébélome des places à feu | 1570 |
| Hebeloma | pusillum | | J.E. Lange | Hebeloma vaccinum var. c | Hébélome menu | 1571 |
| Hebeloma | quercetorum | | Quadr. | | Hébélome du chêne | 1572 |
| Hebeloma | radicosum | | Bull. | | Hébélome radica | 1573 |
| Hebeloma | remyi | | Bruchet | | Hébélome de Rémy | 1574 |
| Hebeloma | sacchariolens | | Quél. | | Hébélome parfumé | 1575 |
| Hebeloma | sinapizans | | (Paulet) Sacc. | | Hébélome échaudé | 1576 |
| Hebeloma | sordescens | | Vesterh. | | Hébélome à pied sale | 1577 |
| Hebeloma | spoliatum | | (Fr.) Gillet | | Hébélome sans voile | 1578 |
| Hebeloma | subtortum | | P. Karst. | Hebeloma malençonii - He | Hébélome sordide | 1579 |
| Hebeloma | theobrominum | | Quadr. | Hebeloma truncatum sens | Hébélome tronqué | 1580 |
| Hebeloma | vaccinum | | Romagn. | Hebeloma alvarens | Hébélome couleur de vache | 1581 |
| Helminthosphaeria | clavariarum | | (Desm.) Fuckel | | Parasite de Clavulina cristata | 1583 |
| Helvella | acetabulum | | (L.) Quél. | Acetabulum vulgare - Paxi | Helvelle en forme de calice | 1584 |
| Helvella | atra | | J. König | Leptopodia atra | Helvelle noire | 1585 |
| Helvella | costifera | | Nannf. | Acetabula costifera - Paxin | Helvelle à pied côtelé | 1586 |
| Helvella | crispa | | Fr. | | Helvelle crépue | 1587 |
| Helvella | crispa | var. pithyophila | (Boud.) Donadini | | Helvelle crépue des conifères | 1588 |
| Helvella | elastica | | Bull. | Leptopodia elastica | Helvelle élastique | 1589 |
| Helvella | ephippium | | Lév. | Leptopodia ephippium | Helvelle à chapeau en forme de selle | 1590 |
| Helvella | lactea | | Boud. | | Helvelle blanc de lait | 1591 |
| Helvella | lacunosa | | Afzel. : Fr. | Helvella sulcata | Helvelle lacuneuse | 1592 |
| Helvella | macropus | | (Pers.) P. Karst. | Aleuria macropus - Macro | Helvelle à long pied | 1594 |
| Helvella | monachella | | (Scop.) Schaeff. | | Helvelle à pied blanc | 1595 |
| Helvella | solitaria | | P. Karst. | Lachnea solitaria - Peziza s | Helvelle solitaire | 1596 |
| Helvella | verruculosa | | (Sacc.) Harmaja | Helvella arctoalpina - Geog | Helvelle de la zone alpine | 1597 |
| Hemileccinum | depilatum | | (Redeuilh) Sutar | Boletus depilatus | Bolet chauve | 1598 |
| Hemileccinum | impolitum | | (Fr.) Sutara | Boletus impolitus | Bolet dépoli | 1599 |
| Hemimycena | candida | | (Bres.) Singer | Omphalia candida - Delicat | Mycène des consoudes | 1600 |
| Hemimycena | cephalotricha | | (Joss. ex Tehead | Delicatula cephalotricha - I | Mycène à poils capités | 1601 |
| Hemimycena | crispata | | (Kühner) Singer | Delicatula crispata - Mycer | Mycène crépu | 1602 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|------|
| Hemimycena | cucullata | | Pers. | Hemimycena gypsea - Myc | Mycène en capuchon | 1603 |
| Hemimycena | gracilis | | (Quél.) Chanteu | Marasmiellus gracilis - Myc | Mycène gracile | 3772 |
| Hemimycena | ignobilis | | Joss. ex Bon | Mycena ignobilis - Omphal | Mycène méconnu | 1605 |
| Hemimycena | lactea | | Pers. | Hemimycena delicatella - M | Mycène blanc de lait | 1606 |
| Hemimycena | mairei | | (J.E. Gilbert) Sing | Delicatula mairei - Mycena | Mycène de Maire | 1607 |
| Hemimycena | ochrogaleata | | (J. Favre) M.M. F | Mycena ochrogaleata | Mycène des cirses épineux | 1608 |
| Hemimycena | pseudolactea | | (Kühner) Singer | Mycena pseudolactea | Mycène blanchâtre | 1609 |
| Hemimycena | tortuosa | | (P.D. Orton) Red | Mycena tortuosa | Mycène à poils tortueux | 1610 |
| Hemistropharia | albocrenulata | | (Peck) Jacobsson | Hemipholiota albocrenulat | Strophaire à arêtes blanches | 1613 |
| Hemitrichia | clavata | | (Pers.) Rostaf. | Trichia clavata - Arcyria cla | Hémitrichie clavée | 1614 |
| Hemitrichia | serpula | | (Scop.) Rostaf. | | Hémitrichie petit-serpent | 1615 |
| Henningsomyces | candidus | | (Pers.) Kuntze | Calyptella candida - Cyphe | Henningsomyces blanc | 3773 |
| Heridium | cirrhatum | | (Pers.) Nicol. | Creolophus cirrhatum - Hyd | Creolophe ondulé | 1082 |
| Heridium | clathroides | | (Pall.) Pers. | Heridium ramosum - Dryoc | Hydne rameux | 1616 |
| Heridium | coralloides | | (Scop.) Pers. | Dryodon coralloides | Hydne en forme de corail | 1617 |
| Heridium | erinaceus | | Bull. | Dryodon erinaceus - Hydru | Hydne hérisson | 1618 |
| Heridium | flagellum | | (Scop.) Pers. | Heridium alpestre | Hydne corail des résineux | 1619 |
| Heterobasidium | abietinum | | Niemelä & Korhonen | | Polypore du sapin | 1620 |
| Heterobasidium | annosum | | Niemelä & Korh | Ungulina annosa - Polypor | Polypore annuel | 1621 |
| Heterobasidium | parviporum | | Niemelä & Korhonen | | Polypore à petits pores | 1622 |
| Heteroradulum | deglubens | | (Berk. & Broome | Eichleriella deglubens | Tremelle verruqueuse | 1623 |
| Hodophilus | atropunctus | | Pers. | Camarophylloopsis atropun | Hygrophore ponctué de noir | 1624 |
| Hodophilus | foetens | | (W. Phillips) Birk | Camarophylloopsis foetens | Hygrophore fétide | 1625 |
| Hohenbuehelia | abietina | | Singer & Kuthan | | Pleurote du sapin | 1626 |
| Hohenbuehelia | angustata | | (Berk.) Singer | Geopetalum angustatum | Pleurote à lames étroites | 1627 |
| Hohenbuehelia | atrocoerulea | | (Fr.) Fr. | Pleurotus atrocaeruleus | Pleurote gris bleu | 1628 |
| Hohenbuehelia | bonii | | Ainsw. | Acanthocystis petaloides v | Pleurote de Marcel Bon | 1629 |
| Hohenbuehelia | boullardii | | Malaval, Bertéa & Constant | | Pleurote de Boullard | 1630 |
| Hohenbuehelia | culmicola | | Bon | | Pleurote des chaumes | 1631 |
| Hohenbuehelia | cyphelliformis | | (Berk.) O.K. Mill | Resupinatus silvanus - Aca | Pleurote en forme de cyphelle | 1632 |
| Hohenbuehelia | faerberioides | | Padovan & Contu | | Pleurote des chênes verts | 1633 |
| Hohenbuehelia | fluxilis | | (Fr. : Fr.) P.D. Or | Pleurotus fluxilis | Pleurote des saules | 1634 |
| Hohenbuehelia | grisea | | (Peck) Singer | Hohenbuehelia fluxilis var. | Variété grise de la Pleurote des saules | 1635 |
| Hohenbuehelia | horakii | | Courtec., Vila & | Hohenbuehelia grisea | Pleurote de Horak | 1637 |
| Hohenbuehelia | ilerdensis | | Courtec., Vila & | Rocabrana | Pleurote associée à Festuca vaginata | 1638 |
| Hohenbuehelia | longipes | | (Boud.) M.M. M | Acanthocystis longipes - Pl | Pleurote à long pied | 1639 |
| Hohenbuehelia | mastrucata | | (Fr.) Fr. | | Pleurote épineuse et rapeuse | 1640 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|
| Hohenbuehelia | nigra | | (Schwein.) Singe | Pleurotus niger - Resupina | Pleurote noire | 1641 |
| Hohenbuehelia | petaloides | | (Bull.) Schulzer | Acanthocystis petaloides - | Pleurote pétaloïde | 1642 |
| Hohenbuehelia | pinacearum | | Thorn | | Pleurote des conifères | 1643 |
| Hohenbuehelia | tremula | | (Schaeff.) Thorn | Leptoglossum tremulum - | Pleurote tremblant | 1644 |
| Hohenbuehelia | valesiaca | | (Sacc.) Singer | Pleurotus valesiacus | Pleurote épineuse des conifères | 1645 |
| Homophron | cernuum | | (Vahl) Örstardiu | Psathyrella papyracea - Ps | Psathyrelle recourbée | 1646 |
| Homophron | spadiceum | | (P. Kumm.) Örst | Psathyrella spadicea - Psat | Psathyrelle couleur chair | 1647 |
| Hortiboletus | bubalinus | | (Oolbekkink & D | Xerocomus bubalinus - Bol | Bolet feuille morte | 1648 |
| Hortiboletus | engelii | | (Hlaváček) Biket | Xerocomus communis - Bo | Bolet d'Engel | 1649 |
| Hortiboletus | rubellus | | (Krombh.) Simor | Xerocomus rubellus - Bolet | Bolet rougeâtre | 1650 |
| Humaria | hemisphaerica | | (F.H. Wigg.) Fuch | Lachnea hemisphaerica - P | Pézize hémisphérique | 1651 |
| Hydnellum | amygdaliolens | | (Rubio Casas, Ru | Sarcodon amygdaliolens | Sarcodon à odeur d'amandes amères | 3300 |
| Hydnellum | aurantiacum | | (Batsch) P. Karst | Calodon aurantiacus | Hydne orangé | 1652 |
| Hydnellum | auratile | | (Britzelm.) Maas | Calodon auratile | Hydne doré | 1653 |
| Hydnellum | caeruleum | | (Hornem.) P. Ka | Calodon caeruleus | Hydne azuré | 1654 |
| Hydnellum | coalitum | | Maas Geest. | | Hydne agrégé | 1655 |
| Hydnellum | compactum | | (Pers.) P. Karst. | Calodon compactus - Hydn | Hydne à chair compacte | 1656 |
| Hydnellum | concrescens | | (Pers.) Banker | | Hydne concrescant | 1657 |
| Hydnellum | fenicum | | (P. Karst.) P. Kar | Sarcodon scabrosus var. fe | Sarcodon boréo-montagnard | 3302 |
| Hydnellum | ferrugineum | | (Fr.) Fr. | Calodon ferrugineus | Hydne ferrugineux | 1658 |
| Hydnellum | fuligineoviolaceum | | (Kalchbr.) E. Lar | Sarcodon fuligineoviolaceu | Sarcodon fuligineux-violacé | 3303 |
| Hydnellum | geogenium | | (Fr.) Banker | Calodon geogenium | Hydne jaune | 1659 |
| Hydnellum | glaucopus | | (Maas Geest. & | Sarcodon glaucopus | Sarcodon à pied glauque | 3304 |
| Hydnellum | gracilipes | | (P. Karst.) P. Kar | Calodon gracilipes | Hydne à pied gracile | 1660 |
| Hydnellum | lepidum | | (Maas Geest.) E | Sarcodon lepidus | Sarcodon gracieux | 3307 |
| Hydnellum | lundellii | | (Maas Geest. & | Sarcodon lundellii | Sarcodon de Lundell | 3309 |
| Hydnellum | mirabile | | (Fr.) P. Karst. | Calodon mirabilis | Hydne remarquable | 1661 |
| Hydnellum | peckii | | Banker | | Hydne de Peck | 1662 |
| Hydnellum | scabrosum | | (Fr.) E. Larss., K. | Sarcodon scabrosus | Sarcodon à chapeau écailleux | 3311 |
| Hydnellum | scrobiculatum | | (Fr.) P. Karst. | Calodon scrobiculatusHydr | Hydne scrobiculé | 1663 |
| Hydnellum | spongiosipes | | (Peck) Pouzar | Hydnellum velutinum var. | Hydne à pied spongieux | 1664 |
| Hydnellum | suaveolens | | (Scop.) P. Karst. | Calodon suaveolens | Hydne à odeur agréable | 1665 |
| Hydnellum | tardum | | Maas Geest. | | Hydne tardif | 1666 |
| Hydnellum | versipellis | | (Fr.) E. Larss., K. | Sarcodon versipellis | Sarcodon polymorphe | 3313 |
| Hydnoporia | corrugata | | (Fr.) K.H. Larss. & | Hymenochaete corrugata | Hymenochaete ridé-craquelé | 1785 |
| Hydnoporia | tabacina | | (Sowerby) Spirin | Hymenochaete tabacina | Hymenochaete couleur tabac | 1786 |
| Hydnum | albidum | | Peck | Hydnum repandum var. alb | Hydne blanchâtre | 1667 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---|------|
| Hydnum | elliposporum | | H. Ostrow & L. Beenken | Hydne à spores elliptiques | 1668 |
| Hydnum | magnorufescens | | Vizzini, Picllo & Contu | Hydne à chapeau ocre rosâtre | 1669 |
| Hydnum | ovoideisporum | | Olariaga et al. | Hydne à spores ovoïdes | 1670 |
| Hydnum | ovoideisporum | fo. depauperatum | Picillo, Vizzini & Contu | Forme dépourvue d'aiguillons | 1671 |
| Hydnum | repandum | | L. | Pied-de-mouton | 1672 |
| Hydnum | Repandum | fo. amarum | Stropnik, Tratnik & Seljak | Pied-de-mouton amer | 3696 |
| Hydnum | repandum | var. album | (Quél.) Rea | Variété blanche du pied-de-mouton | 1673 |
| Hydnum | rufescens | | Pers. | Hydnum repandum var. ou Pied-de-mouton roussissant | 1674 |
| Hydnum | vesterholtii | | Olariaga et al. | Hydnum umbilicatum sens Hydne de Vesterholt | 1675 |
| Hydropus | conicus | | Bas & Weholt | Mycène conique | 1676 |
| Hydropus | floccipes | | (Fr.) Singer | Mycena floccipes - Collybia Mycène à pied floconneux | 1677 |
| Hydropus | kauffmanii | | (A.H. Sm.) P.A. N | Mycena kauffmanii Mycène de Kauffman | 1678 |
| Hydropus | marginellus | | Pers. | Mycena marginella - Omph Clitocybe à arête brune | 1679 |
| Hydropus | subalpinus | | (Höhn.) Singer | Collybia pseudoradicata - M Mycène subalpine | 1680 |
| Hydropus | trichoderma | | (Joss.) Singer | Mycena trichoderma Mycène à chapeau velouté | 1681 |
| Hygroaster | lacteus | | E. Ludwig & A. Ryberg | Hygrocybe blanc de lait | 1682 |
| Hygrocybe | acutoconica | | (Clém.) Singer | Hygrocybe aurantio-lutesce Hygrocybe immuable | 1714 |
| Hygrocybe | aurantiosplendens | | R. Aar Haller | Hygrophorus aurantiosple Hygrocybe d'un bel orangé | 1683 |
| Hygrocybe | aurantiosplendens | var. luteosplendens | Bon | Forme jaune d'hygrocybe aurantiosplendens | 1684 |
| Hygrocybe | calciphila | | Arnolds | Pseudohygrocybe calciphil Hygrocybe calcicole | 1685 |
| Hygrocybe | cantharellus | | (Schwein.) Murr | Hygrocybe lepida - Hygrop Hygrocybe en forme de chanterelle | 1686 |
| Hygrocybe | ceracea | | (Fr.) Fr. | Hygrophorus ceraceus - Ps Hygrocybe céracé | 1687 |
| Hygrocybe | cereopallida | | (Cléménçon) P. I | Cuphophyllus cereopallidu Hygrophore cireux pâle | 1118 |
| Hygrocybe | chlorophana | | (Fr.) Fr. | Hygrocybe euroflavescens Hygrocybe jaune soufre | 1688 |
| Hygrocybe | cinerea | | (Pers.) P.D. Orto | Cuphophyllus cinereus - Hy Hygrocybe cendré | 1689 |
| Hygrocybe | citrinovirens | | (J.E. Lange) Jul. S | Hygrocybe brevispora - Hy Hygrocybe jaune verdâtre | 1691 |
| Hygrocybe | coccinea | | (Schaeff.) P. Kun | Hygrophorus coccineus - P Hygrocybe écarlate | 1692 |
| Hygrocybe | coccineocrenata | | (P.D. Orton) M.N | Hygrophorus coccineocren Hygrocybe à bords crénelés | 1693 |
| Hygrocybe | conica | | (Schaeff.) P. Kun | Hygrophorus conicus - Hyg Hygrocybe conique | 1694 |
| Hygrocybe | conica | var. chloroides | (Malençon) Bon | Hygrocybe conique à chapeau jaune verdâtre | 1695 |
| Hygrocybe | conica | var. conicopalustris | Arnolds | Hygrocybe riparia var. con Hygrocybe conique à chapeau rouge sombre | 1696 |
| Hygrocybe | conicoides | | P.D. Orton | Hygrocybe conica var. con Faux hygrocybe conique | 1697 |
| Hygrocybe | constrictospora | | Arnolds | Pseudohygrocybe constrict Hygrocybe à spores étranglées | 1698 |
| Hygrocybe | distans | | (Berk.) Bon & Ch | Hygrophorus distans Hygrocybe à lames espacées | 1699 |
| Hygrocybe | glutinipes | | (J.E. Lange) R. H | Gliophorus glutinipes - Hyg Hygrocybe à pied glutineux | 1701 |
| Hygrocybe | glutinipes | var. rubra | Bon | Hygrocybe glutinipes à lames rouge orangé | 1702 |
| Hygrocybe | helobia | | (Arnolds) Bon | Hygrophorus helobius - Ps Hygrocybe des marécages | 1703 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--|------|
| Hygrocybe | ingrata | | J.P. Jensen & F.H. | Neohygrocybe ingrata | Hygrocybe à odeur désagréable | 2607 |
| Hygrocybe | insipida | | (J.E. Lange) M.M. | Gliophorus insipidus - Hygr | Hygrocybe insipide | 1704 |
| Hygrocybe | intermedia | | (Pass.) Fayod | Hygrophorus intermedius - | Hygrocybe intermédiaire | 1705 |
| Hygrocybe | konradii | var. albofuscescens | Eyssart. & Bon | | Variété blanche d'Hygrocybe konradii | 1707 |
| Hygrocybe | leporina | | (Fr.) P.D. Orton | Hygrophorus leporinus - Ca | Hygrophore couleur de lièvre | 1757 |
| Hygrocybe | marchii | | (Bres.) F.H. Møll | Hygrophorus marchii - Pse | Hygrocybe de March | 1708 |
| Hygrocybe | miniata | | (Fr.) Fr. | Hygrophorus miniatus - Ps | Hygrocybe vermillon | 1709 |
| Hygrocybe | mucronella | | (Fr.) P. Karst. | Hygrocybe reai - Gliophoru | Hygrocybe mucroné | 1710 |
| Hygrocybe | nitrata | | (Pers.) Wünsche | Hygrocybe murinacea sens | Hygrocybe à odeur d'eau de javel | 2608 |
| Hygrocybe | obrussea | | (Fr.) Wünsche | Hygrophorus obrusseus - P | Hygrocybe jaune d'or | 1711 |
| Hygrocybe | parvula | | (Peck) Murrill | Hygrophorus parvulus - Ps | Hygrocybe mineur | 1713 |
| Hygrocybe | punicea | | (Fr.) Fr. | Hygrophorus puniceus - Ps | Hygrocybe rouge ponceau | 1717 |
| Hygrocybe | quieta | | (Kühner) Singer | Hygrophorus quietus | Hygrocybe tranquille | 1718 |
| Hygrocybe | reidii | | Kühner | | Hygrocybe de Reid | 1719 |
| Hygrocybe | spadicea | | (Scop.) P. Karst. | Hygrophorus spadiceus | Hygrocybe brun de datte | 1720 |
| Hygrocybe | splendidissima | | (P.D. Orton) Svr | Hygrophorus splendidissim | Hygrocybe splendide | 1721 |
| Hygrocybe | subalba | | Bon & Réaudin | | Hygrocybe blanchâtre | 1722 |
| Hygrocybe | subminutula | | Murrill | Gliophorus subminutulus - | Sosie de Hygrocybe minutula | 1723 |
| Hygrocybe | subpapillata | | Kühner | | Hygrocybe subpapillé | 1724 |
| Hygrocybe | substrangulata | | (Peck) M.M. Mo | Hygrophorus substrangula | Hygrocybe finement squamuleux | 1725 |
| Hygrocybe | turunda | | (Fr.) Fr. | Hygrophorus turundus - Ps | Hygrocybe à squames brunâtres | 1726 |
| Hygronarius | renidens | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius renidens | Cortinaire couleur d'abricot | 931 |
| Hygrophorocybe | nivea | | (Velen.) Vizzini & | Clitocybe nivea | Clitocybe blanc de neige | 1727 |
| Hygrophoropsis | aurantiaca | | (Wulfen) Maire | | Fausse chanterelle | 1728 |
| Hygrophoropsis | aurantiaca | var. pallida | (Cooke) Heykoo | Hygrophoropsis aurantiaca | Variété pâle de Hygrophoropsis aurantiaca | 1729 |
| Hygrophoropsis | fuscusquamula | | P.D. Orton | | Fausse girofle mouchetée | 1730 |
| Hygrophoropsis | macrospora | | (D.A. Reid) Kuyper | | Hygrophoropsis à grandes spores | 1731 |
| Hygrophorus | agathosmus | | (Fr.) Fr. | | Hygrophore à odeur agréable | 1732 |
| Hygrophorus | agathosmus | fo. albus | Candusso | | Forme blanche de l'hygrophore à odeur agréable | 1733 |
| Hygrophorus | arbustivus | | Fr. | | Hygrophore des arbustes | 1734 |
| Hygrophorus | atramentosus | | (Alb. & Schwein | Hygrophorus camarophyllu | Hygrophore à chapeau gris bleuté | 1737 |
| Hygrophorus | bresadolae | | Quél. | Hygrophorus speciosus var | Hygrophore de Bresadola | 1735 |
| Hygrophorus | calophyllus | | P. Karst. | Hygrophorus camarophyllu | Hygrophore à lames roses | 1738 |
| Hygrophorus | camarophyllus | | (Alb. & Schwein | Hygrophorus caprinus - Ca | Hygrophore des chèvres | 1736 |
| Hygrophorus | capreolarius | | (Kalchbr.) Fr. | | Hygrophore des chevreuils | 1739 |
| Hygrophorus | chrysodon | | (Batsch) Fr. | | Hygrophore à dents jaunes | 1741 |
| Hygrophorus | chrysodon | var. leucodon | (Alb. & Schwein.) Fr. | | Hygrophore à dents jaunes et à voile blanc | 1742 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--|------|
| Hygrophorus | cossus | | (Sowerby) Fr. | | Hygrophore à odeur de chenille | 1743 |
| Hygrophorus | discoideus | | (Pers.) Fr. | | Hygrophore à disque brun | 1744 |
| Hygrophorus | discoxanthus | | (Fr.) Rea | Hygrophorus chrysoaspis | Hygrophore à disque jaune | 1745 |
| Hygrophorus | eburneus | | (Bull.) Fr. | | Hygrophore blanc d'ivoire | 1746 |
| Hygrophorus | erubescens | | (Fr.) Fr. | | Hygrophore rougissant | 1747 |
| Hygrophorus | fagi | | G. Becker & Bon | Hygrophorus penarius var. | Hygrophore du hêtre | 1749 |
| Hygrophorus | fuscoalbus | | Fr. | | Hygrophore blanc et sombre | 1750 |
| Hygrophorus | gliocyclus | | Fr. | | Hygrophore à anneau visqueux | 1751 |
| Hygrophorus | hedrychii | | (Velen..) K. Kult | | Hygrophore de Hedrych | 1752 |
| Hygrophorus | hyacinthinus | | Quél. | | Hygrophore à odeur de jacinthe | 1753 |
| Hygrophorus | hypothejus | | (Fr.) Fr. | Hygrophorus aureus | Hygrophore à lames jaunes | 1754 |
| Hygrophorus | korhonenii | | Harmaja | | Hygrophore de Korhonen | 1755 |
| Hygrophorus | latitabundus | | Britzelm. | Hygrophorus limacinus ser | Hygrophore limace | 1756 |
| Hygrophorus | leucophaeo-ilicis | | Bon & Chevassut | | Hygrophore du chêne vert | 1758 |
| Hygrophorus | ligatus | | (Fr.) Fr. | | Hygrophore annelé | 1759 |
| Hygrophorus | lindtneri | | M.M. Moser | Hygrophorus leucophaeus | Hygrophore de Lindtner | 1760 |
| Hygrophorus | lucorum | | Kalchbr. | | Hygrophore du mélèze | 1761 |
| Hygrophorus | marzuolus | | (Fr.) Bres. | | Hygrophore de Mars | 1762 |
| Hygrophorus | marzuolus | var. albus | (Fr.) Fr. | | | 3774 |
| Hygrophorus | melizeus | | (Fr.) Fr. | Hygrophorus karstenii | Hygrophore bicolore | 1763 |
| Hygrophorus | mesotephrus | | Berk. & Broome | | Hygrophore à centre sombre | 1764 |
| Hygrophorus | nemoreus | | Pers. | | Hygrophore des bois | 1765 |
| Hygrophorus | olivaceoalbus | | (Fr.) Fr. | | Hygrophore blanc et olive | 1766 |
| Hygrophorus | penarioides | | Jacobsson & E. Larss. | | Hygrophore de l'office | 1767 |
| Hygrophorus | penarius | | Fr. | Hygrophorus barbatulus | Hygrophore comestible | 1768 |
| Hygrophorus | persicolor | | (Ricek) Bon | Hygrophorus erubescens v | Hygrophore couleur de pêche | 1748 |
| Hygrophorus | persoonii | | Arnolds | Hygrophorus dichrous | Hygrophore de Persoon | 1769 |
| Hygrophorus | persoonii | var. fuscovinosus | (Bon) Bon | Hygrophorus dichrous var. | Hygrophore de Persoon à chapeau vineux | 1770 |
| Hygrophorus | piceae | | Kühner | | Hygrophore de l'épicéa | 1771 |
| Hygrophorus | poetarum | | R. Heim | | Hygrophore des poètes | 1772 |
| Hygrophorus | pudorinus | | (Fr.) Fr. | | Hygrophore pudibond | 1773 |
| Hygrophorus | purpurascens | | (Alb. & Schwein.) Fr. | | Hygrophore pourpré | 1774 |
| Hygrophorus | pustulatus | | (Pers.) Fr. | Hygrophorus tephroleucus | Hygrophore pustuleux | 1775 |
| Hygrophorus | queletii | | Bres. | | Hygrophore de Quélet | 1776 |
| Hygrophorus | roseodiscoideus | | Bon & Chevassut | | Hygrophore à disque rosé | 1777 |
| Hygrophorus | russula | | (Pers.) Kovalenko | | Hygrophore russule | 1778 |
| Hygrophorus | speciosus | | Peck | Hygrophorus lucorum var. | Hygrophore magnifique | 1779 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--|--|------|
| Hygrophorus | subviscifer | | (P. Karst.) Harm. | Hygrophorus spodoleucus | Hygrophore couleur d'hébélome | 1780 |
| Hymenochaete | cinnamomea | | (Pers.) Lév. | | Hymenochaete cannelle | 1781 |
| Hymenochaete | cruenta | | (Pers.) Donk | Hymenochaete mougeotii | Hymenochaete rouge écarlate | 1782 |
| Hymenochaete | fuliginosa | | (Pers.) Lév. | Hymenochaete subfuliginosa | Hymenochaete fuligineux | 1783 |
| Hymenochaete | rubiginosa | | (Dicks.) Lév. | | Hymenochaete ferrugineux | 1784 |
| Hymenopellis | radicata | | (Rehlan) R.H. Pe | Collybia radicata - Mucidula | Collybie radicante | 1787 |
| Hymenopellis | radicata | fo. marginata | (Konrad & Mautner) | Oudemansiella radicata var. marginata | Collybie radicante à arête brune | 1788 |
| Hymenopellis | xeruloides | | (Bon) R.H. Peter | Oudemansiella xeruloides | Collybie des dunes | 3653 |
| Hymenoscyphus | albidus | | (Gillet) W. Phillips | Hymenoscypha albida Helotium | Hymenoscyphus blanc | 3775 |
| Hymenoscyphus | calyculus | | (Fr.) W. Phillips | Helotium calyculum - Peziza | Pézize en corolle | 1789 |
| Hymenoscyphus | fraxineus | | (T. Kowalski) Burt | Hymenoscyphus pseudoalbidus | Hymenoscyphus du frêne | 3776 |
| Hymenoscyphus | fructigenus | | (Bull.) Gray | Helotium fructigenum - Peziza | Pézize des fruits | 1790 |
| Hymenoscyphus | serotinus | | (Pers.) W. Phillips | Peziza serotina - Helotium | Pézize tardive | 1792 |
| Hyphoderma | setigerum | | (Fr.) Donk | Asterostroma chromoluteum Grandinia | Grandinia parasitica | 3777 |
| Hyphodermella | corrugata | | (Fr.) J. Erikss. & J. Erikss. | Dryodon cirrhatum var. corrugata | Hyphodermelle odontoïde | 3778 |
| Hyphodontia | alienata | | (S. Lundell) J. Erikss. | Grandinia alienata | | 3779 |
| Hyphodontia | alutaria | | (Burt) J. Erikss. | Grandinia alutaria - Odontia alutaria Peniophora | Peniophora alutaria | 3780 |
| Hyphodontia | arguta | | (Fr.) J. Erikss. | Grandinia arguta Odontia | Odontia arguta | 3781 |
| Hyphodontia | granulosa | | (Pers.) Bernicchi | Grandinia granulosa - Dichelium | Cortice granuleux | 1200 |
| Hyphodontia | quercina | | (Pers.) J. Erikss. | Grandinia quercina - Radula | Corticium des chênes | 1793 |
| Hypholoma | capnoides | | (Fr.) P. Kumm. | Geophila capnoides | Hypholome à lames enfumées | 1794 |
| Hypholoma | elongatum | | Pers. | Geophila elongata | Hypholome à long pied | 1795 |
| Hypholoma | epixanthum | | (Fr.) Quélet | Geophila epixantha | Hypholome jaunâtre | 1796 |
| Hypholoma | ericaeoides | | P.D. Orton | Psilocybe ericaeoides | Hypholome des bruyères | 1797 |
| Hypholoma | ericaeum | | (Pers.) Kühner | Geophila ericaea - Psilocybe | Hypholome des bords de mares | 1798 |
| Hypholoma | eximium | | (C. Laest.) Reid | Hypholoma lapponicum sensu lato | Hypholome remarquable | 1799 |
| Hypholoma | fasciculare | | (Huds.) P. Kumm. | Geophila fascicularis - Psilocybe | Hypholome en touffes | 1800 |
| Hypholoma | fasciculare | fo. subannulatum | Bon | | Hypholome fasciculé à voile abondant | 1801 |
| Hypholoma | fasciculare | var. subviride | (Berk. & M.A. Curtis) Krieglstein | | Hypholome fasciculé nuancé de verdâtre | 1802 |
| Hypholoma | laeticolor | | F.H. Møller) P.D. | Psilocybe laeticolor | Hypholome aux couleurs gaies | 1803 |
| Hypholoma | lateritium | | (Schaeff.) P. Kumm. | Hypholoma sublateritium | Hypholome couleur de brique | 1804 |
| Hypholoma | lateritium | var. pomposum | (Bolton) P. Roux & G. Garcia | | Hypholome rouge brique avec un anneau | 1805 |
| Hypholoma | marginatum | | Pers. | Hypholoma dispersum - Psilocybe | Hypholome marginé | 1806 |
| Hypholoma | myosotis | | (Fr.) Fr. | Hemiphiliota myosotis - Psilocybe | Hypholome des marais | 1807 |
| Hypholoma | polytrichi | | (Fr.) Fr. | Geophila polytrichi - Psilocybe | Hypholome des polytrichs | 1808 |
| Hypholoma | radicosum | | J.E. Lange | Hypholoma epixanthum var. radicosum | Hypholome radicant | 1809 |
| Hypholoma | subericaeum | | (Fr.) Kühner | Geophila subericaea | Hypholome des marécages | 1810 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|---|------|
| Hypholoma | subericaeum | fo. verrucosum | Kühner | | Hypholome des marécages à chapeau verruqueux | 1811 |
| Hypholoma | xanthocephalum | | P.D. Orton | Psilocybe xanthocephala | Hypholome à chapeau jaune | 1812 |
| Hypocrea | gelatinosa | | (Tode) Fr. | Creopus gelatinosus | | 3782 |
| Hypocreopsis | lichenoides | | (Tode) Seaver | | Hypocreopsis simulant un lichen | 1814 |
| Hypomyces | aurantius | | (Pers.) Fuckel | | Hypomyces orangé | 1815 |
| Hypomyces | chrysospermus | | Tul. & C. Tul. | Apiocrea chrysosperma - S | Hypomyces jaune | 1816 |
| Hypomyces | lateritius | | (Fr.) Tul. & C. Tu | Peckiella lateritia | Hypomyces couleur de brique | 1817 |
| Hypomyces | viridis | | P. Karst. | Peckiella viridis | Hypomyces verdissant | 1818 |
| Hypoxylon | fragiforme | | Pers. | | Hypoxylon en forme de fraise | 1819 |
| Hypoxylon | fuscum | | (Pers.) Fr. | | Hypoxylon brun sombre | 1820 |
| Hypoxylon | rubiginosum | | Pers. | | Hypoxylon de couleur rouille | 1821 |
| Hypsizygus | tessulatus | | (Bull.) Singer | Pleurotus tessulatus | Lyophylle tesselé | 1822 |
| Hypsizygus | ulmarius | | Bull. | Lyophyllum ulmarium - Ple | Lyophylle de l'orme | 1823 |
| Imleria | badia | | (Fr.) Vizzini | Boletus badius - Xerocomu | Bolet bai | 1824 |
| Imperator | luteocupreus | | (Bertéa & Estad | Boletus luteocupreus | Bolet cuivré | 1825 |
| Imperator | rhodopurpureus | | (Smotl.) Assyov | Boletus rhodopurpureus | Bolet vieux rose | 1826 |
| Imperator | rhodopurpureus | fo. polypurpureus | Smotl. | | Forme rouge pourpre de Imperator rhodopurpureus | 1827 |
| Imperator | rhodopurpureus | fo. xanthopurpureus | Smotl. | Boletus xanthopurpureus | Forme jaune de Imperator rhodopurpureus | 1828 |
| Imperator | torosus | | (Fr.) Assyov et a | Boletus torosus | Bolet massif | 1829 |
| Imperator | xanthocyaneus | | (Raimain) Klofac | Boletus xanthocyaneus | Bolet jaune et bleu | 273 |
| Infundibulicybe | alkaliviolascens | | (Bellu) Bellu | Clitocybe alkaliviolascens | Clitocybe réagissant en violet avec KOH | 1830 |
| Infundibulicybe | geotropa | | (Bull.) Harmaja | Clitocybe geotropa | Tête de moine | 1834 |
| Infundibulicybe | gibba | | (Pers.) Harmaja | Clitocybe gibba | Clitocybe bossu | 1835 |
| Infundibulicybe | gigas | | (Harmaja) Harm | Clitocybe gigas - Clitocybe | Clitocybe géant | 1836 |
| Infundibulicybe | lateritia | | (J. Favre) Vizzini | Clitocybe lateritia | Clitocybe à chapeau couleur de brique | 417 |
| Infundibulicybe | meridionalis | | (Bon) Pérez de C | Clitocybe meridionalisClito | Clitocybe méridional | 1839 |
| Infundibulicybe | squamulosa | | (Pers.) Harmaja | Clitocybe squamulosa | Clitocybe squamuleux | 435 |
| Inocutis | rheades | | (Pers.) Fiasson & | Inonotus rheades - Xantho | Polypore roux | 1840 |
| Inocutis | tamaricis | | (Pat.) Fiasson & | Inonotus tamaricis - Polyp | Polypore du Tamaris | 1841 |
| Inocybe | abietis | | Kühner | | Inocybe des sapins | 1842 |
| Inocybe | acuta | | Boud. | Inocybe acutella - Inocybe | Inocybe à mamelon pointu | 1843 |
| Inocybe | aeruginascens | | Babos | Inocybe pintureaui - Inocyl | Inocybe verdâtre | 1845 |
| Inocybe | amblyspora | | Kühner | | Inocybe à spores obtuses | 1848 |
| Inocybe | angulatosquamulosa | | Stangl | | Inocybe à squames angulaires | 3720 |
| Inocybe | appendiculata | | Kuhner | | Inocybe à marge piléïque appendiculée | 1849 |
| Inocybe | assimilata | | (Britzelm.) Sacc. | Inocybe umbrina | Inocybe brun d'ombre | 1851 |
| Inocybe | asterospora | | Quél. | | Inocybe à spores étoilées | 1852 |

| | | | | | |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|--|------|
| Inocybe | astraiana | | Bandini & B. Oertel | Inocybe d'Astraios (dieu grec) | 3721 |
| Inocybe | bresadolae | | Massee | Inocybe de Bresadola | 1855 |
| Inocybe | brunnea | | Quél. | Inocybe rimosa var. brunnea | 1856 |
| Inocybe | brunneotomentosa | | Huijsman | Inocybe feutré de brun | 1857 |
| Inocybe | calospora | | Quél. | Inocybe à jolies spores | 1859 |
| Inocybe | capucina | | (Fr.) P. Karst. | Inocybe en capuchon | 1860 |
| Inocybe | cincinnata | | (Fr.) Quél. | Inocybe phaeocomis - Inocybe | 1862 |
| Inocybe | coelestium | | Kuyper | Inocybe céleste | 1863 |
| Inocybe | corydalina | | Quél. | Inocybe à odeur de corydaline | 1866 |
| Inocybe | cucullata | | C. Martin | Inocybe en capuchon | 1867 |
| Inocybe | curvipes | | P. Karst. | Inocybe boltonii - Inocybe | 1868 |
| Inocybe | curvipes | fo. alba | Ferville & Grobelny | Forme blanche d'Inocybe curvipes | 1869 |
| Inocybe | decemgibbosa | | (Kühner) Vauras | Inocybe oblectabilis fo. decemgibbosa | 1870 |
| Inocybe | decipiens | | Bres. | Inocybe trompeur | 1871 |
| Inocybe | dulcamara | | (Pers.) P. Kumm. | Inocybe doux-amer | 1872 |
| Inocybe | erinaceomorpha | | Stangl & Veselsky | Inocybe hérisson | 1874 |
| Inocybe | euviolacea | | E. Ludw. | Inocybe geophylla var. euviolacea | 1889 |
| Inocybe | favrei | | Bon | Inocybe de Favre | 1876 |
| Inocybe | fibrosa | | (Sowerby) Gillet | Inocybe fibreux | 1877 |
| Inocybe | flocculosa | | Sacc. | Inocybe gausapata - Inocybe | 1879 |
| Inocybe | fraudans | | Pers. | Inocybe pyriodora | 1880 |
| Inocybe | furfurea | | Kühner | Inocybe à chapeau furfuracé | 1882 |
| Inocybe | fuscidula | | Velen. | Inocybe virgatula - Inocybe | 1883 |
| Inocybe | fuscomarginata | | Kühner | Inocybe à arête des lames brunes | 1884 |
| Inocybe | fuscomarginata | var. amicorum | Eyssart. | Variété des saules de Inocybe fuscomarginata | 1885 |
| Inocybe | geophylla | | P. Kumm. | Inocybe à lames terreuses | 1887 |
| Inocybe | geophylla | var. lilacina | (Peck) Gillet | Inocybe geophylla de couleur lilas | 1888 |
| Inocybe | glabrodisca | | P.D. Orton | Inocybe à disque glabre | 1890 |
| Inocybe | godeyi | | Gillet | Inocybe de Godey | 1891 |
| Inocybe | goniopusio | | Stangl | Petit inocybe goniosporé | 1892 |
| Inocybe | grammata | | Quél. | Inocybe rayé | 1893 |
| Inocybe | griseolilacina | | J.E. Lange | Inocybe gris lilas | 1895 |
| Inocybe | haemacta | | (Berk. & Cooke) Sacc. | Inocybe rouge et vert | 1896 |
| Inocybe | helobia | | (Kuyper) Bandini | Inocybe lacera var. helobia | 1909 |
| Inocybe | hirtella | | Bres. | Inocybe à odeur d'amandes amères | 1898 |
| Inocybe | huijsmanii | | Kuyper | Inocybe de Huijsman | 1899 |
| Inocybe | hygrophana | | Glowinski & Stangl | Inocybe hygrophane | 1900 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--|------|
| Inocybe | hypophaea | | Furrer-Ziogas | | Inocybe brun | 1901 |
| Inocybe | hypophaea | var. bisporigera | Kuyper | | Inocybe hypophaea variété bisporique | 1902 |
| Inocybe | hystrix | | (Fr.) P. Karst. | | Inocybe hérisson | 1903 |
| Inocybe | impexa | | (Lasch) Kuyper | Inocybe lacera var. marin | Inocybe lacera variété maritime | 1910 |
| Inocybe | incarnata | | Bres. | Inocybe pyriodora fo. incar | Inocybe incarnat | 1904 |
| Inocybe | ionochlora | | Romagn. | | Inocybe jaune verdâtre | 1905 |
| Inocybe | krieglsteineri | | Fernandez Sasia | | Inocybe de Krieglsteiner | 1907 |
| Inocybe | lacera | | (Fr.) Fr. | | Inocybe à pied brunissant | 1908 |
| Inocybe | langei | | R. Heim | | Inocybe de Lange | 1911 |
| Inocybe | lanuginosa | | Bull. | Inocybe ovatocystis | Inocybe laineux | 1912 |
| Inocybe | lavandulochroa | | Esteve-Rav. & Villareal | | Inocybe à pied couleur lavande | 1913 |
| Inocybe | leptophylla | | G.F. Atk. | Inocybe lanuginosa var. ca | Inocybe brun bistre | 1914 |
| Inocybe | lutescens | | Velen. | | Inocybe jaunissant | 1917 |
| Inocybe | margaritispota | | (Berk.) Sacc. | Inocybe phaeosticta | Inocybe à spores étoilées | 1920 |
| Inocybe | mixtilis | | (Britzelm.) Sacc. | | Inocybe à bulbe marginé | 1921 |
| Inocybe | moelleri | | Eyssart. & Delannoy | | Inocybe de Moeller | 1922 |
| Inocybe | napipes | | J.E. Lange | | Inocybe à bulbe napiforme | 1923 |
| Inocybe | nitidiuscula | | (Britzelm.) Lapl. | Inocybe friesii | Inocybe de Fries | 1924 |
| Inocybe | oblectabilis | | (Britzelm.) Sacc. | | Inocybe de bel aspect | 1925 |
| Inocybe | obscura | | (Pers.) Gillet | | Inocybe obscur | 1926 |
| Inocybe | ochroalba | | Bruyl. | Inocybe albovelata | Inocybe à chapeau ocre voilé de blanc | 3722 |
| Inocybe | oreadoides | | Carteret | | Sosie du Marasme des oréades | 1929 |
| Inocybe | paludinella | | Peck | | Inocybe des marécages | 1930 |
| Inocybe | pargasensis | | Vauras | | Proche d'Inocybe grammata | 1932 |
| Inocybe | pelargonium | | Kühner | | Inocybe à odeur de géranium | 1934 |
| Inocybe | petiginosa | | (Fr.) Fr. | | Inocybe darteux | 1936 |
| Inocybe | phaeodisca | | Kühner | | Inocybe à centre sombre | 1937 |
| Inocybe | phaeodisca | var. diosma | Reumaux | | Inocybe phaeodisca à odeur pélargoniée | 1938 |
| Inocybe | phaeodisca | var. geophylloides | Kühner | | Inocybe phaeodisca de couleur blanche | 1939 |
| Inocybe | phaeoleuca | | Kühner | Inocybe splendens var. pha | Inocybe au disque voilé | 1940 |
| Inocybe | pisciodorum | | (Donadini & Rio | Inocybe pisciodoraInocybe | Inocybe à odeur de poisson | 1854 |
| Inocybe | posterula | | (Britzelm.) Sacc. | Inocybe xanthodisca | Inocybe à disque jaune | 1942 |
| Inocybe | praetervisa | | Quél. | | Inocybe à pied blanc | 1943 |
| Inocybe | pseudodestructa | | Stangl & Veselsky | | Inocybe à chapeau lacéré | 1945 |
| Inocybe | pusio | | P. Karst. | | Inocybe nain | 1946 |
| Inocybe | pusio | var. floccipes | Esteve-Rav. et Fouchier | | Inocybe pusio à pied prumineux | 1947 |
| Inocybe | queletii | | Konrad | | Inocybe de Quélet | 1948 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|
| Inocybe | rufoalba | | Sacc. | Inocybe jacobi | Inocybe de Jacob | 1906 |
| Inocybe | rufuloides | | Bon | | Proche de Inocybe rufula | 1951 |
| Inocybe | salicis-herbaceae | | Kühner | | Inocybe des saules nains | 1952 |
| Inocybe | sambucina | | (Fr.) P. Karst. | Inocybe geophylla var. sam | Inocybe fleur de sureau | 1953 |
| Inocybe | scabella | | P. Kumm. | | Inocybe à chapeau écailleux | 1954 |
| Inocybe | semifulva | | Grund & D.E. Stuntz | | Inocybe à chapeau brun jaune | 3723 |
| Inocybe | similis | | Bres. | | Inocybe à chapeau ébouriffé | 1955 |
| Inocybe | sindonia | | (Fr.) P. Karst. | Inocybe commutabilis - Inc | Inocybe couleur mastic | 1956 |
| Inocybe | splendens | | R. Heim | | Inocybe splendide | 3697 |
| Inocybe | stellatospora | | (Peck) Massee | | Inocybe à spores étoilées | 1959 |
| Inocybe | subcarpta | | Kühner & Bours | Inocybe carpta | Inocybe déchiré | 1960 |
| Inocybe | tabacina | | Furrer-Ziogas | | Inocybe couleur tabac | 1963 |
| Inocybe | tarda | | Kühner | | Inocybe tardif | 1964 |
| Inocybe | tenebrosa | | Qué. | Inocybe atripes | Inocybe à pied noir | 1965 |
| Inocybe | teraturgus | | M.M. Moser | | Inocybe des sphaignes | 1966 |
| Inocybe | tricolor | | Kühner | Inocybe corydalina var. tric | Inocybe tricolore | 1968 |
| Inocybe | umbratica | | Qué. | Inocybe paludinella var. (o | Inocybe sciaphile | 1969 |
| Inocybe | vaccina | | Kühner | | | 3783 |
| Inocybe | viscosissima | | (Fr.) P. Karst. | | Inocybe à chapeau visqueux | 1970 |
| Inocybe | whitei | | (Berk. & Broome | Inocybe pudica | Inocybe pudique | 1971 |
| Inocybe | xanthomelas | | Kühner & Boursier | | Inocybe jaune noircissant | 1972 |
| Inonotus | cuticularis | | (Bull.) P. Karst. | Xanthochrous cuticularis - | Polypore peigné | 1973 |
| Inonotus | hispidus | | (Fr.) P. Karst. | Polyporus hispidus - Xanth | Polypore hispide | 1974 |
| Inonotus | obliquus | | (Fr.) Pilát | Polyporus obliquus - Xanth | Polypore incrusté | 1976 |
| Inosperma | adaequatum | | (Britzelm.) Math | Inocybe jurana - Inocybe a | Inocybe du Jura | 1844 |
| Inosperma | bongardii | | (Weinm.) Mathe | Inocybe bongardii - Inocyb | Inocybe à odeur de benjoin | 1853 |
| Inosperma | calamistratum | | (Fr.) Matheny & | Inocybe calamistrata | Inocybe à base du pied bleu-vert | 1858 |
| Inosperma | cervicolor | | (Pers.) Matheny | Inocybe cervicolor | Inocybe couleur de cerf | 1861 |
| Inosperma | cookei | | (Bres.) Matheny | Inocybe cookei | Inocybe de Cooke | 1864 |
| Inosperma | erubescens | | (A. Blytt) Mathe | Inocybe erubescens - Inocy | Inocybe de Patouillard | 1933 |
| Inosperma | fulvum | | (Bon) Matheny & | Inocybe maculata fo. fulva | Forme fauve d'Inocybe maculata | 1919 |
| Inosperma | geraniodorum | | (J. Favre) Mathe | Inocybe geraniodora var.de | Inocybe alpin pelargonié | 3784 |
| Inosperma | kuthanii | | (Stangl & Vesely | Inocybe kuthanii - Inocybe | Inocybe de Kuthan | 1865 |
| Inosperma | lilofastigiatum | | (Stangl & Vesely | Inocybe fastigiata var. (fo.) | Inocybe à pied violacé | 1916 |
| Inosperma | maculatum | | (Boud.) Mateny | Inocybe maculata | Inocybe maculé | 1918 |
| Inosperma | quietiodor | | (Bon) Matheny & | Inocybe quietiodor | Inocybe à odeur de lessive | 1949 |
| Inosperma | rhodiola | | (Bres.) Matheny | Inocybe jurana var. rhodio | Inocybe à disque rougeâtre | 1950 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|--------------------|----------------------|---|--|------|
| Irpex | lacteus | | (Fr.) Fr. | Trametes lactea - Xylodon | Irpex blanc de lait | 1977 |
| Irpiciporus | pachyodon | | (Pers;) Kotl. & Peck | Irpex pachyodon - Sarcodon | Polypore denté | 3366 |
| Ischnoderma | benzoinum | | (Wahlenb.) P. Karst | Lasiochlaena benzoina | Polypore à odeur de benjoin | 1978 |
| Ischnoderma | resinosum | | (Schrad.) P. Karst | Ungulina fuliginosa | Polypore résineux | 1979 |
| Jackrogersella | cohaerens | | (Pers.) L. Wendt | Hypoxyton cohaerens - Anisotelia | Hypoxyton confluent | 1980 |
| Jackrogersella | multiformis | | (Fr.) L. Wendt, Kuhn | Hypoxyton multiforme | Hypoxyton multiforme | 1981 |
| Junghuhnia | nitida | | (Pers.) Ryvarden | Polyporus nitidus - Chaetium | Junghuhnie magnifique | 1982 |
| Kretzschmaria | deusta | | (Hoffm.) P.M.D. | Ustelina deusta - Hypoxyton | Hypoxyton brûlé | 1983 |
| Kuehneromyces | mutabilis | | (Schaeff.) Singer | Pholiota mutabilis | Pholiote changeante | 1985 |
| Laccaria | amethystina | | (Huds.) Cooke | Laccaria amethystea | Laccaria améthyste | 1987 |
| Laccaria | bicolor | | (Maire) P.D. Orton | Laccaria laccata var. bicolor | Laccaria à deux couleurs | 1988 |
| Laccaria | laccata | | (Scop.) Cooke | | Laccaria laquée | 1989 |
| Laccaria | laccata | var. pallidifolia | (Peck) Peck | | Laccaria à lames pâles | 1986 |
| Laccaria | lateritia | | Malençon | Laccaria fraterna sensu auct. | Laccaria couleur de brique | 1990 |
| Laccaria | macrocystidiata | | (Migl. & Lév.) Lév. | Laccaria affinis fo. macrocystidiata | Laccaria à grandes cystides | 1991 |
| Laccaria | proxima | | (Boud.) Pat. | Laccaria laccata var. moellerae | Laccaria à chapeau méchuleux | 1992 |
| Laccaria | proximella | | Singer | Laccaria proximella | Laccaria des saules nains | 1993 |
| Laccaria | pumila | | Fayod | Laccaria altaica - Laccaria laevis | Laccaria modeste | 1994 |
| Laccaria | purpureobadia | | D.A. Reid | | Laccaria brun pourpre | 1995 |
| Laccaria | tetraspora | | Singer | | Laccaria tétrasporique | 1996 |
| Laccaria | tortilis | | (Bolton) Cooke | | Laccaria tortueux | 1997 |
| Laccaria | trichodermophora | | G.M. Muell. | | Laccaria proche de Laccaria bicolor | 1998 |
| Laccaria | vinaceorosea | | Contu | | Laccaria rose vineux | 1999 |
| Laccariopsis | mediterranea | | (Paccioni & Lallier) | Oudemansiella mediterranea | Collybie méditerranéenne | 2000 |
| Lachnellula | calyciformis | | (Willd.) Dharne | Peziza calyciformis | Pézize en forme de calice | 2001 |
| Lachnellula | subtilissima | | (Cooke) Dennis | Peziza subtilissima | Pézize à marge ciliée | 2002 |
| Lachnellula | suecica | | (de Bary) Nannf. | Pithya suecica | | 3785 |
| Lachnellula | willkommii | | (R. Hartig) Dennis | Peziza willkommii - Dasyscypha | Chancre du mélèze | 2003 |
| Lachnum | virgineum | | (Batsch) P. Karst | Dasyscyphus virgineus - Peziza | Lachnum blanc | 2004 |
| Lacrymaria | glareosa | | (J. Favre) Watling | Drosophila glareosa - Psathyrella | Psathyrelle des glariers | 2005 |
| Lacrymaria | lacrymabunda | | Bull. | Lacrymaria velutina - Psathyrella | Psathyrelle veloutée | 2006 |
| Lacrymaria | pyrotricha | | Holmsk. | Psathyrella pyrotricha - Drosophila | Psathyrelle flamboyante | 2007 |
| Lactarius | acerrimus | | Britzelm. | | Lactaire à lames interveinées | 2008 |
| Lactarius | acris | | (Bolton) Gray | | Lactaire âcre | 2009 |
| Lactarius | albocarneus | | Britzelm. | Lactarius glutinopallens | Lactaire glutineux | 2010 |
| Lactarius | albocarneus | var. glutinovirens | (J. Blum) Bon | Lactarius glutinopallens var. glutinovirens | Variété olivâtre du Lactaire albocarneus | 2011 |
| Lactarius | alpinus | | Peck | Lactarius alpigenus - Lactarius | Lactaire des aulnes | 2012 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|------|
| Lactarius | aquizonatus | | Kytöv. | | Lactaire citron pâle | 2013 |
| Lactarius | aspideus | | (Fr.) Fr. | Lactarius uvidus var. aspid | Lactaire des saules | 2014 |
| Lactarius | atlanticus | | Bon | | Lactaire des chênes verts | 2015 |
| Lactarius | aurantiacus | | (Pers.) Gray | Lactarius aurantiofulvus | Lactaire fauve orangé | 2016 |
| Lactarius | azonites | | (Bull.) Fr. | Lactarius fuliginosus var. (f | Lactaire à pied blanc | 2017 |
| Lactarius | azonites | fo. virgineus | (J.E. Lange) Verbeke | | Forme blanche du Lactaire azonites | 2018 |
| Lactarius | badiosanguineus | | Kühner & Romagn. | | Lactaire rouge sombre | 2019 |
| Lactarius | blennius | | Fr. | | Lactaire muqueux | 2020 |
| Lactarius | blennius | fo. albidopallens | J.E. Lange | | Forme pâle du Lactaire muqueux | 2021 |
| Lactarius | blennius | var. viridis | (Schrad.) Qué. | | Forme olivâtre du Lactaire muqueux | 2022 |
| Lactarius | britannicus | fo. pseudofulvissimus | (Bon) Basso | | Forme ressemblant à Lactarius fulvissimus | 2024 |
| Lactarius | brunneoviolaceus | | M.P. Christ. | Lactarius robertianus | Lactaire brun violet | 2025 |
| Lactarius | camphoratus | | (Bull.) Fr. | | Lactaire camphré | 2026 |
| Lactarius | castanopus | | Sarnari | | Lactaire à pied velouté de brun | 2027 |
| Lactarius | chrysorrheus | | Fr. | | Lactaire à lait jaunissant | 2028 |
| Lactarius | circellatus | | Fr. | | Lactaire à petits cernes | 2029 |
| Lactarius | cistophilus | | Bon & Trimbach | | Lactaire des cistes | 2030 |
| Lactarius | citriolens | | Pouzar | | Lactaire à odeur de citron | 2031 |
| Lactarius | controversus | | Pers. | | Lactaire des peupliers | 2032 |
| Lactarius | cyanopus | | Basso | | Lactaire à pied bleu | 2033 |
| Lactarius | cyathuliformis | | Bon | | Lactaire petite coupe | 2034 |
| Lactarius | decipiens | | Qué. | Lactarius rubescens | Lactaire trompeur | 2035 |
| Lactarius | deliciosus | | L. | | Lactaire délicieux | 2036 |
| Lactarius | deterimus | | Gröger | | Lactaire des épicéas | 2037 |
| Lactarius | evosmus | | Kühner & Romagn. | | Lactaire à odeur de pomme | 2038 |
| Lactarius | fascinans | | Fr. | | Lactaire fascinant | 2039 |
| Lactarius | fennoscandicus | | Verbeke & Vesterh. | | Lactaire sanguin à chapeau gris | 2040 |
| Lactarius | flavidus | | Boud. | Lactarius aspideus var. flav | Lactaire jaune à lait violet | 2041 |
| Lactarius | flavopalustris | | Kytöv. | | Lactaire des bouleaux à lait violet | 2042 |
| Lactarius | flexuosus | | Gray | Lactarius roseozonatus | Lactaire flexueux | 2043 |
| Lactarius | fluens | | Boud. | | Lactaire pisse-lait | 2044 |
| Lactarius | fraxineus | | Romagn. | | Lactaire des frênes | 2045 |
| Lactarius | fuliginosus | | (Fr.) Fr. | | Lactaire fuligineux | 2046 |
| Lactarius | fulvissimus | | Romagn. | Lactarius britannicus | Lactaire fauve | 2047 |
| Lactarius | glyciosmus | | (Fr.) Fr. | | Lactaire à odeur de noix de coco | 2048 |
| Lactarius | helodes | | A. Favre & Guichard | | Lactaire des marécages | 2049 |
| Lactarius | helvus | | Fr. | | Lactaire à odeur de chicorée | 2050 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|
| Lactarius | hepaticus | | Plowright | | Lactaire couleur de foie | 2051 |
| Lactarius | hysginus | | (Fr.) Fr. | Lactarius curtus sensu auct | Lactaire cireux | 2052 |
| Lactarius | ilicis | | Sarnari | | Lactaire des chênes verts | 2053 |
| Lactarius | illyricus | | Piltaver | | Lactaire méridional | 2054 |
| Lactarius | intermedius | | Krombh ex Berk. & Broome | | Lactaire intermédiaire | 2055 |
| Lactarius | lacunarum | | Romagn. ex Hora | | Lactaire des bourbiers | 2056 |
| Lactarius | leonis | | Kytöv. | | Lactaire couleur de lion | 2057 |
| Lactarius | lepidotus | | Hesler & A.H. Sm. | | Lactaire squamuleux | 2058 |
| Lactarius | lignyotus | | Fr. | | Lactaire couleur de suie | 2059 |
| Lactarius | lilacinus | | Fr. | | Lactaire lilacin | 2060 |
| Lactarius | luridus | | Pers. | | Lactaire blafard | 2061 |
| Lactarius | mairei | | Malençon | | Lactaire de Maire | 2062 |
| Lactarius | mammosus | | Fr. | Lactarius fuscus | Lactaire mamelonné à odeur de coco | 2063 |
| Lactarius | mitissimus | | (Fr.) Fr. | | Lactaire très doux | 2064 |
| Lactarius | musteus | | Fr. | | Lactaire pâle des tourbières | 2065 |
| Lactarius | nanus | | J. Favre | | Lactaire nain | 2066 |
| Lactarius | necator | | Bull. | Lactarius plumbeus - Lacta | Lactaire plombé | 2067 |
| Lactarius | obscuratus | | Fr. | Lactarius obscuratus var. r | Lactaire obscur | 2068 |
| Lactarius | omphaliformis | | Romagn. | | Lactaire fausse omphale | 2069 |
| Lactarius | pallidus | | Pers. | | Lactaire pâle | 2070 |
| Lactarius | picinus | | Fr. | | Lactaire enfumé | 2071 |
| Lactarius | porniniae | | Rolland | Lactarius porninsis | Lactaire des mélèzes | 2072 |
| Lactarius | pseudouvidus | | Kühner | | Lactaire humide de la zone alpine | 2073 |
| Lactarius | pterosporus | | Romagn. | | Lactaire à spores ailées | 2074 |
| Lactarius | pubescens | | Fr. | | Lactaire pubescent | 2075 |
| Lactarius | pyrogalus | | (Bull.) Fr. | | Lactaire à lait brûlant | 2076 |
| Lactarius | quieticolor | | Romagn. | Lactarius deliciosus var. qu | Lactaire gris orangé | 2077 |
| Lactarius | quieticolor | var. hemicyaneus | (Romagn.) Basso | | Lactaire quieticolor nuancé de bleu | 2078 |
| Lactarius | quietus | | (Fr.) Fr. | | Lactaire à odeur de punaise | 2079 |
| Lactarius | repraesentaneus | | Britzelm. | | Lactaire remarquable | 2080 |
| Lactarius | resimus | | (Fr.) Fr. | | Lactaire incurvé | 2081 |
| Lactarius | romagnesii | | Bon | | Lactaire de Romagnesi | 2082 |
| Lactarius | rostratus | | Heilmann-Claus | Lactarius cremor sensu auct | Lactaire à odeur de lierre | 2084 |
| Lactarius | rubrocinctus | | Fr. | | Lactaire à ceinture rouge | 2085 |
| Lactarius | rubrozonatus | | Lalli & Pacioni | | Lactaire zoné de rouge | 2086 |
| Lactarius | rufus | | Fr. | | Lactaire roux | 2087 |
| Lactarius | ruginosus | | Romagn. | | Lactaire à marge festonnée | 2088 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|---|------|
| Lactarius | salicis-herbaceae | | Kühner | | Lactaire des saules herbacés | 2089 |
| Lactarius | salicis-reticulatae | | Kühner | | Lactaire des saules réticulés | 2090 |
| Lactarius | salmonicolor | | R. Heim & Leclair | | Lactaire couleur saumon | 2091 |
| Lactarius | sanguifluus | | (Paulet) Fr. | Lactarius vinosus | Lactaire sanguin | 2092 |
| Lactarius | scoticus | | Berk. & Broome | Lactarius favrei - Lactarius | Lactaire du bouleau | 2093 |
| Lactarius | scrobiculatus | | Fr. | | Lactaire scrobiculé | 2094 |
| Lactarius | semisanguifluus | | R. Heim & Leclair | | Lactaire semi-sanguin | 2095 |
| Lactarius | serifluus | | Fr. | Lactarius cimicarius | Lactaire à lait séreux | 2096 |
| Lactarius | sphagneti | | (Fr.) Neuhoff | | Lactaire des sphaignes | 2097 |
| Lactarius | spinosulus | | Quél. | | Lactaire épineux | 2098 |
| Lactarius | subcircellatus | | Kühner | Lactarius circellatus var. al | Lactaire proche de Lactarius circellatus | 2099 |
| Lactarius | subdulcis | | Pers. | | Lactaire presque doux | 2100 |
| Lactarius | subruginosus | | Blum ex Bon | | Lactaire ruguleux | 2101 |
| Lactarius | subumbonatus | | Lindgr. | | Lactaire presque umboné | 2102 |
| Lactarius | syringinus | | Z. Schaef. | | Voisin de Lactarius vietus | 2103 |
| Lactarius | tabidus | | Fr. | Lactarius theiogalus sensu | Lactaire chiffonné | 2104 |
| Lactarius | tesquorum | | Malençon | | Lactaire des maquis | 2105 |
| Lactarius | torminosus | | (Schaeff.) Pers. | | Lactaire à toisons | 2106 |
| Lactarius | trivialis | | (Fr.) Fr. | | Lactaire trivial | 2107 |
| Lactarius | tuomikoskii | | Kytöv. | | Lactaire de Tuomikoski | 2108 |
| Lactarius | utilis | | (Weinem.) Fr. | | Lactaire utile | 2109 |
| Lactarius | uvidus | | (Fr.) Fr. | | Lactaire humide | 2110 |
| Lactarius | vellereus | var. hometii | (Gillet) Boud. | Lactarius hometii | Lactaire velouté à latex virant au lilas | 2111 |
| Lactarius | vietus | | (Fr.) Fr. | | Lactaire fané | 2112 |
| Lactarius | violascens | | Fr. | Lactarius uvidus var. violas | Lactaire violascent | 2114 |
| Lactarius | zonarioides | | Kühner & Romagn. | | Lactaire proche du Lactaire zoné | 2115 |
| Lactarius | zonarius | | (Bull.) Fr. | | Lactaire zoné | 2116 |
| Lactarius | zonarius | fo. scrobipes | (Kühner & Romagn.) Quadr. | | Forme à pied scrobiculé de Lactarius zonarius | 2117 |
| Lactarius | zugazae | | G. Moreno et al. | | Lactaire de Zugaza | 2118 |
| Lactifluus | bertillonii | | (Neuhoff ex Z. S) | Lactarius bertilloniiLactariu | Lactaire de Bertillon | 2119 |
| Lactifluus | brunneoviolascens | | (Bon) Verbeken | Lactarius brunneoviolascen | Lactaire salissant | 2120 |
| Lactifluus | glaucescens | | (Crossl.) Verbek | Lactarius glaucescens - Lac | Lactaire à lait verdissant | 2121 |
| Lactifluus | oedematopus | | (Scop.) Kuntze | Lactarius oedematopusLac | Lactaire à pied renflé | 2122 |
| Lactifluus | piperatus | | L. | Lactarius piperatus | Lactaire poivré | 2123 |
| Lactifluus | rugatus | | (Kühner & Romagn) | Lactarius rugatus | Lactaire flamboyant | 2124 |
| Lactifluus | subvolemus | | Van de Putte & Verbeken | | Proche de Lactarius volemus | 2125 |
| Lactifluus | vellereus | | (Fr.) Fr. | Lactarius vellereus | Lactaire velouté | 2126 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|
| Lactifluus | volemus | | (Fr.) Kuntze | Lactarius volemus | Lactaire à lait abondant (Vachotte) | 2127 |
| Lactocollybia | variicystis | | D.A. Reid & Eicker | | Collybie à cystides différentes | 2128 |
| Laeticutis | cristata | | (Schaeff.) Audet | Albatrellus cristatus - Polyp | Polypore à chapeau craquelé | 3336 |
| Laetiporus | sulphureus | | Bull. | Polyporus sulphureus | Polypore soufré | 2129 |
| Lamprospora | ammophila | | (Saut.) Boud. | Aleuria ammophila - Peziza | Pézize arénicole | 2706 |
| Langermannia | pachyderma | | (Peck) Kreisel | Calvatia pachyderma | Calvatie peau d'éléphant | 311 |
| Lanmaoa | fragrans | | (Vittad.) Vizzini | Boletus fragrans | Bolet odorant | 2130 |
| Lanzia | echinophila | | (Bull.) Korf | Rutstroemia echinophila - | Pézize des bogues de châtaignes | 3294 |
| Lasiosphaeria | ovina | | (Pers.) Ces. & de Not. | | Laeiosphaeria des brebis | 2131 |
| Laxitextum | bicolor | | (Pers.) Lentz | Stereum fuscum | Laxitextum bicolore | 2132 |
| Leccinellum | corsicum | | (Rolland) Bresin | Leccinum crocipoium var. c | Bolet de Corse | 2138 |
| Leccinellum | crocipodium | | (Letell.) Della M | Boletus tesselatus - Boletu | Bolet à pied jaune safran | 2139 |
| Leccinellum | lepidum | | (H. Bouchet ex E | Boletus lepidus - Leccinum | Bolet des chênes verts | 2144 |
| Leccinellum | pseudoscabrum | | (Kallenb.) Mikšič | Boletus pseudoscaberLecc | Bolet des charmes | 2149 |
| Leccinum | albastipitatum | | Den Bakker & N | Leccinum aurantiacum sens | Bolet à pied orné de mèches blanches | 2133 |
| Leccinum | aurantiacum | | (Bull.) Gray | Leccinum quercinum sensu | Bolet orangé | 2134 |
| Leccinum | callitricum | | Redeuilh | | Bolet à chapeau écailleux | 2137 |
| Leccinum | cyaneobasileucum | | Lannoy & Estadè | Leccinum cyaneobasileucu | Bolet blanc à base du pied bleue | 2140 |
| Leccinum | duriusculum | | (S. Schulz,) Singe | Boletus duriusculusLeccinu | Bolet rude des trembles | 2141 |
| Leccinum | floccopus | | (E.-J. Gilbert) Re | Leccinum floccopus fo. flav | Forme jaunâtre de Leccinum versipelle | 2154 |
| Leccinum | fuscoalbum | | (Sowerby) Lann | Boletus fuscoalbus - Leccin | Bolet brun et blanc | 2142 |
| Leccinum | holopus | | (Rostk.) Watling | Boletus holopus | Bolet à long pied | 2143 |
| Leccinum | holopus | var. aerugineum | (Fries) Blanco-Di | Leccinum aerugineumBole | Bolet rude vert de gris | 3698 |
| Leccinum | melaneum | | (Smotl.) Pilát & | Leccinum scabrum var. me | Bolet raboteux sombre | 2145 |
| Leccinum | molle | | (Bon) Bon | | Bolet mou | 2146 |
| Leccinum | piceinum | | Pilát & Dermek | Boletus piceinus | Bolet des épïcées | 2147 |
| Leccinum | pulchrum | | Lannoy & Estadès | | Bolet panaché | 2150 |
| Leccinum | scabrum | | (Bull.) Gray | Boletus scaber | Bolet rude | 2151 |
| Leccinum | variicolor | | Watling | Boletus variicolor - Krombl | Bolet ramoneur | 2152 |
| Leccinum | versipelle | | (Fr.) Snell | Leccinum testaceoscabrum | Bolet roux | 2153 |
| Leccinum | vulpinum | | Watling | Boletus vulpinus | Bolet roux des pins | 2155 |
| Legaliana | badia | | (Pers.) Van Voor | Aleuria badia - Galactinia b | Pézize baie | 2708 |
| legaliana | limnaea | | (Maas Geest.) V | Peziza limnaea | Pézize des marécages | 2712 |
| Lentinellus | castoreus | | (Fr.) Kühner & M | Lentinus castoreus - Lentin | Lentin castor | 2156 |
| Lentinellus | castoreus | fo. ochropallidus | (P.A. Moreau) R | Lentinellus ursinus fo. och | Forme ochre de Lentinellus castoreus | 2157 |
| Lentinellus | cochleatus | | (Pers.) P.Karst. | Lentinellus marcelianus | Lentin en colimaçon | 2158 |
| Lentinellus | cystidiosus | | R.H. Petersen | Lentinellus omphalodes se | Lentin non lignicole | 2159 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|------|
| Lentinellus | flabelliformis | | (Bolton) S. Ito | Lentinus flabelliformis | Lentin flabelliforme | 2160 |
| Lentinellus | inolens | | (Konrad & Mauk | Lentinellus cochleatus var. | Lentin en colimaçon inodore | 2162 |
| Lentinellus | micheneri | | (Berk. & M.A. C | Lentinellus bisus - Lentinus | Lentin en forme d'omphale | 2164 |
| Lentinellus | tridentinus | | (Sacc. & P. Syd.) | Lentinus tridentinus | Lentin du Trentin | 2165 |
| Lentinellus | ursinus | | (Fr.) Kühner | | Lentin couleur d'ours | 2166 |
| Lentinellus | vulpinus | | (Sowerby) Kühn | Lentinus vulpinus | Lentin couleur de renard | 2167 |
| Lentinula | edodes | | (Berk.) Pegler | | Shii-také | 2168 |
| Lentinus | arcularius | | (Batch) Zmitr. | Leucoporus arcularius - Po | Polypore à pores losangiques | 2169 |
| Lentinus | brumalis | | (Pers.) Zmitr. | Leucoporus brumalis - Poly | Polypore hivernal | 2170 |
| Lentinus | substrictus | | (Bolton) Zmitr. | Polyporus ciliatus | Polypore à marge ciliée | 2171 |
| Lentinus | tigrinus | | (Bull.) Fr. | Panus tigrinus - Pleurotus | Lentin tigré | 2172 |
| Lenzites | betulinus | | (L.) Fr. | Trametes betulina | Lenzite du bouleau | 2173 |
| Leocarpus | fragilis | | (Dicks.) Rostaf. | | Leocarpus fragile | 2175 |
| Leotia | lubrica | | Pers. | Leotia viscosa | Leotie lubrique | 2176 |
| Lepiota | boudieri | | Bres. | Lepiota fulvella - Lepiota h | Lépiote de Boudier | 2178 |
| Lepiota | boudieri | var. alba | Kelderman | | Variété blanche de Lépiota boudieri | 2179 |
| Lepiota | brunneoincarnata | | Chodat & C. Ma | Lepiota brunneoincarnata | Lépiote brun rose | 3786 |
| Lepiota | brunneoincarnata | | Chodat & C. Martin | | Lépiote brun-rose | 2180 |
| Lepiota | brunneoincarnata | fo. pallida | Bon & A. Caball. | | Forme pâle de Lepiota brunneoincarnata | 2181 |
| Lepiota | brunneoililacea | | Bon & Boiffard | | Lépiote brun lilas | 2182 |
| Lepiota | castanea | | Quél. | Lepiota ignipes - Lepiota ig | Lépiote couleur châtaigne | 2183 |
| Lepiota | cingulum | | Kelderman | | Lépiote à bracelet | 2184 |
| Lepiota | clypeolaria | | (Bull.) P. Kumm. | Lepiota clypeolaria var. och | Lépiote en bouclier | 2185 |
| Lepiota | clypeolarioides | | Rea | | Proche de Lepiota clypeolaria | 2186 |
| Lepiota | coloratipes | | Vizzini et al. | Lepiota rufipes | Lépiote à pied roux | 2187 |
| Lepiota | cortinarius | | J.E. Lange | | Lépiote cortinée | 2188 |
| Lepiota | cristata | | (Bolton) P. Kumm. | | Lépiote crêtée | 2189 |
| Lepiota | cristata | var. felinoides | Bon | Lepiota felinoides - Lepiota | Proche de Lepiota felina | 2190 |
| Lepiota | cristata | var. pallidior | Boud. ex Bon | Lepiota cristata fo. pallidio | Variété blanchâtre de Lepiota cristata | 2191 |
| Lepiota | cristatoides | | Einhell | | Proche de Lepiota cristata | 2192 |
| Lepiota | cystophoroides | | Joss. & Rioussset | | Sosie de Cystolepiota cystophora | 2193 |
| Lepiota | echinella | | Quél. & G.E. Ber | Lepiota setulosa - Lepiota | Lépiote à chapeau hérissé | 2194 |
| Lepiota | erminea | | (Fr.) Fr. | Lepiota alba - Lepiota clype | Lépiote blanche | 2195 |
| Lepiota | farinolens | | Bon & G. Rioussset | | Lépiote à odeur farineuse | 2196 |
| Lepiota | felina | | (Pers.) P. Karst. | | Lépiote féline | 2197 |
| Lepiota | forquignonii | | Quél. | | Lépiote de Forquignon | 2198 |
| Lepiota | fuligineosquarrosa | | (Malençon) Con | Macrolepiota fuligineosqu | Lépiote à squames fuligineuses | 2384 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---|------|
| Lepiota | fuscovinacea | | F.H. Møller & J.E. Lange | Lépiote vineuse | 2199 | |
| Lepiota | grangei | | (Eyre) Kühner | Lepiota ochraceocyanea | Lépiote à squames olivacées | 2200 |
| Lepiota | griseovirens | | Maire | Lepiota griseovirens var. ol | Lépiote gris verdâtre | 2201 |
| Lepiota | helveola | | Bres. | | Lépiote à écailles brunâtres | 2202 |
| Lepiota | ignivolvata | | Bousset & Joss. ex Joss. | | Lépiote à pied rougissant | 2204 |
| Lepiota | kuehneri | | Huijsman ex Hora | | Lépiote de Kühner | 2205 |
| Lepiota | lepida | | Guinb. & M. Boc | Lepiota speciosa | Lépiote jolie | 2207 |
| Lepiota | lilacea | | Bres. | | Lépiote lilas | 2208 |
| Lepiota | lilacea | var. pallida | Bon, Migl. & Cherubini | | Forme pâle de Lepiota lilacea | 2209 |
| Lepiota | magnispora | | Murrill | Lepiota ventriososporaLep | Lépiote à voile jaune | 2210 |
| Lepiota | ochraceodisca | | Bon | Lepiota alba fo. ochraceod | Lépiote blanche à disque ochracé | 2211 |
| Lepiota | ochraceofulva | | P.D. Orton | Lepiota cookei | Lépiote fauve ochracée | 2212 |
| Lepiota | oreadiformis | | Velen. | Lepiota laevigataLepiota pi | Lépiote en forme de Marasmius oreades | 2214 |
| Lepiota | phaeodisca | | (Bellù) Contu & | Macrolepiota phaeodisca | Lépiote à disque brun noirâtre | 2386 |
| Lepiota | pilodes | | Vellinga & Huijs | Lepiota tomentella sensu e | Lépiote à écailles pointues | 2215 |
| Lepiota | pseudolilacea | | Huijsman | Lepiota pseudohelveola | Lépiote proche de Lepiota helveola | 2217 |
| Lepiota | pyrochroa | | Malençon | | Lépiote aux couleurs vives | 2218 |
| Lepiota | severiana | | Tiberi | | Lépiote persillée | 2221 |
| Lepiota | subalba | | P.D. Orton | | Lépiote presque blanche | 2222 |
| Lepiota | subgracilis | | Kühner | Lepiota kuehneriana - Lepi | Lépiote de Kühner | 2223 |
| Lepiota | subincarnata | | J.E. Lange | Lepiota josserandii | Lépiote de Josserand | 2224 |
| Lepiota | sublaevigata | | Bon & Boiffard | | Lépiote presque lisse | 2225 |
| Lepiota | tomentella | | J.E. Lange | | Lépiote à chapeau tomenteux | 2226 |
| Lepiota | wasseri | | Bon | Lepiota subgracilis sensu V | Lépiote de Wasser | 2228 |
| Lepiota | xanthophylla | | P.D. Orton | | Lépiote à lames jaunes | 2229 |
| Lepista | densifolia | | (J. Favre) Singer | Rhodopaxillus densifolius - | Lépiste à lames serrées | 2231 |
| Lepista | glaucocana | | (Bres.) Singer | Rhodopaxillus glaucocanus | Lépiste décolorée | 2232 |
| Lepista | irina | | (Fr.) H.E. Bigelov | Rhodopaxillus irinus | Lépiste à odeur d'iris | 2233 |
| Lepista | irina | var. montana | Bon | | Variété montagnarde de la Lépiste à odeur d'iris | 2234 |
| Lepista | luscina | | (Fr.) Fr. | Lepista panaeolus | Argouanne | 2235 |
| Lepista | nuda | | Bull. | Rhodopaxillus nudus | Pied bleu | 2237 |
| Lepista | nuda | var. pruinosa | Poisy | Rhodopaxillus nudus var. p | Pied bleu à chapeau prumineux | 2238 |
| Lepista | personata | | (Fr.) Cooke | Rhodopaxillus personatus | Tricholome à pied violet | 2241 |
| Lepista | rickenii | | Singer | Clitocybe rickenii | Lépiste de Ricken | 2240 |
| Lepista | sordida | | (Schumach.) Sin | Rhodopaxillus sordidus - L | Lépiste sordide | 2242 |
| Lepista | sordida | var. ianthina | (Bon) Bon | | Variété de la Lépiste sordide sans tons violacins | 2243 |
| Lepista | sordida | var. lilacea | (Quél.) Bon | | Variété violacé vif de Lepista sordida | 2244 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|--|---|------|
| Lepista | sordida | var. obscurata | (Bon) Bon | | Variété sombre de Lepista sordida | 2245 |
| Lepista | sordida | var. umbonata | (Bon) Bon | | Variété de la Lépiote sordide à chapeau mamelonné | 2246 |
| Lepista | tomentosa | | M.M. Moser | | Lépiote à chapeau tomenteux | 2247 |
| Lepista | vernica | | (Fr.) Bon | Clitocybe vernica | Clitocybe luisant | 2248 |
| Leptoporus | mollis | | (Pers.) Qué. | Polyporus mollis - Tyromyc | Polypore tendre | 2249 |
| Leptosporomyces | fuscostratus | | (Burt) Hjortstam | Corticium fuscostratum - Athelia fuscostrata | | 3787 |
| Leratiomyces | ceres | | (Cooke & Masse | Psilocybe aurantiaca - Stro | Strophaire orangé | 2250 |
| Leratiomyces | magnivelaris | | (Peck) Bridge & | Stropharia magnivelaris - P | Strophaire à anneau ample | 2251 |
| Leratiomyces | percevalii | | (Berk. & Broome | Stropharia percevalii - Psil | Strophaire de Perceval | 2252 |
| Leratiomyces | squamosus | | Pers. | Stropharia squamosa - Psil | Strophaire squamuleuse | 2253 |
| Leratiomyces | squamosus | var. thraustus | (Schulzer) Bridg | Psilocybe thrausta - Stroph | Variété gracile de Leratiomyces squamosus | 2254 |
| Leucoagaricus | americanus | | (Peck) Vellinga | Leucoagaricus bresadolae | Lépiote de Bresadola | 2255 |
| Leucoagaricus | badhamii | | (Berk. & Broome | Leucocoprinus badhamii - | Lépiote de Badham | 2256 |
| Leucoagaricus | barssii | | (Zeller) Vellinga | Leucoagaricus macrorhizus | Lépiote radicante | 2257 |
| Leucoagaricus | brunneocingulatus | | (P.D. Orton) Bon | Lepiota brunneocingulata | Lépiote à anneau bordé de brun | 2258 |
| Leucoagaricus | carneifolius | | (Gillet) Wasser | Leucocoprinus carneifolius | Lépiote à lames roses | 2272 |
| Leucoagaricus | cinerascens | | (Qué.) Bon & B | Lepiota cinerascens - Leuco | Lépiote cendrée | 2259 |
| Leucoagaricus | cinereolilacinus | | (Barbier) Bon & | Leucoagaricus leucothites | Lépiote gris lilacin | 3788 |
| Leucoagaricus | croceovelutinus | | (Bon & Boiffard) | Leucocoprinus croceovelut | Lépiote velouté de safran | 2260 |
| Leucoagaricus | crystallifer | | Vellinga | Sericeomyces crystallifer | Lépiote à cystides muriquées | 2261 |
| Leucoagaricus | cygneoaffinis | | (Pilát) P. Roux & | Sericeomyces cygneoaffini | Lépiote à chapeau blanc pur | 2262 |
| Leucoagaricus | eriodermus | | (Malençon) Bon | Sericeomyces erioderma | Lépiote à chapeau laineux | 2263 |
| Leucoagaricus | gauguei | | Bon & Boiffard | Leucoagaricus griseodiscu | Lépiote de Gaugué | 2264 |
| Leucoagaricus | georginae | | (W.G. Sm.) Cand | Lepiota georginae - Leucoc | Lépiote minuscule rougissante | 2265 |
| Leucoagaricus | ianthinosquamulosus | | Guinb. | | Lépiote à écailles violettes | 2268 |
| Leucoagaricus | idae-fragum | | Guinb., Boissele | Lepiota decorata (synonym | Lépiote framboise | 2269 |
| Leucoagaricus | ionidicolor | | Bellu & Lanzoni | | Lépiote violacée | 2270 |
| Leucoagaricus | leucothites | | (Vittad.) Wasser | Lepiota pudica - Lepiota na | Lépiote pudique | 2271 |
| Leucoagaricus | littoralis | | (Menier) Bon & | Lepiota littoralisLepiota su | Lépiote du littoral | 2274 |
| Leucoagaricus | medioflavoides | | Bon | Sericeomyces medioflavoic | Lépiote à disque jaune | 2276 |
| Leucoagaricus | melanotrichus | | (Malençon & Be | Lepiota melanotricha | Lépiote à poils noirs | 2277 |
| Leucoagaricus | meleagris | | (Sowerby) Singe | Lepiota meleagris - Leucoc | Lépiote pintade | 2278 |
| Leucoagaricus | nympharum | | (Kalchbr.) Bon | Macrolepiota puellaris - Le | Lépiote des nymphes | 2279 |
| Leucoagaricus | olgae | | (Velen.) M.M. M | Lepiota olgae - Leucocopri | Lépiote d'Olga | 2280 |
| Leucoagaricus | pilatianus | | (Demoulin) Bon | Lepiota pilatiana - Leucoco | Lépiote de Pilat | 2281 |
| Leucoagaricus | purpureolilacinus | | Huijsman | Leucoagaricus purpureorin | Lépiote pourprée | 2282 |
| Leucoagaricus | roseilividus | | (Murrill) E. Ludw | Leucoagaricus marriagei - | Lépiote à chapeau pourpre | 2275 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--|-------------------------|------------------------------|---|------|
| Leucoagaricus | serenus | | (Fr.) Bon & Boiff | Lepiota serena - Sericeomy | Lépiote sereine | 2283 |
| Leucoagaricus | sericifer | | (Locq.) Vellinga | Lepiota sericata - Leucocog | Lépiote à chapeau soyeux-méchuleux | 2285 |
| Leucoagaricus | subcretaceus | | Bon | Leucoagaricus leucothites | Variété écaillée de la Lépiote pudique | 2273 |
| Leucoagaricus | subvolvatus | | (Malençon & Be | Lepiota subvolvata - Serice | Lépiote à bulbe volvacé | 2287 |
| Leucoagaricus | tener | | (P.D. Orton) Bor | Lepiota tenera | Lépiote délicate | 2288 |
| Leucoagaricus | wichanskyi | | (Pilát) Bon & Bo | Lepiota wichanskyi | Lépiote de Wichansky | 2289 |
| Leucocoprinus | aureofloccosus | | (Henn.) Bon | Lepiota aureofloccosa | Lépiote ornée de flocons dorés | 2290 |
| Leucocoprinus | birnbaumii | | (Corda) Singer | Leucocoprinus flos-sulfuris | Lépiote jaune | 2291 |
| Leucocoprinus | brebissonii | | (Godey) Locq. | Lepiota brebissonii | Lépiote de Brebisson | 2292 |
| Leucocoprinus | cepistipes | | (Sowerby) Pat. | Leucocoprinus cepaestipes | Lépiote à pied en forme d'oignon | 2293 |
| Leucocoprinus | cretaceus | | (Bull.) Locq. | Leucocoprinus cretatus | Lépiote couleur craie | 2294 |
| Leucocoprinus | ianthinus | | (Cooke) Locq. | Leucocoprinus lilacinogran | Lépiote violacée des pots de fleurs | 2295 |
| Leucocoprinus | medioflavus | | (Boud.) Bon | Lepiota medioflava - Leucc | Lépiote à centre jaune | 2296 |
| Leucocoprinus | straminellus | | (Bagl.) Narducci | Leucocoprinus denudatus | Lépiote couleur paille | 2297 |
| Leucocortinarius | bulbiger | | (Alb. & Schwein | Cortinellus bulbiger | Faux cortinaire bulbeux | 2298 |
| Leucocybe | candicans | | (Pers.) Vizzini et | Clitocybe candicans - Clitoc | Clitocybe blanc | 2299 |
| Leucocybe | connata | | (Schumach.) Viz | Clitocybe connata - Lyophy | Clitocybe en touffes | 2300 |
| Leucocybe | houghtonii | | (W. Phillips) Hal | Clitocybe houghtonii | Clitocybe à odeur de feuilles de tomate | 416 |
| Leucogyrophana | mollusca | | (Fr.) Pouzar | Merulius molluscus | Leucogyrophana méruloïde | 2301 |
| Leucogyrophana | pseudomollusca | | (Parm.) Parm. | Merulius pseudomolluscus | Proche de Leucogyrophana mollusca | 2302 |
| Leucogyrophana | romellii | | Ginns | Serpula romellii | Leucogyrophana de Romell | 2303 |
| Leucoinocybe | lenta | | (Maire) Singer | Clitocybula lenta - Collybia | Collybie des eucalyptus | 2304 |
| Leucopaxillus | albissimus | | (Peck) Singer | Clitocybe albissima - Melar | Leucopaxille blanc | 3699 |
| Leucopaxillus | alboalutaceus | | (F.H. Møller & Ju | Leucopaxillus amarus fo. a | Leucopaxille blanc et ocre | 2305 |
| Leucopaxillus | compactus | | (Fr.) Neuhoff | Leucopaxillus tricolor | Leucopaxille tricolore | 2306 |
| Leucopaxillus | concolor | | (Peck) Kühner | Tricholoma concolor | Tricholome concolore | 3501 |
| Leucopaxillus | cutefractus | | Noordel. | Leucopaxillus albissimus va | Leucopaxille paradoxal à chapeau craquelé | 2310 |
| Leucopaxillus | gentianeus | | (Quél.) Kotlaba | Leucopaxillus amarus | Leucopaxille amer | 2307 |
| Leucopaxillus | monticola | | (Singer & A.H. Sm.) Bon | | Leucopaxille des montagnes | 2308 |
| Leucopaxillus | paradoxus | | (Costantin & Du | Leucopaxillus albissimusLe | Leucopaxille paradoxal | 2309 |
| Leucopaxillus | phaeopus | | (J. Favre & Poluz | Leucopaxillus amarus fo. p | Leucopaxille à pied sombre | 2311 |
| Leucopaxillus | vulpeculus | | (Kalchbr.) Bon | | | 3789 |
| Leucopholiota | decorosa | | (Peck) O.K. Mill. | Floccularia decorosa - Lepi | Armillaire décorative | 2312 |
| Lichenomphalia | alpina | | (Britzelm.) Redh | Omphalina alpina - Gerron | Omphale alpine | 2313 |
| Lichenomphalia | cinereispinula | | Neville & Fouchier | | Omphale à épines grises | 2314 |
| Lichenomphalia | hudsoniana | | (H.S. Jeen) Redh | Omphalina hudsoniana - G | Omphale de Hudson | 2316 |
| Lichenomphalia | meridionalis | | (Contu & La Roc | Omphalina meridionalis | Omphale méridionale | 2317 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|------|
| Lichenomphalia | pararustica | | (Cléménçon) Elb | Omphalina pararustica - Ph | Omphale plutôt rustique | 2318 |
| Lichenomphalia | umbellifera | | (L.) Redhead et | Omphalina umbellifera - O | Omphale lichénisée | 2319 |
| Lichenomphalia | velutina | | (Quél.) Redhead | Omphalina velutina - Phyt | Omphale veloutée | 2320 |
| Limacella | delicata | | (Fr.) Earle ex Ko | Limacella gioderma - Limac | Limacelle délicate | 2321 |
| Limacella | furnacea | | (Letell.) E.J. Gilb | Limacella grisea - Limacella | Limacelle brun-noir | 2322 |
| Limacella | illinita | fo. ochracea | (Fr. ex E.J. Gilbert) Konrad & Maubl. | | Forme à chapeau ocracé de Limacelle illinita | 2326 |
| Limacella | illinita | var. rubescens | H.V. Smith | | Variété rougissante de Limacella illinita | 2327 |
| Limacella | ochraceorosea | | (Béguet & Bon) | Limacella illinita var. ochra | Limacelle rose ocracé | 2328 |
| Limacellopsis | guttata | | (Pers.) Zhu L. Ya | Limacella lenticularis - Lim | Limacelle tachée | 2324 |
| Loreleia | marchantiae | | (Singer & Cléme | Gerronema marchantiae - | Omphale des hépatiques | 2331 |
| Loreleia | postii | | (Fr.) Redhead et | Gerronema postii - Ompha | Omphale de Von Post | 2332 |
| Loweomyces | wynnei (ou wynneae) | | (Berk. & Broome | Polyporus wynnei - Leptop | Polypore de Wynne | 2333 |
| Lycogala | conicum | | Pers. | | Lycogale conique | 2334 |
| Lycogala | epidendrum | | (J.C. Buxb. ex L.) Fr. | | Lycogale du bois | 2335 |
| Lycogala | flavofuscum | | (Ehrenb.) Rostaf. | | Lycogale brun-jaune | 2336 |
| Lycoperdon | caudatum | | J. Schröt. | Lycoperdon pedicellatum | Vesse de loup à spores pédicellées | 2337 |
| Lycoperdon | decipiens | | Durieu & Mont. | | Vesse de loup trompeuse | 2338 |
| Lycoperdon | echinatum | | Pers. | Lycoperdon gemmatum va | Vesse de loup hérisson | 2339 |
| Lycoperdon | excipuliformis | | (Scop.) Pers. | Calvatia excipuliformis | Calvatie en forme de vase | 308 |
| Lycoperdon | lividum | | Pers. | Lycoperdon spadiceum | Vesse de loup livide | 2340 |
| Lycoperdon | mammiforme | | Pers. | Lycoperdon mammaeform | Vesse de loup voilée | 2341 |
| Lycoperdon | molle | | Pers. | | Vesse de loup molle | 2342 |
| Lycoperdon | nigrescens | | Pers. | Lycoperdon foetidum | Vesse de loup noircissante | 2343 |
| Lycoperdon | norvegicum | | Demoulin | | Vesse de loup de Norvège | 2344 |
| Lycoperdon | perlatum | | Pers. | Lycoperdon gemmatum | Vesse de loup perlée | 2345 |
| Lycoperdon | pratense | | Pers. | Vascellum pratense | Vesse de loup praticole | 3610 |
| Lycoperdon | radicatum | | Durieu & Mont. | Bovistella radicata - Bovist | Vesse de loup radicante | 2346 |
| Lycoperdon | subincarnatum | | Peck | Morganella subincarnata | Vesse de loup nuancée d'incarnat | 2457 |
| Lycoperdon | umbrinum | | Pers. | | Vesse de loup brun d'ombre | 2347 |
| Lyomyces | crustus | | (Pers.) P. Karst. | Hyphodontia crustosa - Xylodon crustosa | Odontia crustosa - Grandinia crustosa | 3790 |
| Lyomyces | pruni | | (Lasch) Riebesel | Grandinia pruni - Odontia pruni | Hyphodontia pruni | 3791 |
| Lyomyces | sambuci | | (Pers.) P. Karst. | Hyphodontia sambuci - Hyphoderma sambuci | Xylodon sambuci | 3664 |
| Lyophyllum | admissum | | (Britzelm.) Cons | Tephrocye admissa | Lyophylle reconnu | 2348 |
| Lyophyllum | aemiliae | | Consiglio | | Lyophylle dédié à Emilia | 2349 |
| Lyophyllum | amariusculum | | Cléménçon | | Lyophylle amer | 2350 |
| Lyophyllum | caerulescens | | Cléménçon | | Lyophylle bleuissant | 2354 |
| Lyophyllum | calabrum | | Lavorato & Contu | | Lyophylle de Calabre | 2355 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--|------|
| Lyophyllum | conocephalum | | (Karst.) Cléménçon | Lyophylle à chapeau conique | 2356 |
| Lyophyllum | decastes | | (Fr.) Singer | Lyophyllum aggregatum - 7 | 2357 |
| Lyophyllum | deliberatum | | (Britzelm.) Kreisel | Lyophylle enfumé | 2359 |
| Lyophyllum | eustygium | | (Cooke) Cléménçon | Lyophylle blanc grisâtre | 2360 |
| Lyophyllum | graminicola | | (Bon) Ballero & | Tephroclybe graminicola | 3438 |
| Lyophyllum | loricatum | | (Fr.) Kühner | Lyophyllum decastes var. l | 2358 |
| Lyophyllum | maas-gesterani | | Cléménçon & Winterhoff | Lyophylle de Maas-Geestanus | 2365 |
| Lyophyllum | maleolens | | Melis & Contu | Lyophylle malodorant | 2366 |
| Lyophyllum | paelochroum | | Cléménçon | Lyophyllum immundum se | 2370 |
| Lyophyllum | pseudosinuatum | | Consiglio, Contu | Lyophyllum crassipodium | 2371 |
| Lyophyllum | rhopalopodium | | Cléménçon | Lyophylle à pied obèse | 2374 |
| Lyophyllum | semitale | | (Fr.) Kühner | Lyophylle des sentiers | 2376 |
| Lyophyllum | semitale | var. intermedium | Romagn. | Variété méridionale de Lyophyllum semitale | 2377 |
| Lyophyllum | subglobisporum | | Consiglio & Cont | Lyophyllum ovisporum | 2378 |
| Lyophyllum | transforme | | (Britzelm.) Singe | Lyophyllum trigonosporum | 2379 |
| Macrocyttidia | cucumis | | (Pers.) Jossierand | Collybie à odeur de concombre | 2380 |
| Macrocyttidia | cucumis | fo. minor | Joss. | Macrocyttidia cucumis var | 2381 |
| Macrolepiota | excoriata | | (Schaeff.) Wasse | Lepiota excoriata - Macrole | 2383 |
| Macrolepiota | fuliginosa | | (Barla) Bellu & L | Macrolepiota fuliginosa fo. | 2388 |
| Macrolepiota | mastoidea | | (Fr.) Singer | Macrolepiota gracilentata - M | 2385 |
| Macrolepiota | permixta | | (Barla) Pacioni | Macrolepiota procera var. | 2389 |
| Macrolepiota | procera | | (Scop.) Singer | Lepiota procera | 2387 |
| Macrolepiota | procera | var. pseudo-olivascens | Bellu & Lanzoni | Lépiote élevée (Coulemelle) | 2390 |
| Malloocybe | agardhii | | (Lund.) P.D. Ort | Inocybe dulcamara var. ag | 1846 |
| malloocybe | arenaria | | (Bon) Matheny & | Inocybe arenaria - Inocybe | 1847 |
| Malloocybe | fulvipes | | (Kühner) Mathe | Inocybe fulvipes | 1881 |
| Malloocybe | heimii | | (Bon) Matheny & | Inocybe caesariata - Inocyt | 1897 |
| Malloocybe | latispora | | (Bon) Matheny & | Inocybe dulcamara var. lat | 1873 |
| Malloocybe | leucoblema | | (Kühner) Mathe | Inocybe leucoblema | 1915 |
| Malloocybe | paludosa | | (Kühner) Mathe | Inocybe paludosa | 1931 |
| Malloocybe | substraminipes | | (Kühner) Mathe | Inocybe substraminipes | 1961 |
| Malloocybe | terrigena | | (Fr.) Matheny, V | Inocybe terrigena | 1967 |
| Marasmiellus | candidus | | (Bolton) Singer | Marasmius candidus | 2393 |
| Marasmiellus | omphaliformis | | (Kühner) Noorde | Marasmius omphaliformis | 2394 |
| Marasmiellus | phaeomarasmioides | | G. Moreno et al. | Marasme ressemblant à un Phaeomarasmus | 2395 |
| Marasmiellus | tricolor | | (Alb. & Schwein | Marasmius tricolor - Micro | 2397 |
| Marasmiellus | virgatocutis | | Robich, Estève-Rav. & G. Moreno | Marasme à chapeau vergeté | 2399 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|
| Marasmius | bulliardii | | Quél. | | Marasme de Bulliard | 2401 |
| Marasmius | buxi | | Fr. | | Marasme du buis | 2402 |
| Marasmius | cespitem | | Quél. | Marasmius pseudoglobula | Marasme des pelouses | 2403 |
| Marasmius | cohaerens | | (Pers.) Cooke & Quél. | | Marasme à pied corné | 2404 |
| Marasmius | collinus | | (Scop.) Singer | Collybia collina - Gymnopu | Marasme des collines | 2405 |
| Marasmius | curreyi | | Berk. & Broome | Marasmius graminum | Marasme des graminées | 2406 |
| Marasmius | epiphyllodes | | (Rea) Sacc. & Tr | Marasmius hederæ | Marasme du lierre | 2407 |
| Marasmius | epiphyllus | | Pers. | Marasmius tenuiparietalis | Marasme des feuilles | 2408 |
| Marasmius | epodius | | Bres. | Marasmius anomalus - Ma | Marasme anormal | 2400 |
| Marasmius | favrei | | Antonin. | Marasmius tremulae sensu | Marasme des trembles | 2409 |
| Marasmius | hellebori-corsici | | Romagn. | | Marasme de l'hellébore de Corse | 2410 |
| Marasmius | hudsonii | | Pers. | Marasmius pilosus | Marasme poilu | 2411 |
| Marasmius | mediterraneus | | Corriol | | Marasme méditerranéen | 2412 |
| Marasmius | oreades | | (Bolton) Fr. | | Marasme des oréades | 2413 |
| Marasmius | rotula | | Fr. | | Marasme petite roue | 2414 |
| Marasmius | torquescens | | Quél. | Marasmius lupuletorum se | Marasme à pied tordu | 2415 |
| Marasmius | ventalloi | | Singer | Marasmius anomalus fo. v | Marasme à pied jaune verdâtre | 2416 |
| Marasmius | wettsteinii | | Sacc. & Syd. | Marasmius bulliardii fo. ac | Marasme de Wettstein | 2417 |
| Marasmius | wynneae | | Berk. & Broome | Marasmius globularis sens | Marasme à chapeau globuleux | 2418 |
| Megacollybia | platyphylla | | Pers. | Collybia platyphylla - Gymr | Collybie à larges lamelles | 2419 |
| Melampsorella | elatina | | (Alb. & Schwein | Melampsorella caryophylla | Rouille du sapin. Balai de sorcière | 3700 |
| Melanogaster | tuberiformis | | Corda | | Melanogaster en forme de truffe | 2420 |
| Melanogaster | variegatus | | (Vittad.) Tul. & C. Tul. | | Melanogaster tacheté | 2421 |
| Melanoleuca | adstringens | | (Pers.) Konrad | | Melanoleuca de saveur astringente | 2422 |
| Melanoleuca | arcuata | | (Bull.) Singer nom. sanct. | | Melanoleuca à lames arquées | 2423 |
| Melanoleuca | brevipes | | (Bull.) Pat. | | Melanoleuca à pied court | 2424 |
| Melanoleuca | cinereifolia | | (Bon) Bon | Melanoleuca strictipes var | Melanoleuca à lames cendrées | 2425 |
| Melanoleuca | cognata | | (Fr.) Konrad & Maubl. | | Melanoleuca reconnaissable | 2426 |
| Melanoleuca | excissa | | (Fr.) Singer | Melanoleuca kuehneri | Melanoleuca de Kühner | 2431 |
| Melanoleuca | graminicola | | (Velen.) Kühner & Maire. | | Melanoleuca des herbages | 2428 |
| Melanoleuca | grammopodia | | (Bull.) Murrill | Melanoleuca subbrevipes | Melanoleuca à pied rayé | 2429 |
| Melanoleuca | iris | | Kühner | Melanoleuca excissa var. (| Melanoleuca parfumé | 2430 |
| Melanoleuca | leucophylloides | | (Bon) Bon | Melanoleuca rasilis var. leu | Melanoleuca à lames blanches | 2432 |
| Melanoleuca | melaleuca | | Pers. | Melanoleuca vulgaris | Mélanoleuca noir et blanc | 2433 |
| Melanoleuca | polioleuca | | (Fr.) Kühner & M | Melanoleuca polioleuca va | Melanoleuca gris et blanc | 2434 |
| Melanoleuca | robertiana | | Bon | | Melanoleuca dédié à Robert Kühner | 3792 |
| Melanoleuca | strictipes | | (P. Karst.) Jul. Sc | Melanoleuca evenosa, sub | Melanoleuca à pied étroit | 2435 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|--|-----------------------|------------------------------|--|------|
| Melanoleuca | stridula | | (Fr.) Singer | Melanoleuca cognata var. | Melanoleuca à pied strié | 2436 |
| Melanoleuca | substrictipes | | Kühner | | Melanoleuca à pied mince | 2438 |
| Melanoleuca | umbrinella | | (Speg.) Singer | | | 3793 |
| Melanoleuca | verrucipes | | (Fr.) Singer | | Melanoleuca à pied squamuleux | 2439 |
| Melanophyllum | eyrei | | (Massee) Singer | Lepiota eyrei | Lépiote à lames vertes | 2440 |
| Melanophyllum | haemospermum | | Bull. | Lepiota haemosperma - | Lépiote à lames rouges | 2441 |
| Melastiza | cornubiensis | | (Berk. & Broome | Melastiza chateri - Peziza c | Pézize vermillon | 2442 |
| Melogramma | campylosporum | | Fr. | Melogramma bulliardii - M | Melogramme à spores arquées | 2443 |
| Melogramma | spiniferum | | (Wallr.) De Not. | | Mélogramme en forme de croûte | 2444 |
| Mensularia | nodulosa | | (Fr.) T. Wagner & | Polyporus nodulosus - Xan | Polypore du hêtre | 1975 |
| Meotomyces | dissimulans | | (Berk. & Broome | Phaeogalera dissimulans - | Pholiote à pied renflé | 2445 |
| Meripilus | giganteus | | Pers. | Polyporus frondosus - Poly | Polypore géant | 2446 |
| Meruliopsis | taxicola | | (Pers.) Bondarts | Poria taxicola - Gloeoporus | Mérule de l'if | 1460 |
| Metatrachia | floriformis | | (Schwein.) Nann | Trichia floriformis | Metatrachia en forme de fleur | 3794 |
| Microglossum | viride | | (Pers.) Gillet | Geoglossum viride | Microglosse vert | 2449 |
| Mitruha | paludosa | | Fr. | | Mitruha des marais | 2450 |
| Mollisia | cinerea | | (Batsch) P. Karst | Peziza cinerea | Mollisie cendrée | 2451 |
| Mollisia | ligni | | (Desm.) P. Karst | Mollisia lignicola | | 3795 |
| Morchella | castaneae | | L. Romero & Clo | Morchella brunneorosea | Morille brun rose | 3796 |
| Morchella | crassipes | | (Vent.) Pers. | Morchella esculenta var. c | Variété à gros pied de Morchella esculenta | 2454 |
| Morchella | distans | | Fr. | | Morille distante | 3869 |
| Morchella | elata | | Fr. | Morchella deliciosa - Morc | Morille conique | 2452 |
| Morchella | esculenta | | Pers. | Morchella rotunda - Morc | Morille blonde | 2453 |
| Morchella | gigas | | (Batsch) Pers. | Mitrophora fuscaMitrophc | Morillon | 3797 |
| Morchella | semilibera | | DC. | Mitrophora semilibera | Morillon - Mitrophore hybride | 2455 |
| Mucidula | mucida | | (Schrad.) Pat. | Oudemansiella mucida - Cc | Collybie visqueuse | 2458 |
| Mutatoderma | mutatum | | (Peck) C.E. Góm | Corticium mutatum | | 3798 |
| Mutinus | caninus | | Fr. | | Satyre du chien | 2459 |
| Mutinus | elegans | | (Mont.) E. Fisch | | Phalle élégant | 2460 |
| Mutinus | ravenelii | | (Berk. & M.A. Curtis) | E. Fisch | Phalle de Ravenel | 2461 |
| Mycena | abramsii | | (Murrill) Murrill | Mycena praecox | Mycène printanière | 2462 |
| Mycena | acicula | | (Schaeff.) P. Kun | Hemimycena acicula | Mycène en aiguille | 2463 |
| Mycena | aciculata | | (A.H. Sm.) Desja | Mycena codoniceps var. ac | Mycène à chapeau hérissé de poils | 2464 |
| Mycena | aetites | | (Fr.) Qué. | | Mycène des pelouses | 2465 |
| Mycena | agrestis | | Aronsen & Maas Geest. | | Mycène champêtre | 2466 |
| Mycena | albidolilacea | | Kühner & Maire | | Mycène à chapeau rose-lilacin | 2467 |
| Mycena | aleuriosma | | J. Favre | | Mycène à odeur de farine | 2468 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--|------|
| Mycena | algeriensis | | Maire | | Mycène d'Algérie | 2469 |
| Mycena | amicta | | (Fr.) Fr. | Mycena iris | Mycène iris | 2470 |
| Mycena | arcangeliana | | Bres. | Mycena oortiana | Mycène jaune olive | 2471 |
| Mycena | aurantiomarginata | | (Fr.) Fr. | Mycena elegans sensu auc | Mycène à arête des lames orange | 2472 |
| Mycena | belliarum | | (Johnst.) P.D. Orton | | Mycène de Belli | 2473 |
| Mycena | bresadolana | | Robich & Neville | | Mycène de Bresadola | 2474 |
| Mycena | bulbosa | | (Cejp) Kühner | | Mycène bulbeuse | 2476 |
| Mycena | capillaripes | | Peck | Mycena langei | Mycène à pied grêle | 2477 |
| Mycena | capillaris | | (Schumach.) Kühner | | Mycène à pied filiforme | 2478 |
| Mycena | chlorantha | | (Fr.) P. Kumm. | | Mycène verdâtre | 2479 |
| Mycena | chlorinosma | | Singer | | Mycène à odeur de chlore | 2480 |
| Mycena | cinerella | | (P. Karst.) P. Karst. | | Mycène cendrée | 2481 |
| Mycena | citrinomarginata | | Gillet | Mycena avenacea var. citri | Mycène à lames bordées de jaune citron | 2482 |
| Mycena | clavicularis | | (Fr.) Fr. | | Mycène clavulaire | 2483 |
| Mycena | clavularis | | (Batsch) Saccardo | | Mycène en forme de clou | 2484 |
| Mycena | concolor | | (J.E. Lange) Kühner | | Mycène concolore | 2485 |
| Mycena | corynephora | | Maas Geest. | | Mycène farineuse | 2486 |
| Mycena | crocata | | (Schrad.) P. Kumm. | | Mycène à latex safran | 2487 |
| Mycena | cupressina | | Antonin & Maas Geest. | | Mycène des cyprès | 2488 |
| Mycena | cyanorhiza | | Quél. | | Mycène à base bleue | 2489 |
| Mycena | discopus | | (Lév.) Quél. | | Mycène des noisettes | 2491 |
| Mycena | dura | | Mass. Geest. & Hauskn. | | Mycène robuste | 2492 |
| Mycena | epipterygia | | (Scop.) Gray | Prunulus epipterygius | Mycène des fougères | 2493 |
| Mycena | epipterygia | var. atrovivida | Malençon | Mycena atrovivida | | 3799 |
| Mycena | epipterygia | var. badiceps | M. Lange | | Variété à chapeau sombre de Mycena epipterygia | 2494 |
| Mycena | epipterygia | var. candida | (Weinm.) Bon & P. Roux | | Variété blanche de Mycena epipterygia | 2495 |
| Mycena | epipterygia | var. epipterygioides | (A. Pearson) Kühn | Mycena epipterygioides | Variété proche de Mycena epipterygioides | 2496 |
| Mycena | epipterygia | var. splendidipes | (Peck) Maas Geest. | Mycena splendidipes | Mycène à pied jaune éclatant | 2497 |
| Mycena | epipterygia | var. viscosa | (Maire) Ricken | Mycena viscosa | Mycène visqueux taché de rouge | 2498 |
| Mycena | erubescens | | höhn. | Mycena fellea | Mycène amère | 2499 |
| Mycena | fagetorum | | (Fr.) Gillet | | Mycène des feuilles de hêtres | 2500 |
| Mycena | filopes | | Bull. | Mycena iodolens | Mycène à pied filiforme | 2501 |
| Mycena | flavescens | | Velen. | | Mycène à lames bordées de jaune | 2502 |
| Mycena | flos-nivium | | Kühner | Mycena occidentalis sensu | Mycène fleur des neiges | 2504 |
| Mycena | galericulata | | (Scop.) Gray | | Mycène en casque | 2505 |
| Mycena | galopus | | Pers. | Mycena galopoda | Mycène à lait blanc | 2506 |
| Mycena | galopus | var. ampelodesmae | Kühner & Maire | | Forme méridionale de Mycena galopus | 2507 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------|-----------------------|---|---|------|
| Mycena | galopus | var. candida | J.E. Lange | | Variété blanche de <i>Mycena galopus</i> | 2508 |
| Mycena | galopus | var. leucogala | (Cooke) J.E. Lange | <i>Mycena leucopoda</i> - <i>Mycena</i> | Variété noire de <i>Mycena galopus</i> | 2509 |
| Mycena | haematopus | | Pers. | <i>Mycena haematopoda</i> | Mycène à latex rouge | 2510 |
| Mycena | inclinata | | (Fr.) Quéél. | | Mycène incliné | 2511 |
| Mycena | inclinata | fo. albopilea | Derbsch et al. | | Forme à chapeau blanc de <i>Mycena inclinata</i> | 2512 |
| Mycena | juniperina | | Aronsen | | Mycène des genévriers | 2513 |
| Mycena | laevigata | | Gillet | <i>Mycena galericulata</i> var. la | Mycène à chapeau lisse | 2514 |
| Mycena | lammiensis | | Harmaja | | Mycène proche de <i>Mycena pelianthina</i> | 2515 |
| Mycena | latifolia | | (Peck) A.H. Sm. | | Mycène à lames larges | 2516 |
| Mycena | leptocephala | | (Pers.) Gillet | <i>Mycena alcalina</i> sensu auc | Mycène à chair mince | 2517 |
| Mycena | luteovariegata | | Harder & Læssø | <i>Mycena pura</i> var. ou fo. lu | Mycène à chapeau jaune bordé de rouge | 2518 |
| Mycena | maculata | | P. Karst. | | Mycène tachée | 2519 |
| Mycena | megaspora | | Kauffman & A.H. | <i>Mycena uracea</i> | Mycène à grandes spores | 2520 |
| Mycena | meliigena | | (Berk. & Cooke) Sacc. | | Mycène corticole | 2521 |
| Mycena | metata | | (Fr.) Fr. | | Mycène à chapeau conique | 2522 |
| Mycena | mirata | | (Peck) Sacc. | | Mycène mignonne | 2523 |
| Mycena | moseri | | Robich & Carassal | | Mycène de Moser | 2524 |
| Mycena | mucor | | (Batsch) Quéél. | | Mycène des feuilles de chênes | 2525 |
| Mycena | niveipes | | (Murrill) Murrill | | Mycène à pied satiné | 2526 |
| Mycena | nucicola | | Huijsman | | Mycène des cupules de noisettes | 2527 |
| Mycena | oligophylla | | Aronsen & Maas Geest. | | Mycène à lames espacées | 2528 |
| Mycena | olivaceomarginata | | (Masse) Masse | <i>Mycena brunneomarginata</i> | Mycène à lames bordées d'olivacé | 2529 |
| Mycena | olivaceomarginata | fo. contraria | (Arnolds) Maas | <i>Mycena olivaceomarginata</i> | Forme colorée de <i>Mycena olivaceomarginata</i> | 2530 |
| Mycena | olivaceomarginata | fo. roseofusca | (Kühner) Maas | <i>Mycena roseofusca</i> . <i>Mycen</i> | Forme brun rosâtre de <i>Mycena olivaceomarginata</i> | 2531 |
| Mycena | parca | | Aronsen | | Mycène des genévriers | 2532 |
| Mycena | parvocystidiosa | | Robich | | Mycène proche de <i>Phloeomana hiemalis</i> | 2533 |
| Mycena | pearsoniana | | Dennis ex Singer | | Mycène de Pearson | 2534 |
| Mycena | pelianthina | | (Fr.) Fr. | <i>Prunulus pelianthinus</i> | Mycène à lames bordées de pourpre | 2535 |
| Mycena | plumipes | | (Kalchbr.) P.A. M | <i>Mycena strobilicola</i> | Mycène des cônes d'épicéas | 2536 |
| Mycena | polyadelphia | | (Lasch) Kühner | | Mycène minuscule | 2537 |
| Mycena | polygramma | | Bull. | | Mycène à pied strié | 2538 |
| Mycena | polygramma | fo. candida | J.E. Lange | | Forme blanche de <i>Mycena polygramma</i> | 2539 |
| Mycena | polygramma | fo. pumila | J.E. Lange | | Forme miniature de <i>Mycena polygramma</i> | 2540 |
| Mycena | pseudocorticola | | Kühner | | Mycène corticole bleue | 2541 |
| Mycena | pseudocyanorrhiza | | Robich | | Mycène ressemblant à <i>Mycena cyanorrhiza</i> | 2542 |
| Mycena | pseudoinclinata | | A.H. Sm. | | Mycène ressemblant à <i>Mycena inclinata</i> | 2543 |
| Mycena | pseudopicta | | (J.E. Lange) Kühner | | Fausse <i>Mycène picta</i> | 2544 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|------|
| Mycena | pterigena | | (Fr.) Fr. | | Mycène des fougères | 2545 |
| Mycena | pura | | (Pers.) P. Kumm | Prunulus purus | Mycène pur | 2546 |
| Mycena | pura | fo. alba | (Gillet) Kühner | Mycena pura var. alba | Forme blanche de Mycena pura | 2547 |
| Mycena | pura | fo. ianthina | (Gillet) Maas Ge | Mycena pura var. ianthina | Forme bleue de Mycena pura | 2548 |
| Mycena | pura | fo. multicolor | (Bres.) Kühner | Mycena pura var. multicolor | Forme multicolore de Mycena pura | 2550 |
| Mycena | purpureofusca | | (Peck) Sacc. | | Mycène pourpre foncé | 2551 |
| Mycena | querciramuli | | Robich | | Mycène des branchettes de chênes | 2552 |
| Mycena | quercus-ilicis | | Kühner | | Mycène du chêne vert | 2553 |
| Mycena | renati | | Quél. | Mycena flavipes | Mycène à pied jaune | 2554 |
| Mycena | rhenana | | Maas Geest. & Winterhoff | | Mycène rhénane | 2555 |
| Mycena | riparia | | Maas Geest. | | Mycène des rives | 2556 |
| Mycena | romagnesiana | | Maas Geest. | Mycena rugulosiceps sensu | Mycène de Romagnesi | 2557 |
| Mycena | rosea | | Gramberg | Mycena pura fo. et var. rosea | Mycène rose | 2558 |
| Mycena | rosea | fo. candida | Robich | | Forme entièrement blanche de Mycena rosea | 2559 |
| Mycena | rosella | | (Fr.) Fr. | Mycena roseola | Mycène rosâtre | 2560 |
| Mycena | rubromarginata | | (Fr.) Fr. | | Mycène à lames bordées de pourpre | 2561 |
| Mycena | sanguinolenta | | (Alb. & Schwein.) P. Kumm. | | Mycène sanguinolente | 2562 |
| Mycena | schildiana | | Maas Geest. | | Mycène dédiée à Schild | 2563 |
| Mycena | seynii | | Quél. | | Mycène de De seynes | 2564 |
| Mycena | silvae-nigrae | | Maas Geest. & S | Mycena alcalina sensu auc | Mycène de la forêt noire | 2565 |
| Mycena | sororia | | Perreau, Boisselier & Lambourdière | | Mycène très proche de Mycena rosea | 2566 |
| Mycena | speirea | fo. camptophylla | (Berk.) Kühner | | Forme à pied jaune de Phloeomana speirea | 2567 |
| Mycena | speirea | fo. candida | Robich | | Forme blanche de Phloeomana speirea | 2568 |
| Mycena | stipata | | Maas Geest. & S | Mycena alcalina sensu auc | Mycène cespiteuse | 2569 |
| Mycena | strobilinoidea | | Peck | | Mycène des pins | 2570 |
| Mycena | stylobates | | Pers. | | Mycène à disque basal | 2571 |
| Mycena | supina | | (Fr.) P.Kumm. | | Mycène à pied tordu | 2572 |
| Mycena | tenerrima | | (Berk.) Sacc. | Mycena adscendens | Mycène fragile | 2573 |
| Mycena | tinnabulum | | (Paulet) Quél. | | Mycène en forme de clochette | 2574 |
| Mycena | tubaroides | | (Maire) Kühner | | Mycène ressemblant à un Tubaria | 2575 |
| Mycena | ustalis | | Aronsen & Maas Geest. | | Mycène brûlée | 2576 |
| Mycena | venustula | | Quél. | | Mycène gracieuse | 2577 |
| Mycena | viridimarginata | | P. Karst. | | Mycène à lames bordées de vert | 2578 |
| Mycena | vitis | | (Fr.) Quél. | | Mycène à pied raide | 2579 |
| Mycena | vulgaris | | Pers. | | Mycène vulgaire | 2580 |
| Mycena | vulgaris | var. albida | Gillet | | Variété blanche de Mycena vulgaris | 2581 |
| Mycena | xantholeuca | | Kühner | | Mycène blanche et jaune | 2582 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|
| Mycena | zephirus | | (Fr.) Fr. | | Mycène élégant | 2583 |
| Mycenastrum | corium | | (Guers.) Desv. | | Mycénastre coriace | 2584 |
| Mycenella | bryophila | | (Vogl.) Singer | Mycena bryophila | Mycène des mousses | 2585 |
| Mycenella | salicina | | (Velen.) Singer | Mycena salicina | Mycène des saules | 2586 |
| Mycenella | trachyspora | | (Rea) Bon | Mycena trachyspora | Mycène à spores bossues | 3718 |
| Mycetinis | alliaceus | | (Jacq.) Earle | Marasmius alliaceus | Marasme à odeur d'ail | 2587 |
| Mycetinis | kallioneus | | (Huhtinen) Anto | Marasmius kallioneus | Marasme de la taïga | 2588 |
| Mycetinis | querceus | | (Britzelm.) Anto | Marasmius querceus | Marasme des feuilles de chênes | 2589 |
| Mycetinis | scorodonius | | (Fr.) Fr. | Marasmius scorodonius - C | Marasme à odeur de poireau | 2590 |
| Mycetinis | virgultorum | | (Malençon & Be | Mycetinis virgultorumMyc | Marasme des broussailles | 2591 |
| Mycoacia | fuscoatra | | (Fr.) Donk | Phlebia fuscoatra - Stecche | Phlebia brun-noirâtre | 2755 |
| Mycoacia | gilvescens | | (Bres.) Zmitr. | Ceriporiopsis gilvescens - P | Polypore à pores rosissants | 3800 |
| Mycoacia | livida | | (Pers.) Zmitr. | Phlebia livida - Corticium lividum | | 3801 |
| Mycoacia | nothofagi | | (G. Cunn.) Ryvar | Phlebia nothofagi | Phlebia à odeur de naphthaline | 2756 |
| Mycoacia | uda | | (Fr.) Nakasone | phlebia uda | Phlebia des zones humides | 2760 |
| Mycogone | rosea | | Link | | Mycogone rose | 2592 |
| Mycopan | scabripes | | (Murill) Redhead | Hydropus scabripes - Myce | Marasme à pied rude | 2593 |
| Mycosarcoma | maydis | | (DC.) Bref. | Ustilago maydis | Charbon du maïs | 3609 |
| Myochromella | boudieri | | (Kühner & Rom | Tephrocycbe boudieri - Lyo | Tephrocycbe de Boudier | 2594 |
| Myochromella | inolens | | (Fries) V. Hofste | Tephrocycbe inolens | | 3802 |
| Myriostoma | coliforme | | (Dicks) Corda | Geastrum coliforme | Myriostome passoire | 2595 |
| Mythicomyces | corneipes | | (Fr.) Redhead & | Psilocybe corneipes - Geop | Psilocybe à pied cartilagineux | 2596 |
| Myxarium | nucleatum | | Wallr. | Exidia nucleata | Exidie à noyau | 2597 |
| Myxomphalia | maura | | (Fr.) Fr. | Fayodia maura - Omphalin | Omphale des charbonnières | 2598 |
| Naematelia | aurantia | | (Schwein.) Burt | Dacrymyces aurantius - Tre | Trémelle orangée | 3458 |
| Naematelia | encephala | | (Pers.) Fr. | Tremella encephala | Trémelle cérébriforme | 3459 |
| Naucoria | amarens | | Quéf. | Alnicola amarens | Alnicole amère | 78 |
| Naucoria | bohemica | | Velen. | Alnicola bohemica | Alnicole de Bohême | 80 |
| Naucoria | escharioides | | (Fr.) P. Kumm. | Alnicola escharioides | Naucorie croûteuse | 84 |
| Naucoria | geraniolens | | Courtec. Gerw. I | Alnicola geraniolens | Alnicole à odeur pélargoniée | 85 |
| Naucoria | leucocnemis | | (Romagn.) E. Lu | Alnicola leucocnemis | | 86 |
| Naucoria | rubriceps | | Velen. | Alnicola rubriceps | Alnicole brun roux | 89 |
| Naucoria | scolecina | | (Fr.) Quéf. | Alnicola badia - Alnicola sc | Alnicole bai | 79 |
| Naucoria | striatula | | P.D. Orton | Alnicola striatula | Alnicole à chapeau strié | 92 |
| Nectria | cinnabarina | | (Tode) Fr. | Tubercularia vulgaris (anar | Nectrie couleur de cinabre | 2599 |
| Neoantrodia | serialis | | (Fr.) Audet | Antrodia serialis - Polypor | Antrodie sériée | 2600 |
| Neoboletus | erythropus | | (Pers.) C. Hahn | Boletus erythropus | Bolet à pied rouge | 2601 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|--|------|
| Neoboletus | flavosanguineus | | (Lavorato & Sim | Boletus flavosanguineus | Bolet jaune saignant | 267 |
| Neoboletus | xanthopus | | (Klofac & A. Urb | Boletus xanthopus | Bolet à pied jaune | 2603 |
| Neobulgaria | pura | | Pers. | Ombrophila pura - Bulgaria | Néobulgarie pure | 2604 |
| Neofavolus | alveolaris | | (DC.) Sotome & | Polyporus mori - Polyporus | Polypore à pores hexagonaux | 2605 |
| Neofavolus | suavissimus | | (Fr.) J.S. Seelan, | Panus suavissimus - Lentin | Lentin anisé | 2606 |
| Neohygrocybe | ovina | | (Bull.) Herink | Hygrophorus ovinus - Cam | Hygrocybe des brebis | 2609 |
| Neolentinus | adhaerens | | (Alb. & Schwein | Lentinus adhaerens | Lentin collant | 2610 |
| Neolentinus | cyathiformis | | (Schaeff.) Della | Lentinus cyathiformis - Len | Lentin de Schaeffer | 2611 |
| Neolentinus | lepideus | | (Fr.) Fr. | Lentinus lepideus | Lentin écailleux - Polypore d'hiver | 2612 |
| Neonectria | coccinea | | (Pers.) Rossman | Nectria coccinea | Nectrie coccinée | 2613 |
| Notholepista | subzonalis | | (Peck) Vizzini & | Leucopaxillus subzonalis - | Leucopaxille clitocyboïde | 2615 |
| Nothopanus | candidissimus | | (Sacc.) Küner | Cheimonophyllum candidi | Pleurote candide | 351 |
| Octospora | humosa | | (Fr.) Dennis | Peziza humosa | Pézize des mousses | 2616 |
| Octospora | musci-muralis | | Graddon | Peziza rufa | | 3803 |
| Oligonema | persimile | | Garcia-Cunch., J | Trichia persimilis | | 3804 |
| Oligoporus | subcaesius | | (A. David) B.K. C | Postia subcaesia - Tyromyc | Polypore bleuté des feuillus | 2620 |
| Omphaliaster | asterosporus | | (J.E. Lange) Lam | Omphalia asterospora - Or | Omphale à spores étoilées | 2622 |
| Omphalina | cyanobrunnescens | | Imler | | Omphale bleutée noircisante | 2623 |
| Omphalina | demissa | | (Fr.) Fr. | Omphalia demissa | Omphale à chapeau déprimé | 2624 |
| Omphalina | kuehneri | | Lamoure | | Omphale dédiée à Kühner | 2625 |
| Omphalina | mutila | | P.D. Orton | Gerronema josserandii - O | Omphale tronquée | 2626 |
| Omphalina | pyxidata | | Bull. | Omphalia pyxidata - Gerro | Omphale en forme de coupe | 2627 |
| Omphalina | pyxidata | var. cystidiata | M. Curti, Contu & Vizzini | | Variété cystidiée d'Omphalina pyxidata | 2628 |
| Omphalina | rivulicola | | (J. Favre) Lamoure | | Omphale des ruisseaux | 2629 |
| Omphalina | subhepatica | | (Batsch) Murrill | Omphalina hepatica | Omphale couleur de foie | 2630 |
| Omphalotus | illudens | | (Schwein.) Bresl | Clitocybe illudens - Ompha | Clitocybe trompeur | 2632 |
| Omphalotus | olearius | | (DC.) Fayod | Clitocybe olearia | Clitocybe de l'olivier | 2631 |
| Onnia | circinata | | (Fr.) P. Karst. | Xanthochrous circinatus - F | Polypore circiné | 2633 |
| Onnia | tomentosa | | (Fr.) P. Karst. | Xanthochrous tomentosus | Polypore tomenteux | 2634 |
| Onygena | corvina | | Alb. & Schwein. | | Onygène des corbeaux | 2635 |
| Onygena | equina | | (Willd.) Pers. | | Onygène des sabots de chevaux | 2636 |
| Orbilina | xanthostigma | | (Fr.) Fr. | Peziza delicatula - Orbilia d | Pézize délicate | 2637 |
| Ossicaulis | lachnopus | | (Fr.) Contu | | Ossicaulis à petites spores | 2638 |
| Ossicaulis | lignatilis | | Pers. | Nothopanus lignatilis - Clit | Clitocybe lignicole | 2639 |
| Osteina | obducta | | (Berk.) Donk | Polyporus obductus - Oligo | Polypore osseux | 2640 |
| Otidea | alutacea | | Pers. | Peziza alutacea - Aleuria al | Otidée alutacée | 2642 |
| Otidea | bufonia | | (Pers.) Boud. | Aleuria bufonia - Peziza bu | Otidée excrécable | 2643 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---|------|
| Otidea | cantharella | | (Fr.) Quél. | Peziza concinna - Otidea co | Otidée charmante | 2645 |
| Otidea | cochleata | | (L.) Fuckel | Peziza cochleata - Peziza u | Otidée en colimaçon | 2644 |
| Otidea | leporina | | (Batsch) Fuckel | Aleuria leporina - Peziza le | Oreille de lièvre | 2646 |
| Otidea | onotica | | (Pers.) Fuckel | Aleuria onotica - Peziza on | Otidée en forme d'oreille d'âne | 2647 |
| Oxyporus | populinus | | (Schumach.) Do | Polyporus populinus - Rigi | Oxypore du peuplier | 2649 |
| Oxyporus | ravidus | | (Fr.) Bondartsev | Polyporus ravidus | Oxypore gris jaunâtre | 2650 |
| Panaeolina | foeniseeii | | Pers. | Panaeolus foeniseeii | Panéole des moissons | 2651 |
| Panaeolus | acuminatus | | (Schaeff.) Gillet | | Panéole acuminé | 2652 |
| Panaeolus | antillarum | | (Fr.) Quél. | Anellaria antillarum | Panéole chrysocystidié | 2654 |
| Panaeolus | ater | | (J.E. Lange) Kühn | Panaeolus fimicola sensu a | Panéole sombre | 2655 |
| Panaeolus | fimicola | | (Pers.) Gillet | | Panéole à spores avec pore oblique | 2657 |
| Panaeolus | leucophanes | | (Berk. & Broome) Sacc. | | Panéole blanc à aspect soyeux | 2656 |
| Panaeolus | olivaceus | | F.H. Møller | | Panéole olivacé | 2658 |
| Panaeolus | papilionaceus | | (Bull.) Quél. | Panaeolus sphinctrinus - P | Panéole à marge du chapeau dentée | 2659 |
| Panaeolus | rickenii | | Horak | Panaeolus acuminatus var. | Panéole de Ricken | 2653 |
| Panaeolus | semiovatus | | (Sowerby) S. Lur | Anellaria semiovata | Panéole ovoïde | 2660 |
| Panaeolus | semiovatus | var. phalaenarum | (Fr.) Ew. Gerhar | Panaeolus phalaenarum - V | Variété sans anneau de Panaeolus semiovatus | 2661 |
| Panellus | mitis | | Pers. | Pleurotus mitis | Panelle à saveur douce | 2662 |
| Panellus | ringens | | (Fr.) Fr. | Lentinus ringens - Panus ri | Panelle à marge du chapeau striée | 2663 |
| Panellus | stipticus | | Bull. | Panus stipticus - Pleurotus | Panelle à saveur stiptique | 2664 |
| Panellus | stipticus | var. albus | (Bres.) P. Roux | Panus stipticus var. albus | Variété blanche de Panellus stipticus | 3701 |
| Panellus | violaceofulvus | | (Batsch) Singer | Pleurotus violaeofulvus - P | Panelle brun violet | 2665 |
| Panus | conchatus | | (Bull.) Fr. | Lentinus conchatus - Lenti | Panus en éventail | 2666 |
| Panus | neostrigosus | | (Fr.) Corner | Panus rudis - Lentinus strig | Panus de Lecomte | 2667 |
| Paragalactinia | michelii | | (Boud.) Dennis | Galactinia michelii - Peziza | Pézize de Micheli | 2713 |
| Paragalactinia | succosa | | (Berk.) Van Voo | Galactinia succosa - Aleuri | Pézize à latex jaune | 2720 |
| Paragalactinia | succosella | | (Le Gal & Romag | Galactinia succosella - Pezi | Miniature de Peziza succosa | 2721 |
| Paragymnopus | perforans | | (Hoffm.) J.S. Oliv | Micromphale perforansGy | Marasme perforant | 1515 |
| Paragyromitra | infula | | (Schaeff.) X.C. W | Gyromitra infula - Physomi | Gyromitre en turban | 1525 |
| Paralepista | ameliae | | (Arcang.) Vizzini | Lepista ameliae - Clitocybe | Clitocybe d'Amélie | 2668 |
| Paralepista | flaccida | | (Sowerby) Vizzin | Lepista flaccida - Clitocybe | Clitocybe inversé des feuillus | 2669 |
| Paralepista | gilva | | (Pers.) Raitheh. | Lepista gilva - Clitocybe gil | Clitocybe jaunâtre | 2670 |
| Paralepista | lentiginosa | | (Fr.) Vizzini | Clitocybe lentiginosa - Lepi | Clitocybe méchuleux de brun-rouge | 2672 |
| Paralepista | pseudoparilis | | (Enderle & Cont | Lepista pseudoparilis | Faux Rhodocybe parilis | 2239 |
| Paralepistopsis | amoenolens | | (Malençon) Vizz | Clitocybe amoenolens | Clitocybe à bonne odeur | 2673 |
| Parascutellinia | violacea | | (Velen.) Svrcek | Lachnea violacea - Parascu | Pézize lilas violacé | 2674 |
| Parasola | auricoma | | (Pat.) Redhead, | Coprinus auricomus | Coprin à poils jaunes | 2675 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|--|--|---|------|
| Parasola | conopilea | | (Fr.) Orstadius & | Psathyrella subatrata - Psa | Psathyrelle à chapeau conique | 2676 |
| Parasola | hemerobia | | Redhead, Vilgaly | Coprinus hemerobius | | 3805 |
| Parasola | kuehneri | | (Uljé & Bas) Red | Coprinus plicatilis var. (et fr | Coprin à petites spores | 2677 |
| Parasola | lactea | | (A.H. Sm.) Redh | Coprinus leiocephalus | Coprin à chapeau lisse | 2678 |
| Parasola | lilatinctata | | (Bender & Uljé) | Coprinus lilatinctus | Coprin teinté de lilas | 2679 |
| Parasola | megasperma | | (P.D. Orton) Red | Coprinus megaspermus | Coprin à grandes spores | 2680 |
| Parasola | plicatilis | | (curtis) Redhead | Coprinus plicatilis | Coprin parasol | 2681 |
| Paraxerula | caussei | | (Maire) R.H. Pet | Xerula caussei - Marasmius | Collybie des hêtres | 2682 |
| Patinellaria | sanguinea | | (Pers.) P. Karst. | Peziza sanguineaDurella sanguinea. | | 3806 |
| Paxillus | adelphus | | Chaumeton, Gryta, Largeat & P.A. Moreau. | | Voisin de Paxillus rubicundulus | 2683 |
| Paxillus | cuprinus | | Jargeat, Gryta, Chaumeton, Vizzini. | | Paxille à chapeau cuivré | 2684 |
| Paxillus | involutus | | (Batsch) Fr. | | Paxille enroulé | 2685 |
| Paxillus | involutus | fo. eburneus | Gelardi, Segneri & Vizzini | | Forme blanc ivoire du paxille enroulé | 2686 |
| Paxillus | ionipus | | Qué. | Tapinella panuoides fo. ior | Forme à tomentum violet de Paxillus panuoides | 3434 |
| Paxillus | obscurisporus | | Hahn | | Paxille à sporée sombre | 2687 |
| Paxillus | olivellus | | P.A. Moreau et | Paxillus filamentosus sensu | Paxille filamenteux | 2688 |
| Paxillus | rubicundulus | | P.D. Orton | | Paxille rubicond | 2689 |
| Paxillus | zerovae | | Wasser | | Paxille de Zerova | 2690 |
| Paxina | queletii | | (Bres.) Stangl | Helvella queletii - Acetabu | Helvelle de Quélet | 2691 |
| Peniophora | aurantiaca | | (Bres.) Höhn & L | Peniophora aurantiacum | Péniophore orangé | 2692 |
| Peniophora | cinerea | | Pers. | Corticium cinereum | Péniophore cendré | 2693 |
| Peniophora | incarnata | | Pers. | Thelephora incarnata | Péniophore rouge incarnat | 2694 |
| Peniophora | laeta | | (Fr.) Donk | Peniophora pseudonuda | Péniophore de couleur gaie | 2695 |
| Peniophora | lilacea | | Bourdot & Galzin | | | 3807 |
| Peniophora | limitata | | (Chaillet ex Fr.) | Peniophora fraxinea | Péniophore des frênes | 2696 |
| Peniophora | lycii | | (Pers.) Höhn. & | Corticium lycii | Péniophore des arbrisseaux | 2697 |
| Peniophora | piceae | | (Pers.) J. Erik. | Peniophora cinerea var. pi | Péniophore des épicéas | 2698 |
| Peniophora | pini | | (Schleich. ex DC | Sterellum pini | Péniophore des pins | 2699 |
| Peniophora | pithya | | (Pers.) J. Erikss. | Peniophora plumbea | Péniophore des conifères | 2700 |
| Peniophora | polygonia | | (Pers. : Fr.) Bour | Corticium polygonium | Péniophore des trembles | 2701 |
| Peniophora | proxima | | Bres. | | Péniophore du buis | 2702 |
| Peniophora | quercina | | Pers. | Corticium quercinum | Péniophore du chêne | 2703 |
| Peniophora | violaceolivida | | (Sommerf.) Mas | Peniophora cinerea var. violaceolivida. | | 3808 |
| Peniophorella | praetermissa | | (P. Karst.) K.H. L | Hyphoderma praetervissumCorticium praetermissum - Peniophora praetermiss | | 3809 |
| Peziza | arvernensis | | Roze & Boud. | Aleuria arvernensis - Peziza | Pézize d'Auvergne | 2707 |
| Peziza | cerea | | Sowerby | Aleuria cerea - Galactinia c | Pézize cireuse | 2709 |
| Peziza | domiciliana | | Cooke | Peziza adae - Aleuria domi | Pézize des maisons | 2710 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---------------------|--|---|------|
| Peziza | echinospora | | P. Karst. | Peziza anthracophila - Aleu | Pézize à spores verruqueuses | 2711 |
| Peziza | micropus | | Pers. | Aleuria micropus - Galactir | Pézize à petit pied | 2714 |
| Peziza | nivalis | | (R. Heim & L. Ré | Aleuria nivalis - Galactinia | Pézize des neiges | 2715 |
| Peziza | praetervisa | | Bres. | Aleuria praetervisa - Galac | Pézize des places à feu | 2717 |
| Peziza | repanda | | Wahlenb. | Aleuria repanda - Galactini | Pézize sinuée | 2718 |
| Peziza | saniosa | | Schrad. | Galactinia saniosa - Aleuria | Pézize de couleur sombre | 2719 |
| Peziza | varia | | Fr. | Aleuria varia | Pézize variable | 2722 |
| Peziza | vesiculosa | | Bull. | Aleuria vesiculosa | Pézize vésiculeuse | 2723 |
| Phaeoclavulina | abietina | | (Pers.) Giachini | Ramaria abietina - Ramaria | Ramaire du sapin | 3702 |
| Phaeoclavulina | eumorpha | | (P. Karst.) Giach | Clavaria invalii - Ramaria c | Clavaire palmée des conifères | 2967 |
| Phaeoclavulina | flaccida | | (Fr.) Fr. | Ramaria flaccida - Clavaria | Ramaire flasque | 2725 |
| Phaeoclavulina | myceliosa | | (Peck) Franchi & | Ramaria myceliosa | Ramaire jaune verdâtre | 3703 |
| Phaeoclavulina | ochracea | | (Bres.) Giachini | Ramaria ochracea - Lachnc | Ramaire ochracée | 2726 |
| Phaeocollybia | christinae | | (Fr.) R. Heim | Naucoria christinae | Phaeocollybie couleur de brique | 2727 |
| Phaeocollybia | cidaris | | (Fr.) Romagn. | Naucoria cidaris | Phaeocollybie à chapeau en forme de tiare | 2728 |
| Phaeocollybia | festiva | | (Fr.) R. Heim | Naucoria festiva | Phaeocollybie en habits de fête | 2729 |
| Phaeocollybia | jennyae | | (P.Karst.) Romag | Naucoria jennyae | Phaeocollybie de Jenny | 2730 |
| Phaeocollybia | lugubris | | (Fr.) Fr. | Naucoria lugubris | Phaeocollybie couleur de datte | 2731 |
| Phaeohelotium | carneum | | (Fr.) Hengstm. | Peziza carnea - Phaeohelotium subcarneum | | 3810 |
| Phaeolepiota | aurea | | (Matt.) Konrad & | Cystoderma aureum - Phol | Pholiote dorée | 2733 |
| Phaeolus | schweinitzii | | (Fr.) Pat. | Polyporus Schweinitzii - Ha | Polypore des teinturiers | 2734 |
| Phaeomarasmius | borealis | | Raid | | Phaéomarasme boréal | 2735 |
| Phaeomarasmius | erinaceus | | (Fr.) Kühner | Naucoria erinaceus | Phaéomarasme hérisson | 2736 |
| Phaeomarasmius | rimulincola | | (Rabenh.) P.D. C | Phaeomarasmius horizont | Phaéomarasme des feuillus | 2737 |
| Phaeomarasmius | siquieri | | Salom & Esteve-Rav. | | Phaéomarasme du genévrier | 2738 |
| Phaeotremella | foliacea | | (Pers.) Wedin, J. | Tremella foliacea - Exidia f | Trémelle foliacée | 3461 |
| Phallus | hadriani | | Vent. | Phallus imperialis | Satyre des dunes | 2740 |
| Phallus | impudicus | | L. | | Satyre puant | 2741 |
| Phallus | impudicus | fo. togatus | (Kalchbr.) Qué. | | Phalle à marge blanche | 2742 |
| Phallus | indusiatus | | Vent. | Phallus duplicatus | Phalle à double voile | 2739 |
| Phanerochaete | laevis | | (Fr.) J. Eriksson & | Thelephora laevis - Peniophora laevis | | 3811 |
| Phanerochaete | sordida | | (P. Karst.) J. Erik | Corticium sordidum | | 3812 |
| Phanerochaete | velutina | | (DC.) P. Karst. | Peniophora velutina | Phanerochaete velouté | 2743 |
| Phellinopsis | conchata | | (Pers) Y.C. Dai | Phellinus salicinus - Phellin | Polypore à marge dorée | 2744 |
| Phellinus | erectus | | A. David, Dequa | Fomitoporia erecta | Polypore dressé | 2745 |
| Phellinus | hartigii | | (Allesch. & Schn | Fomitiporia hartigii - Polyp | Polypore des sapins | 2746 |
| Phellinus | igniarius | | (L.) Qué. | Phellinus trivialis - Ochrop | Polypore faux amadouvier | 2747 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|--|------|
| Phellinus | pomaceus | | (Baug.) Niemalä | Phellinus tuberculosus - Oc | Polypore des pruniers | 2750 |
| Phellinus | tremulae | | (Bondartsev) Bo | Ochroporus tremulae | Polypore des trembles | 2749 |
| Phellodon | confluens | | (Pers.) Pouzar | Phellodon amicus | Phellodon confluent | 2751 |
| Phellodon | fuligineoalbus | | (J.C. Schmidt) R. | Sarcodon fuligineoalbum - Bank | Bankera blanc fuligineux | 242 |
| Phellodon | melaleucus | | (Schulz.) P. Karst | Hydnellum melaleucum | Phellodon noir et blanc | 2752 |
| Phellodon | niger | | (Fr.) Fr. | Hydnellum nigrum | Phellodon noir | 2753 |
| Phellodon | tomentosus | | L. | Calodon tomentosus | Phellodon tomenteux | 2754 |
| Phellodon | violascens | | (Alb. & Schwein | Sarcodon violascens - Bank | Bankera à chair violacine | 243 |
| Phlebia | radiata | | Fr. | Phlebia merismoides - Phle | Phlebia radialement ridé-plissé | 2757 |
| Phlebia | rufa | | (Pers.) M.P. Chri | Merulius rufus | Phlebia de couleur rousse | 2758 |
| Phlebia | subochracea | | (Bres.) J. Eriss. & | Mycoacia subochracea | Phlebia jaune ochracé | 2759 |
| Phlebia | tremellosa | | (Schrader) | Merulius imbricatus - Meru | Mérule tremblante | 2448 |
| Phlebiopsis | gigantea | | (Fr.) Jülich | Peniophora gigantea - Phle | Polypore du pin | 2761 |
| Phlegmacium | amoenolens | | (Rob. Henry ex F | Cortinarius amoenolens | Cortinaire à odeur de prune | 565 |
| Phlegmacium | argutus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius argutus | Cortinaire jaune crème | 577 |
| Phlegmacium | aurilicis | | (Chevassut & Tr | Cortinarius aurilicis | Cortinaire doré du chêne vert | 588 |
| Phlegmacium | balteatocumatile | | (Rob. Henry ex | Cortinarius balteatocumat | Cortinaire brun violet | 595 |
| Phlegmacium | balteatocumatilis | var. laetum | M.M. Moser | Cortinarius balteatocumat | Cortinarius balteatocumatilis aux couleurs vives | 596 |
| Phlegmacium | balteatotomentosum | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius balteatotomen | Cortinaire à chapeau feutré | 597 |
| Phlegmacium | balteatum | | (Fr.) A. Blytt | Cortinarius balteatus | Cortinaire à marge violette | 598 |
| Phlegmacium | caesiocortinatum | | (Jul. Schäff.) Nis | Cortinarius caesiocortinatu | Cortinaire à gros bulbe marginé | 618 |
| Phlegmacium | caligatum | | (Malençon) Nisk | Cortinarius caligatus | Cortinaire chaussé | 623 |
| Phlegmacium | camptoros | | (Brandrud & Me | Cortinarius camptoros | Cortinaire à chapeau irrégulier | 628 |
| Phlegmacium | clarobaltoides | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius clarobaltoides | Cortinaire affine aux "Balteati" | 653 |
| Phlegmacium | cliduchus | | (Secr. ex Fr.) Nis | Cortinarius cliduchus | Cortinaire à pied clavé | 655 |
| Phlegmacium | delaportei | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius delaportei | Cortinaire dédié à Delaporte | 686 |
| Phlegmacium | durus | | (P.D. Orton) Nis | Cortinarius balteatoclarico | Cortinaire à chair dure | 699 |
| Phlegmacium | eliae | | (Bidaud et al.) N | Cortinarius eliae | Amanite d'Elias Fries | 3678 |
| Phlegmacium | eucaeruleum | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius eucaeruleus | Cortinaire bleu | 712 |
| Phlegmacium | fraudulosum | | (Britzelm.) Niska | Cortinarius fraudulosus | Cortinaire trompeur | 731 |
| Phlegmacium | georgiolens | | (Rob. Henry) Nis | Cortinarius georgiolens | Cortinaire à odeur de farine | 745 |
| Phlegmacium | glaucopus | | (Schaeff.) Wüns | Cortinarius glaucopus | Cortinaire à pied glauque | 749 |
| Phlegmacium | herculeum | | (Malençon) Nisk | Cortinarius herculeus | Cortinaire herculéen | 763 |
| Phlegmacium | inexpectatum | | Brandrud) Niska | Cortinarius inexpectatus | Cortinaire inattendu | 780 |
| Phlegmacium | lepistoides | | (T.S. Jeppesen & | Cortinarius lepistoides | Cortinaire en forme de Lepista nuda | 799 |
| Phlegmacium | luteovaginans | | (Bidaud et al.) N | Cortinarius luteovaginans | Cortinaire à pied voilé de jaune | 3704 |
| Phlegmacium | mahiquesii | | (Vila, Ortega & S | Cortinarius mahiquesii | Cortinaire de Mahiquesi | 811 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|---|---|------|
| Phlegmacium | moenne-loccozii | (Bidaud) Niskanen | Cortinarius moenne-loccozii | Cortinaire de Moëgne-Loccoz | 821 |
| Phlegmacium | mussivum | (Fr.) Niskanen & Niskanen | Cortinarius mussivus | Cortinaire souffré | 830 |
| Phlegmacium | obsoletum | (Kühner) Niskanen | Cortinarius obsoletus | Cortinaire obsolète | 840 |
| Phlegmacium | olidoamarum | (J. Favre) Niskanen | Cortinarius olidoamarus | Cortinaire très amer | 850 |
| Phlegmacium | olidoamethysteum | (Rob. Henry & R. Henry) | Cortinarius olidoamethysteus | Cortinaire à lames lilacines | 852 |
| Phlegmacium | olidum | (J.E. Lange) Niskanen | Cortinarius olidus | Cortinaire puant | 853 |
| Phlegmacium | olivaceodionysae | (A. Ortega et al.) Niskanen | Cortinarius olivaceodionysae | Cortinaire à chapeau visqueux et olivâtre | 3705 |
| Phlegmacium | olivellum | (Rob. Henry) M. Niskanen | Cortinarius olivellus | Cortinaire olivâtre | 3870 |
| Phlegmacium | ophiopus | (Peck) Niskanen | Cortinarius rufoalbus - Cortinarius ophiopus | Cortinaire à pied gainé | 857 |
| Phlegmacium | papulosum | (Fr.) Niskanen & Niskanen | Cortinarius papulosus | Cortinaire pustuleux | 865 |
| Phlegmacium | paracephalixum | (Bohus) Niskanen | Cortinarius paracephalixus | Cortinaire ochracé | 866 |
| Phlegmacium | percome | (Fr.) A. Blytt | Cortinarius percomis | Cortinaire aromatique | 875 |
| Phlegmacium | pini | (Brandrud) Niskanen | Cortinarius pini | Cortinaire des pins | 882 |
| Phlegmacium | populinum | (Brandrud) Niskanen | Cortinarius populinus | Cortinaire des trembles | 894 |
| Phlegmacium | prasinocyanum | (Rob. Henry) Niskanen | Cortinarius prasinocyanus | Cortinaire vert et bleu | 898 |
| Phlegmacium | pseudoarcuatorum | (Rob. Henry) Niskanen | Cortinarius pseudoarcuatorum | Faux cortinarius arcuatorum | 905 |
| Phlegmacium | pseudopansa | (Bidaud) Niskanen | Cortinarius pseudopansa | Faux Cortinaire pansa | 912 |
| Phlegmacium | reverendissimum | (Bidaud, Moëgne) Niskanen | Cortinarius reverendissimus | Cortinaire boletoïde | 932 |
| Phlegmacium | saginum | (Fr.) Niskanen & Niskanen | Cortinarius saginus | Cortinaire décoré | 950 |
| Phlegmacium | sobrium | (P. Karst.) Niskanen | Cortinarius sobrius | Cortinaire sobre | 968 |
| Phlegmacium | squameoradicans | (Bellivier ex Chev.) Niskanen | Cortinarius squameoradicans | Cortinaire squamuleux-radicant | 981 |
| Phlegmacium | subbalteatum | (Kühner) Niskanen | Cortinarius subbalteatus | Proche de Cortinarius balteatus | 990 |
| Phlegmacium | subrugulosum | (Bidaud & Armanet) Niskanen | Cortinarius subrugulosus | Cortinaire à chapeau plissé | 3675 |
| Phlegmacium | terpsichores | (Melot) Niskanen | Cortinarius terpsichores | Cortinaire dédié à la muse de la danse | 1011 |
| Phlegmacium | tiliae | (Brandrud) Niskanen | Cortinarius tiliae | Cortinaire des tilleuls | 1014 |
| Phlegmacium | tomentosum | (Rob. Henry) Niskanen | Cortinarius tomentosus | Cortinaire tomenteux | 1016 |
| Phlegmacium | triumphans | (Fr.) A. Blytt | Cortinarius crocolitus - Cortinarius triumphans | Cortinaire triomphant | 1024 |
| Phlegmacium | variiforme | (Malençon) Niskanen | Cortinarius variiformis | Cortinaire de forme variable | 1039 |
| Phlegmacium | vulpinum | (Velen.) Niskanen | Cortinarius vulpinus | Cortinaire des renards | 1055 |
| Phlegmacium | xantho-ochraceum | (P.D. Orton) Niskanen | Cortinarius xantho-ochraceus | Cortinaire à chapeau jaune ochracé | 1058 |
| Phloeomana | alba | (Bres.) Redhead | Mycena alba | Mycène blanche | 2762 |
| Phloeomana | clavata | (Peck) Redhead | Mycena phaeophylla - Mycena clavata | Mycène clavée | 2763 |
| Phloeomana | hiemalis | (Osbeck) Redhead | Mycena hiemalis - Hemimycena hiemalis | Mycène d'hiver | 2764 |
| Phloeomana | minutula | (Sacc.) Redhead | Mycena olida - Mycena minutula | Mycène minuscule | 2765 |
| Phloeomana | speirea | (Fr.) Fr. | Mycena speirea - Hemimycena speirea | Mycène groupée | 2766 |
| Pholiota | adiposa | (Batsch) P. Kumakura | Pholiota aurivella sensu lato | Pholiote grasse | 2767 |
| Pholiota | aurivella | Batsch | Pholiota cerifera | Pholiote cireuse | 2769 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------|
| Pholiota | carbonaria | | (Fr.) Singer | Pholiota highlandensis | Pholiote des charbonnières | 2780 |
| Pholiota | chocenensis | | Holec & Kolarik | | Pholiote de Chocen (ville de Bohême) | 2770 |
| Pholiota | conissans | | (Bull.) Kuyper & | Flammula conissans - Phol | Pholiote poudreuse | 2771 |
| Pholiota | elegans | | Jacobsson | | Pholiote élégante | 2772 |
| Pholiota | flammans | | (Batsch) P. Kumm. | | Pholiote jaune feu | 2773 |
| Pholiota | flavida | | (Schaeff.) Singer | Flammula flavida | Pholiote jaune | 2774 |
| Pholiota | gallica | | Holec & Kolarik | Pholiota highlandensis var. | Pholiote aux couleurs rouge brique | 2775 |
| Pholiota | gummosa | | (Lasch) Singer | Flammula gummosa | Pholiote gommeuse | 2776 |
| Pholiota | gummosa | var. rufobrunnea | (P. Karst.) Holec | Pholiota gummosa var. ob | Variété brun roux de Pholiota gummosa | 2778 |
| Pholiota | henningsii | | (Bres.) P.D. Orto | Flammula henningsii | Pholiote de Hennings | 2779 |
| Pholiota | heteroclita | | (Fr.) Quél. | Hemipholiota heteroclita | Pholiote hétéroclite | 1611 |
| Pholiota | jahnii | | Tjall-Beuk. & Bas | | Pholiote de Jahn | 2781 |
| Pholiota | lenta | | (Pers.) Singer | Flammula lentaDryophila l | Pholiote glutineuse | 2782 |
| Pholiota | lignicola | | (Peck) Jacobsson | Kuehneromyces lignicola - | Pholiote lignicole | 1984 |
| Pholiota | limonella | | (Peck) Sacc. | Pholiota aurivella sensu au | Pholiote nuancé de jaune citron | 2783 |
| Pholiota | lubrica | | (Pers.) Singer | Pholiota mixta var. xantho | Pholiote fauve | 2784 |
| Pholiota | lucifera | | (Lasch) Quél. | | Pholiote luisante | 2785 |
| Pholiota | lundbergii | | Jacobsson | | Pholiote de Lundberg | 2786 |
| Pholiota | mixta | | (Fr.) Kuyper & Tj | Flammula mixta | Pholiote voisine | 2787 |
| Pholiota | muricella | | (Fr.) Bon | Flammula muricella | Pholiote à chapeau moucheté | 2789 |
| Pholiota | ochroleuca | | (Fr.) P.D. Orton | Pholiota gummosa fo. och | Forme ocre vert jaune de Pholiota gummosa | 2777 |
| Pholiota | pityrodes | | (F. Brig.) Holec | | Pholiote à chapeau finement écailleux | 2790 |
| Pholiota | populnea | | (Pers.) Kuyper & | Pholiota destruens - Hemip | Pholiote destructrice | 1612 |
| Pholiota | scamba | | (Fr.) Fr. | Flammula scamba | Pholiote soyeuse | 2791 |
| Pholiota | spumosa | | (Fr.) Singer | Flammula spumosa | Pholiote baveuse | 2792 |
| Pholiota | squarrosa | | (Vahl) P. Kumm. | Pholiota muelleri | Pholiote écailleuse | 2793 |
| Pholiota | squarrosoides | | (Peck) Sacc. | | Sosie de la pholiote écaolleuse | 2794 |
| Pholiota | subochracea | | (A.H. Smith) A.H | Pholiota nematolomoides | Pholiote en forme d'hypholome | 2795 |
| Pholiota | tuberculosa | | (Schaeff.) P. Kumm. | | Pholiote tuberculeuse | 2796 |
| Pholiota | tuberculosa | var. curvipes | (Pers.) P. Roux et al. | | Pholiote tuberculeuse à pied courbe | 2797 |
| Pholiotina | atrocyanea | | Esteve-Rav, Hauskn. & Rejos | | Conocybe bleu-noir | 2800 |
| Pholiotina | teneroides | | (J.E. Lange & Sin | Pholiotina percincta - Phol | Conocybe bisporique | 2807 |
| Phragmotrichum | chailletii | | Kunze | Gymnosporangium chaillet | Phragmotrichum de Chaillet | 3706 |
| Phylloporia | ribis | | (Schumach.) Ryv | Phellinus ribis - Polyporus | Polypore des groseilliers | 2748 |
| Phylloporus | pelletieri | | (Lév.) Quél. | Phylloporus rhodoxanthus | Phyllopore de Pelletier | 2810 |
| Phylloptopsis | nidulans | | (Pers.) Singer | Pleurotus nidulans - Panus | Pleurote en forme de nid | 2811 |
| Phylloscypha | phyllogena | | (Cooke) Van Voc | Peziza phyllogena | Pézize olivacée | 2716 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|---|------|
| Phylloscypha | phyllogena | | (Cooke) Van Voc | Peziza badiocconfusa - Peziza olivacea | | 3813 |
| Phyllotopsis | rhodophyllus | | (Bres.) Singer | Pleurotus rhodophyllus - C | Clitopile à lames roses | 452 |
| Physarum | virescens | | Ditmar | | Physare verdoyant | 3871 |
| Physisporinus | vitreus | | (Pers.) P. Karst. | Poria vitrea - Polyporus vit | Polypore vitreux | 3814 |
| Picipes | badius | | (Pers.) Zmitr. & | Polyporus durus - Polyporu | Polypore bai | 2812 |
| Picipes | melanopus | | (Pers.) Zmitr. & | Polyporus melanopus | Polypore à pied noir | 2813 |
| Piloderma | byssinum | | (P. Karst.) Jülich | Lyomyces byssinus | | 3815 |
| Pisolithus | arhizus | | (Scop.) Rausche | Pisolithus arenarius - Pisol | Pisolithe sans racine | 2815 |
| Pithya | vulgaris | | Fuckel | | Pithya vulgaire | 2816 |
| Plectania | melastoma | | (Sowerby) Fucke | Urnula melastoma - Peziza | Urnule noirâtre | 2817 |
| Pleurocybella | porrigens | | (Pers.) Singer | Nothopanus porrigens - Pl | Pleurote en éventail | 2818 |
| Pleurotus | calyptratus | | (Lindbl.) Sacc. | | Pleurote à chapeau et pied voilés | 2819 |
| Pleurotus | citrinopileatus | | Singer | Pleurotus cornucopiae var. | Pleurotus cornucopiae à chapeau jaune | 2821 |
| Pleurotus | columbinus | | Qué. | Pleurotus ostreatus var. co | Pleurotus ostreatus couleur gorge de pigeon | 2829 |
| Pleurotus | cornucopiae | | (Paulet) Rolland | Pleurotus ostreatus fo. et v | Pleurote corne d'abondance | 2820 |
| Pleurotus | djamor | | (Rumph. ex Fr.) | Pleurotus salmoneostrami | Pleurote couleur saumon | 2832 |
| Pleurotus | dryinus | | Pers. | Pleurotus corticatus | Pleurote des chênes | 2822 |
| Pleurotus | eryngii | | DC. | | Pleurote du Panicaut | 2823 |
| Pleurotus | eryngii | var. ferulae | Lanzi | | Pleurote des fêrûles | 2824 |
| Pleurotus | eryngii | var. laserpitii | DC. | | Pleurote des Laserpitium | 2825 |
| Pleurotus | ferulaginis | | Zervakis, Ventur | Pleurotus eryngii var. ferul | Pleurote associé à Ferulago campestris | 2826 |
| Pleurotus | nebrodensis | | (Inzenga) Qué. | Pleurotus eryngii var. nebr | Pleurote des ombellifères | 2827 |
| Pleurotus | ostreatus | | (Jacq.) P. Kumm. | | Pleurote en forme d'huitre | 2828 |
| Pleurotus | populinus | | O. Hilber & O.K. Miller | | Pleurote du peuplier | 2830 |
| Pleurotus | pulmonarius | | (Fr.) Fr. | Pleurotus ostreatus var. et | Pleurote en forme de poumon | 2831 |
| Plicatura | nivea | | (Fr.) P. Karst. | Plicatura alni | Corticium de l'Aulne vert | 2833 |
| Plicatuopsis | crispa | | Pers. | Plicatura faginea | Plicature du hêtre | 2834 |
| Pluteus | alniphilus | | Citérin & Deparis | | Plutée de l'aulne vert | 2835 |
| Pluteus | atromarginatus | | (Konrad) Kühnel | Pluteus tricuspidatus - Plut | Plutée à lames bordées de noir | 2872 |
| Pluteus | aurantiorugosus | | (Trog) Sacc. | Pluteus coccineus | Plutée orangé | 2836 |
| Pluteus | cervinus | | (Schaeff.) P. Kun | Pluteus brunneoradiatus - | Plutée couleur de cerf | 2838 |
| Pluteus | chrysophaeus | | (Schaeff.) Qué. | Pluteus luteovirens | Plutée jaune verdâtre | 2839 |
| Pluteus | cinereofuscus | | J.E. Lange | | Plutée gris sombre | 2840 |
| Pluteus | diettrichii | | Bres. | Pluteus rimulosus | Plutée rimuleux | 2842 |
| Pluteus | ephebeus | | (Fr.) Fr. | Pluteus villosus - Pluteus n | Plutée villeux | 2843 |
| Pluteus | exiguus | | (Pat.) Sacc. | | Plutée minuscule | 2844 |
| Pluteus | fenzlii | | (Schulzer) Corriol & P.A. Moreau | | Plutée annelé | 2845 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------|
| Pluteus | hispidulus | | (Fr.) Fr. | | Plutée hispide | 2848 |
| Pluteus | hongoi | | Singer | Pluteus albineus | Plutée albinos | 2849 |
| Pluteus | inquilinus | | Romagn. | Pluteus semibulbosus sens | Plutée au pied bulbeux | 2850 |
| Pluteus | insidiosus | | Vellinga & Schreurs | | Plutée perfide | 2851 |
| Pluteus | leoninus | | (Schaeff.) P. Kum | Pluteus fayodii - Pluteus lu | Plutée couleur de lion | 2852 |
| Pluteus | lipidocystis | | Bonnard | | Plutée à cystides lipidiques | 2853 |
| Pluteus | nanus | | (Pers.) P. Kumm | Pluteus griseopus | Plutée nain | 2855 |
| Pluteus | nothopellitus | | Justo & Castro | | Sosie de Pluteus pellitus | 2856 |
| Pluteus | pellitus | | Pers. | | Plutée blanc | 2859 |
| Pluteus | petasatus | | (Fr.) Gillet | Pluteus patricius - Pluteus | Plutée en parasol | 2860 |
| Pluteus | phlebophorus | | (Ditmar) P. Kum | Pluteus luctuosus | Plutée veiné | 2861 |
| Pluteus | plautus | | (Weinm.) Gillet | Pluteus boudieri - Pluteus | Plutée à pied floconneux | 2862 |
| Pluteus | podospileus | | Sacc. & Cub. | Pluteus minutissimus - Plu | Plutée velouté | 2870 |
| Pluteus | poliocnemis | | Kühner | Pluteus diettrichii fo. poliocnemis | | 3816 |
| Pluteus | pouzarianus | | Singer | | Plutée de Pouzar | 2863 |
| Pluteus | primus | | Bonnard | | Plutée printanier | 2864 |
| Pluteus | pusillulus | | Romagn. | Pluteus minimus | Plutée nain | 2865 |
| Pluteus | romellii | | (Britzelm.) Sacc. | Pluteus lutescens - Pluteus | Plutée de Romell | 2866 |
| Pluteus | roseipes | | v. Höhn | Pluteus leoninus var. rosei | Plutée à pied rose | 2867 |
| Pluteus | salicinus | | Pers. | | Plutée du saule | 2868 |
| Pluteus | satur | | Kühner & Roma | Pluteus pallescens | Plutée saturé | 2869 |
| Pluteus | thomsonii | | (Berk. & Broome) Dennis | | Plutée de Thomson | 2871 |
| Pluteus | umbrosus | | Pers. | Pluteus cervinus var. umbr | Plutée brun d'ombre | 2873 |
| Pluteus | variabilicolor | | Babos | | Plutée de couleur variable | 2874 |
| Podofomes | mollis | | (Sommerf.) Gorj | Datronia mollis - Trametes | Polypore mou | 333 |
| Podofomes | trogii | | (Fr.) Donk | Polyporus trogii - Polyporu | Polypore de Trog | 2875 |
| Podoscypha | multizonata | | (Berk. & Broome) | Thelephora multizonata | Théléphore multizonée | 2876 |
| Pogonoloma | spinulosum | | (Kühner & Roma | Tricholoma spinulosum - P | Tricholome spinuleux | 2877 |
| Polyporus | tuberaster | | (Jacq.) Fr. | Polyporus lentus - Polypor | Polypore de Forquignon | 2878 |
| Polyporus | umbellatus | | (Pers.) Fr. | Dendropolyporus umbellat | Polypore en ombelle | 1189 |
| Poriella | subacida | | (Peck) C.L. | Perenniporia subacida | Polypore acidulé | 3817 |
| Porodaedalea | pini | | (Brot.) Murrill | Phellinus pini - Polyporus p | Polypore du pin | 2879 |
| Porostereum | spadiceum | | (Pers.) Hjortstan | Lopharia spadicea | Lophaire couleur de dattes | 2330 |
| Porphyrellus | porphyrosporus | | (Fr.) E.J. Gilbert | Porphyrellus pseudoscabe | Bolet porphyre | 2880 |
| Porpolomopsis | calyptriformis | | (Berk.) Bresinsky | Hygrocybe calyptriformis - | Hygrophore en capuchon | 2881 |
| Postia | ptychogaster | | (Kytov) Redhead | Oligoporus ptychogaster - | Polypore fuligineux | 2886 |
| Postia | tephroleuca | | (Fr.) Jülich | Oligoporus tephroleucus - | Polypore couleur de souris | 2621 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|---|------|
| Propolis | farinosa | | (Pers.) Fr. | Propolis versicolor | Propolis aux couleurs variables | 2887 |
| Protostropharia | alcis | | (Kytov) Redhead | Stropharia alcis | Strophaire nordique | 2888 |
| Protostropharia | dorsipora | | (Esteve-Rav. & B | Stropharia dorsipora - Psilo | Strophaire à pore germinatif excentré | 2889 |
| Protostropharia | islandica | | (Kytov) Redhead | Stropharia islandica - Psilo | Strophaire d'Islande | 2890 |
| Protostropharia | luteonitens | | (Fr.) Redhead | Stropharia umbonatescens | Strophaire umboné | 2891 |
| Protostropharia | semiglobata | | (Batsch) Redhea | Stropharia semiglobata | Strophaire hémisphérique | 2892 |
| Prunulus | diosmus | | (Krieglst. & Schw | Mycena diosma | Mycène à deux odeurs | 2490 |
| Psathyrella | ammophila | | (Durieu & Lév.) P | Psilocybe ammophila | Psathyrelle des sables | 2893 |
| Psathyrella | artemisiae | | (Pass.) Konrad & | Hypholoma artemisiae | Psathyrelle squameuse | 3818 |
| Psathyrella | atomatoides | | (Peck) A.H. Sm. | Psathyrella rannochii - Psat | Psathyrelle à voile abondant | 2894 |
| Psathyrella | bifrons | | (Berk.) A.H. Sm. | Psathyra bifrons | Drosophila bifrons | 3819 |
| Psathyrella | bipellis | | (Quél.) A.H. Sm. | | Psathyrelle à lames rouges | 2895 |
| Psathyrella | caput-medusae | | (Fr.) Konrad & M | Stropharia caput-medusae | Psathyrelle tête de méduse | 2897 |
| Psathyrella | carminei | | Orstadius & E. Larss. | | Psathyrelle carminée | 2898 |
| Psathyrella | clivensis | | (Berkeley & Bro | Psilocybe clivensis | | 3820 |
| Psathyrella | conferta | | Eyssart. & Chiaffi | | Psathyrelle en touffes | 2899 |
| Psathyrella | corrugis | | Pers. | Psathyrella gracilis - Psathy | Psathyrelle gracile | 2900 |
| Psathyrella | cotonea | | (Quél.) Konrad & | Stropharia cotonea | Psathyrelle à voile laineux | 2901 |
| Psathyrella | elegans | | (Romagn.) Romagn. | | Psathyrelle élégante | 2902 |
| Psathyrella | fagetophila | | Orstadius & End | Psathyrella murcida sensu | Psathyrelle du hêtre | 2903 |
| Psathyrella | fatua | | (Fr.) Konrad & M | Psilocybe fatua | Psathyrelle beige pâle | 2904 |
| Psathyrella | gordonii | | (Berk. & Broome) | A. Pearson & Dennis | Psathyrelle de Gordon | 2905 |
| Psathyrella | hirta | | Peck | Psathyrella coprobia | Psathyrelle fimicole | 2906 |
| Psathyrella | laevissima | | (Romagn.) Singer | | Psathyrelle lisse | 2907 |
| Psathyrella | longicauda | | P. Karst. | | Psathyrelle à pied radicant | 2909 |
| Psathyrella | maculata | | (C.S. Parker) A.H. Sm. | | Psathyrelle tachée | 2910 |
| Psathyrella | merdicola | | Orstadius & E. Larss. | | Psathyrelle des bouses de vaches | 2911 |
| Psathyrella | microrrhiza | | (Lasch) Konrad & | Psathyrella semivestita | Psathyrelle à pied radicant | 2912 |
| Psathyrella | olympiana | | A.H. Sm. | | Psathyrelle de l'Olympe | 2914 |
| Psathyrella | olympiana | fo. caespitosa | Kits van Wav. | | Forme cespiteuse de Psathyrella olympiana | 2915 |
| Psathyrella | pennata | | (Fr.) A. Pearson | Psathyrella carbonicola | Psathyrelle des charbonnières | 2916 |
| Psathyrella | phegophila | | Romagn. | | Psathyrelle obscure | 2917 |
| Psathyrella | piluliformis | | Bull. | Psathyrella hydrophila - Ps | Psathyrelle hydrophile | 2918 |
| Psathyrella | potteri | | A.H. Sm. | Psathyrella prona fo. et va | Psathyrelle pailletée | 2919 |
| Psathyrella | prona | | (Fr.) Gillet | Psathyrella prona fo. picta | Psathyrelle penchée | 2920 |
| Psathyrella | pseudogracilis | | (Romagn.) M.M. Moser | | Sosie de la Psathyrelle gracile | 2921 |
| Psathyrella | purpureobadia | | Arnolds | | Psathyrelle brun pourpre | 2922 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--------------------------|---|--------------------------------|------|
| Psathyrella | pygmaea | | (Bull.) Singer | Psathyrella consimilis | Psathyrelle pygmée | 2923 |
| Psathyrella | saponacea | | F.H. Møller | Psathyrella coprophila - Ps | Psathyrelle à odeur de savon | 2924 |
| Psathyrella | scatophila | | Orstadius & E. Larss. | | Psathyrelle du fumier | 2925 |
| Psathyrella | senex | | (Peck) A.H. Sm. | Psathyrella ocellata | | 3821 |
| Psathyrella | spadiceogrisea | | (Schaeff.) Maire | Psilocybe spadiceogrisea - | Psathyrelle brun-gris | 2926 |
| Psathyrella | sphagnicola | | (Maire) J. Favre | Psathyrella psathyroides - | Psathyrelle des sphaignes | 2927 |
| Psathyrella | suavissima | | Ayer | Psathyrella sacchariolens | Psathyrelle à bonne odeur | 2928 |
| Psathyrella | tenera | | Peck | | Psathyrelle délicate | 2929 |
| Psathyrella | tephrophylla | | (Romagn.) Bon | Psathyrella fusca | Psathyrelle à lames cendrées | 2930 |
| Psathyrella | variata | | A.H. Sm. | | | 3822 |
| Psathyrella | vesterholtii | | Orstadius & E. Larss. | | Psathyrelle de Vesterholt | 2931 |
| Psathyrella | vinosofulva | | P.D. Orton | | Psathyrelle brun vineux | 2932 |
| Pseudoboletus | parasiticus | | Bull. | Boletus parasiticus - Xero | Bolet parasite | 2933 |
| Pseudoclitocybe | cyathiformis | | (Bull.) Singer | Clitocybe cyathiformis - Or | Clitocybe en coupe | 2934 |
| Pseudoclitocybe | expallens | | Pers. | Clitocybe expallens - Omp | Clitocybe pâissant | 2935 |
| Pseudoclitocybe | obbata | | (Fr.) Singer | Clitocybe obbata - Omphal | Clitocybe en forme de jarre | 2936 |
| Pseudoclitopilus | rhodoleucus | | (Romell) Kühner | Leucopaxillus rhodoleucus | Leucopaxille blanc et rose | 2937 |
| Pseudoclitopilus | salmonifolius | | (M.M. Moser & | Leucopaxillus salmonifolius | Leucopaxille à lames saumonées | 2938 |
| Pseudohydnum | gelatinosum | | (Scop.) P. Karst. | Tremellodon gelatinosum | Pseudohydne gélatineux | 2939 |
| Pseudoinonotus | dryadeus | | (Pers.) T. Wagne | Inonotus dryadeus - Polyp | Polypore du chêne | 2940 |
| Pseudolaccaria | pachyphylla | | (Fr.) Vizzini & Co | Clitocybe incomis - Clitocy | Clitocybe à lames larges | 2944 |
| Pseudombrophila | merdaria | | (Fr.) Brumm. | Aleuria merdaria - Ascophanus merdarius | | 3823 |
| Pseudomerulius | aureus | | (Fr.) Jülich | Merulius aureus - Serpula aurea | | 2941 |
| Pseudoomphalina | graveolens | | (S. Petersen) Co | Omphalia graveolens - Can | Clitocybe à forte odeur | 2942 |
| Pseudoomphalina | kalchbrenneri | | (Bres.) Singer | Pseudoomphalina compre | Clitocybe à pied comprimé | 2943 |
| Pseudoplectania | melaena | | (Fr.) Sacc. | Pseudoplectania vogesiaca | Pezize des Vosges | 3824 |
| Pseudoplectania | nigrella | | (Pers.) Fuckel | Peziza nigrella - Plectania r | Pézize noire | 2945 |
| Pseudoporpoloma | pes-caprae | | (Fr.) Vizzini & Co | Tricholoma pes-caprae - Pc | Tricholome pied de chèvre | 2946 |
| Pseudosperma | amabile | | Bandini, B. Oetel & Werh | | Inocybe gracieux | 3668 |
| Pseudosperma | arenicola | | (R. Heim) Mathe | Inocybe fastigiata var aren | Inocybe arénicole | 1850 |
| Pseudosperma | flavellum | | (P. Karst.) Mathe | Inocybe flavella | Inocybe à chapeau jaune | 1878 |
| Pseudosperma | hygrophorus | | (Kühner) Mathe | Inocybe hygrophorus | | 3825 |
| Pseudosperma | obsoletum | | (Quadr.) Valade | Inocybe rimosa var. obsole | Inocybe décevant | 1928 |
| Pseudosperma | perlatum | | (Cooke) Mather | Inocybe rimosa fo. perlata | Inocybe de grandes dimensions | 1935 |
| Pseudosperma | pseudocookei | | (Métrod ex Bon) | Inocybe pseudocookei | Faux Inocybe cookei | 1944 |
| Pseudosperma | rimosum | | (Bull.) Matheny | Inocybe rimosa - Inocybe f | Inocybe fastigié | 1875 |
| Pseudosperma | spurium | | (Jacobsson & E. | Inocybe spuria | Inocybe des régions boréales | 1957 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|---|------|
| Pseudosperma | squamatum | (J.E. Lange) Mat | Inocybe squamata | Inocybe squameux | 1958 |
| Pseudotracheloma | metapodium | (Fr.) Sánchez-Ga | Porpoloma metapodium - | Tricholome à pied fusiforme | 2947 |
| Psilocybe | atrobrunnea | (Lasch) Gillet | Psilocybe turficola (invalid) | Psilocybe brun noir | 2948 |
| Psilocybe | coronilla | (Bull.) Noordel. | Stropharia coronilla | Strophaire couronnée | 3391 |
| Psilocybe | cyanescens | Wakef. | | Psilocybe bleuissant | 2949 |
| Psilocybe | fimetaria | (P.D. Orton) Wa | Stropharia fimetaria | Psilocybe des crottins | 2950 |
| Psilocybe | hispanica | Guzmán. | | Psilocybe d'Espagne | 2951 |
| Psilocybe | liniformans | Guzmán & Bas | | Psilocybe à arête des lames gélatineuse | 2952 |
| Psilocybe | paupera | Singer | | Psilocybe à cystides brunes | 2953 |
| Psilocybe | pelliculosa | (A.H. Sm.) Singer & A.H. Sm. | | Psilocybe à cuticule séparable | 2954 |
| Psilocybe | semilanceata | (Fr.) Fr. | | Psilocybe lancéolé | 2955 |
| Psilocybe | strictipes | Singer & A.H. Sm. | | Psilocybe à pied étroit | 2956 |
| Psilocybe | subcoprophila | (Britzelm.) Sacc. | Deconica subcoprophila | Proche de Deconica coprophila | 1185 |
| Pterula | multifida | (Chevallier) Fr. | Pterula densissima | Ptérule à rameaux multiples | 2957 |
| Puccinia | buxi | de Candolle | | Rouille du buis | 3826 |
| Pulchroboletus | roseoalbidus | (Alessio & Luttin | Xerocomus roseoalbidus - | Bolet blanc rosé | 2958 |
| Pulvinula | convexella | (P. Karsten) Bou | Pulvinula constellatio | | 3827 |
| Pycnoporellus | fulgens | (Fr.) Donk | | Polypore lumineux | 2960 |
| Pyronema | domesticum | (Sowerby) Sacc. | Peziza domestica - Tapesia | Pezize domestique | 2962 |
| Pyrrhulomyces | astragalinus | (Fr.) E.J. Tian & F | Flammula astragalina - Phc | Pholiote rouge brique | 2768 |
| Radulomyces | molaris | (Chaillat ex fr.) N | Cerocorticium molare | Corticium denté | 337 |
| Ramaria | aurea | (Schaeff.) Qué. | Clavaria aurea | Clavaire dorée | 2963 |
| Ramaria | bataillei | (Maire) Corner | Clavaria bataillei | Clavaire de Bataille | 2964 |
| Ramaria | botrytis | Pers. | Clavaria botrytis. | Clavaire chou-fleur | 2965 |
| Ramaria | cettoi | Schild | | Clavaire de Cetto | 2966 |
| Ramaria | fennica | (P. Karst.) Ricker | Clavaria fennica | Clavaire nordique | 2968 |
| Ramaria | flava | (Schaeff.) Qué. | Clavaria flava | Clavaire jaune | 2969 |
| Ramaria | flavescens | (Schaeff.) R.H. P | Clavaria flavescens | Clavaire jaune pâle | 2970 |
| Ramaria | flavobrunnescens | (G.F. Atk.) Corne | Clavaria flavobrunnescens | Clavaire jaune à chair brunissante | 2971 |
| Ramaria | formosa | Pers. | Clavaria formosa | Clavaire aux belles couleurs | 2973 |
| Ramaria | fumigata | (Peck) Corner | Clavaria fumigata - Ramari | Clavaire gris-brun | 2974 |
| Ramaria | gracilis | Pers. | Clavaria gracilis | Clavaire gracile | 2975 |
| Ramaria | ignicolor | Bres. ex Corner | | Clavaire couleur feu | 2976 |
| Ramaria | largentii | Marr & D.E. Stuntz | | Clavaire de Largent | 2977 |
| Ramaria | pallida | (Schaeff.) Ricker | Clavaria pallida - Ramaria r | Clavaire pâle | 2978 |
| Ramaria | praecox | schild | | Clavaire printanière | 3872 |
| Ramaria | sanguinea | (Pers.) Qué. | Clavaria sanguinea | Clavaire sanguine | 2979 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|--|---|------|
| Ramaria | schildii | | R.H. Petersen | | Ramaire de Schild | 3707 |
| Ramaria | stricta | | Pers. | Clavaria stricta - Ramaria c | Clavaire droite | 2980 |
| Ramaria | subbotrytis | | (Coker) Corner | Clavaria subbotrytis | Clavaire rouge corail | 2981 |
| Ramaria | suecica | | (Fr.) Donk | Ramaria circinans - Clavariella suecica | | 3708 |
| Ramariopsis | crocea | | Pers. | Clavaria crocea - Clavulino | Clavaire safran | 2982 |
| Ramariopsis | kunzei | | (Fr.) Corner | Clavaria kunzei | Clavaire de Kunze | 2983 |
| Resinicium | bicolor | | (Alb. & Schwein | Mycoacia bicolor | | 3828 |
| Resupinatus | alboniger | | (Pat.) Singer | Hohenbuehelia alboniger - Pleurote noir et blanc | | 2984 |
| Resupinatus | algidus | | (Fr.) M. Lange | Hohenbuehelia algida - Ac | Pleurote glacial | 2985 |
| Resupinatus | applicatus | | (Batsch) Gray | Pleurotus applicatus - Acar | Pleurote appliqué | 2986 |
| Resupinatus | striatulus | | Pers. | Resupinatus applicatus fo. | Pleurote à chapeau strié | 2987 |
| Resupinatus | trichotis | | (Pers.) Singer | Resupinatus applicatus var | Pleurote à chapeau feutré | 2988 |
| Resupinatus | urceolatus | | (Wallroth) Thorn, Moncalvo & Redhead | | | 3829 |
| Reticularia | lycoperdon | | Bull. | Enteridium lycoperdon | Réticulaire vesse de loup | 2989 |
| Rheubarbariboletus | armeniacus | | (Quél.) Vizzini, S | Boletus armeniacus - Xero | Bolet couleur abricot | 2990 |
| Rheubarbariboletus | persicolor | | (Engel et al.) Viz | Xerocomus persicolor | Bolet couleur de pêche | 2991 |
| Rhizina | undulata | | Fr. | Rhizina inflata | Rhizine ondulée | 2992 |
| Rhizochaete | sulphurina | | (P. Karst.) K.H. L | Ceraceomyces sulphurinus | Corticium jaune soufre | 2993 |
| Rhizocybe | pruinosa | | (P. Kumm.) Vizzi | Clitocybe pruinosa - Clitocy | Clitocybe pruineux | 2994 |
| Rhizocybe | vermicularis | | (Fr.) Vizzini et co | Clitocybe vermicularis - Cli | Clitocybe à rhizomorphes | 2995 |
| Rhizomarasmius | epidryas | | (Kühner ex A. R | Marasmius epidryas | Marasme des dryades | 2996 |
| Rhizomarasmius | setosus | | (Sowerby) Antor | Marasmius setosus - Mara | Marasme des pétioles | 2997 |
| Rhizomarasmius | undatus | | (Berk.) R.H. Pete | Marasmius undatus | Marasme des fougères | 2998 |
| Rhizopogon | luteolus | | Fr. | Rhizopogon induratus | Rhizopogon à péridium jaune | 2999 |
| Rhizopogon | roca-brunae | | M.P. Martín | | Rhizopogon d'auguste Rocabrune | 3873 |
| Rhizopogon | roseolus | | (Corda) Th. M. F | Rhizopogon rubescens | Rhizopogon à péridium rosissant | 3000 |
| Rhodocollybia | asema | | (Fr.) Bendiksen | Collybia asema - Collybia b | Collybie beurrée forme pâle | 3002 |
| Rhodocollybia | butyracea | | (Bull.) Lennox | Collybia butyracea | Collybie beurrée | 3001 |
| Rhodocollybia | filamentosa | | (Velen.) Antonin | Collybia filamentosa | Collybie peignée | 3003 |
| Rhodocollybia | fodiens | | (Kalchbr.) Anton | Collybia fodiens | Collybie à pied radicant | 3004 |
| Rhodocollybia | maculata | | (Alb. & Schwein | Collybia maculata | Collybie maculée | 3005 |
| Rhodocollybia | maculata | var. immutabilis | (A.H. Sm.) Lenno | Collybia maculata var. imm | Collybie immaculée | 3006 |
| Rhodocollybia | maculata | var. longispora | Antonin & Noor | Collybia maculata var. long | Collybie maculée à longues spores | 3007 |
| Rhodocollybia | maculata | var. scorzonerea | (Fr.) Lennox | Collybia maculata var. scor | Collybie maculée variété de couleur jaune | 3008 |
| Rhodocollybia | prolixa | | (Fr.) Fr. | Collybia prolixa | Collybie grégaire | 3009 |
| Rhodocollybia | prolixa | var. distorta | (Fr.) Antonin & f | Collybia distorta - Rhodoc | Collybie à pied tordu | 3010 |
| Rhodocollybia | rufovinosa | | (Bon & Gaugué) | Collybia rufovinosa - Collyt | Collybie à chapeau roux vineux | 3011 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
| Rhodocybe | obscura | | (Pilát) M.M. Mo | Clitopilus obscurus | Rhodocybe obscur | 3017 |
| Rhodofomes | roseus | | (Alb. & Schwein | Fomitopsis rosea - Polypor | Polypore rose | 3020 |
| Rhodonina | placenta | | K.H. Larss. & Sch | Oligoporus placentusPolyp | Polypore placenta | 3830 |
| Rhodophana | melleopallens | | (P.D. Orton) Kluf | Rhodocybe melleopallens | Rhodocybe couleur miel | 3021 |
| Rhodophana | nitellina | | (Fr.) Kühner | Rhodocybe nitellina - Clito | Rhodocybe couleur d'écureuil | 3022 |
| Rhodophana | stangliana | | (Bresinsky & Pfa | Rhodocybe stangliana - Cl | Rhodocybe dédié à Stangl | 3023 |
| Rhodotus | palmatius | | Bull. | Pleurotus palmatius | Pleurote palmé | 3024 |
| Rhytisma | acerinum | | (Pers.) Fr. | | Parasite des feuilles d'érables | 3025 |
| Rhytisma | salicinum | | (Pers.) Fr. | | Parasite ds feuilles de saules | 3026 |
| Rickenella | fibula | | Bull. | Mycena fibula - Omphalia | Omphale en forme d'épingle | 3027 |
| Rickenella | mellea | | (Singer & Cléme | Gerronema melleum | Omphale couleur de miel | 3028 |
| Rickenella | swartzii | | (Fr.) Fr. | Rickenella setipes - Gerron | Omphale de Swartz | 3029 |
| Rigidoporus | crocatius | | (Pat.) Ryvarden | Poria crocata - Poria nigrescens | Rigidoporus nigrescens | 3831 |
| Rigidoporus | sanguinolentus | | (Alb. & Schweini | Physisporinus sanguinolen | Polypore rougissant | 3030 |
| Rigidoporus | ulmarius | | (Sowerby) Imaze | Ungulina ulmaria - Polypor | Polypore de l'orme | 3031 |
| Ripartites | metrodi | | Hujsman | | Ripartite de Métrod | 3032 |
| Ripartites | odora | | Riousset & Bon | | Ripartite odorant | 3033 |
| Ripartites | tricholoma | | (Alb. & Schwein | Ripartites strigiceps - Ripar | Ripartite à marge du chapeau barbue | 3034 |
| Ripartites | tricholoma | var. helomorphus | (Fr.) Konrad & M | Ripartites helomorphus | Forme à marge du chapeau sans poils | 3035 |
| Roridomyces | roridus | | (Scop.) Rexer | Mycena rorida | Mycène à pied gluant | 3037 |
| Rubroboletus | dupainii | | (Boud.) Kuan, Zh | Boletus dupainii - Suillellus | Bolet de Dupain | 3038 |
| Rubroboletus | legaliae | | (Pilát & Dermek | Boletus legaliae - Suillellus | Bolet de Mme Le Gal | 3039 |
| Rubroboletus | legaliae | fo. spinarii | (Hlaváček) Miks | Boletus spinarii - Suillellus | Bolet de Mme Le Gal à chapeau framboise | 3040 |
| Rubroboletus | lupinus | | (Fr.) Costanzo, G | Boletus lupinus - Suillellus | Bolet des loups | 3041 |
| Rubroboletus | pulchrotinctus | | (Alessio) Kuan Z | Boletus pulchrotinctus - Su | Bolet joli | 3042 |
| Rubroboletus | rhodoxanthus | | (Krombh.) Kuan | Boletus rhodoxanthus - Su | Bolet rouge et jaune | 3043 |
| Rubroboletus | rubrosanguineus | | (Cheype) Kuan Z | Boletus rubrosanguineus - | Bolet rouge sang | 3044 |
| Rubroboletus | satanas | | (Lenz) Kuan Zha | Boletus satanas - Suillellus | Bolet satan | 3045 |
| Rubroboletus | satanas | fo. crataegi | (Smotl. ex Antor | Boletus satanas fo. crataeg | Forme jaune du Bolet satan | 3046 |
| Rugosomyces | ionides | | Bull. | Calocybe ionides - Lyophyl | Calocybe violet | 3051 |
| Rugosomyces | persicolor | | Bull. | Calocybe persicolor - Lyop | Calocybe couleur de pêche | 3052 |
| Russula | aciculocystis | | Bills & Miller | | Russule à cystides en alène | 3054 |
| Russula | acrifolia | | Romagn. | | Russule à lames piquantes | 3055 |
| Russula | adusta | | (Pers.) Fr. | Russula nigricans | Russule brûlée | 3057 |
| Russula | aeruginea | | Lindblad ex Fr. | | Russule vert de gris | 3058 |
| Russula | albonigra | | (Krombh.) Fr. | Russula nigricans var. albo | Russule blanche et noire | 3059 |
| Russula | albonigra | fo. pseudonigricans | Romagn. | Russula albonigra var. pseu | Sosie de Russula nigricans | 3060 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--|------|
| Russula | alnetorum | | Romagn. | Russula pumila | Russule des aulnes | 3061 |
| Russula | alpigenes | | (Bon) Bon | Russula fragilis var. alpiger | Russule fragile des alpages | 3062 |
| Russula | alutacea | | (Pers.) Fr. | | Russule alutacée | 3063 |
| Russula | amarissima | | Romagn. & E.J. C | Russula lepida var. amara | Russule très amère | 3065 |
| Russula | amethystina | | Quél. | | Russule améthyste | 3066 |
| Russula | amoena | | Quél. | | Russule veloutée, agréable, charmante, amène | 3067 |
| Russula | amoenicolor | | Romagn. | | Russule panachée | 3068 |
| Russula | amoenicolor | fo. nigrosanguinea | Romagn. ex Campo & Socha | | Russula amoenicolor à chapeau pourpre noir | 3069 |
| Russula | amoenicolor | fo. olivacea | (Maire) Romagn | Russula punctata fo. olivac | Forme à chapeau olivacé | 3070 |
| Russula | amoenipes | | (Romagn. ex Bon | Russula xerampelina var. a | Russule à pied rose carminé | 3071 |
| Russula | amoenolens | | Romagn. | | Russule odorante | 3072 |
| Russula | anatina | | Romagn. | Russula anatina var. sejunc | Russule couleur aile de canard | 3073 |
| Russula | anthracina | | Romagn. | | Russule anthracite | 3074 |
| Russula | anthracina | var. carneifolia | Romagn. | | Russula anthracina à lames couleur chair | 3075 |
| Russula | anthracina | var. insipida | Romagn. | | Variété douce de Russula antracina | 3076 |
| Russula | aquosa | | Leclair | Russula carminea | Russule aqueuse | 3077 |
| Russula | archaeosuberis | | Sarnari | | Russule des chênes-lièges | 3078 |
| Russula | arpalices | | Sarnari | Russula elegans sensu Rom | Russule élégante | 3079 |
| Russula | atramentosa | | Sarnari | | Russule à chapeau feutré de noir | 3080 |
| Russula | atroglauca | | Einhellinger | | Russule bleu-vert | 3081 |
| Russula | atropurpurea | | (Krombh.) Britze | Russula krombholzii | Russule pourpre et noire | 3082 |
| Russula | atropurpurea | fo. dissidens | (Zvara) Bon | Russula krombholzii fo. dis | Forme dissidente de Russula atropurpurea | 3083 |
| Russula | atrorubens | | Quél. | | Russule rouge et noire | 3085 |
| Russula | aurantiaca | | (Jül. Schäff.) Ror | Russula integra var. aurant | Russule orangée | 3086 |
| Russula | aurea | | Pers. | Russula aurata | Russule dorée | 3087 |
| Russula | aurea | var. axantha | (Romagn.) Bon | Russula aurata fo. axantha | Russula aurea sans pigments jaunes | 3088 |
| Russula | aurora | | Krombh | Russula rosea - Russula vel | Russule aurore | 3274 |
| Russula | azurea | | Bres. | | Russule azurée | 3089 |
| Russula | badia | | Quél. | Russula friesii | Russule perfide | 3090 |
| Russula | betularum | | Hora | Russula emetica var. betul | Russule émétique des bouleaux | 3092 |
| Russula | blumiana | | Bon | Russula formosa | Russule de blum | 3093 |
| Russula | brunneoviolacea | | Crawshay | Russula pseudoviolacea | Russule brun violacé | 3094 |
| Russula | caerulea | | Fr. | Russula amara | Russule mamelonnée | 3064 |
| Russula | camarophylla | | Romagn. | | Russule hygrophore | 3095 |
| Russula | carminipes | | Blum | | Russule à pied carmin | 3097 |
| Russula | carpini | | Heinem. & Gérard | | Russule des charmes | 3098 |
| Russula | cavipes | | Britzelm. | | Russule à pied creux | 3099 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--|------|
| Russula | cessans | | A. Pearson | | Russule tardive | 3100 |
| Russula | chloroides | | (Krombh.) Bres. | | Russule à lames glauques | 3101 |
| Russula | cicatricata | | Romagn. ex Bon | | Russule à cicatrices | 3102 |
| Russula | cistoadelpha | | M.M. Moser & T | Russula cistorum | Russule des cistes | 3103 |
| Russula | clariana | | R. Heim ex Kuyper & Vuure | | Russule des peupliers blancs | 3105 |
| Russula | claroflava | | Grove | Russula ochroleuca var. cla | Russule jaune clair | 3106 |
| Russula | consobrina | | (Fr.) Fr. | | Russule voisine de Russula pectinata | 3107 |
| Russula | cremeoavellanea | | Singer | | Russule couleur de noisette | 3108 |
| Russula | cretata | | Reumaux | | Russule à chapeau pruineux | 3109 |
| Russula | cuprea | | Krombh. | Russula juniperina | Russule cuivrée | 3110 |
| Russula | curtipes | | F.H. Møller & Jul. Schäff. | | Russule à pied court | 3111 |
| Russula | cyanoxantha | | (Schaeff.) Fr. | | Russule charbonnière | 3113 |
| Russula | cyanoxantha | fo. peltereau | Singer | Russula cyanoxantha var. p | Russule de Peltereau | 3114 |
| Russula | cyanoxantha | var. flavoviridis | (Romagn.) Sarna | Russula flavoviridis | Variété à chapeau jaune vert | 3115 |
| Russula | cyanoxantha | var. subacerba | Reumaux | Russula variata sensu auct | Variété subacerbe de Russula cyanoxantha | 3116 |
| Russula | deceptiva | | Romagn. | | | 3676 |
| Russula | decipiens | | (Singer) Svrcek | Russula maculata var. deci | Russule trompeuse | 3117 |
| Russula | decolorans | | (Fr.) Fr. | | Russule décolorante | 3118 |
| Russula | delica | | Fr. | | Russule sans lait | 3119 |
| Russula | delica | var. puta | Romagn. | | Russule delica à petites spores | 3120 |
| Russula | delica | var. trachyspora | Romagn. | | Russule delica à spores épineuses | 3121 |
| Russula | densifolia | | Secr. ex Gillet | | Russule à lames serrées | 3122 |
| Russula | densissima | | Romagn. | | Russule noireude | 3123 |
| Russula | emetica | | (Schaeff.) Pers. | | Russule émetique | 3125 |
| Russula | emeticicolor | | (Jul. Schäff.) Sing | Russula lilacea var. emetic | Russule à chapeau rouge carmin | 3127 |
| Russula | exalbicans | | (Pers.) Melzer & | Russula pulchella | Russule pâissante | 3128 |
| Russula | faginea | | Romagn. ex Romagn. | | Russule des hêtres | 3129 |
| Russula | farinipes | | Romell | | Russule à pied farineux | 3130 |
| Russula | faustiana | | Sarnari | | Russule de Faust | 3131 |
| Russula | favrei | | M.M. Moser | Russula abietum - Russula | Russule des montagnes | 3132 |
| Russula | fellea | | (Fr.) Fr. | | Russule de fiel | 3133 |
| Russula | firmula | | Jul. Schäff. | | Russule ferme | 3134 |
| Russula | flavispora | | Romagn. | | Russule à sporée jaune | 3135 |
| Russula | foetens | | Pers. | | Russule fétide | 3136 |
| Russula | fontqueri | | Singer | Russula fontqueri var. impo | Russule de Font-Quer | 3137 |
| Russula | fragilis | | Fr. | Russula bataillei - Russula | Russule fragile | 3138 |
| Russula | fragrantissima | | Romagn. | Russula laurocerasi var. fra | Russule à odeur d'anis | 3139 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|------|
| Russula | fuliginosa | | Sarnari | | Russule fuligineuse | 3140 |
| Russula | fusca | | Quéf. | Russula cicatricata var. fusc | Russule sombre | 3141 |
| Russula | fuscorubra | | (Bres.) Singer | Russula torulosa fo. fusc | Russule rouge sombre | 3142 |
| Russula | fuscorubroides | | Bon | | Sosie de la Russule rouge sombre | 3143 |
| Russula | galochroides | | Sarnari | | Sosie de Russula galochroa | 3145 |
| Russula | gilvescens | | Romagn. ex Bon | | Russule de couleur isabelle | 3146 |
| Russula | gracillima | | Jul. Schäff. | | Russule très grêle | 3148 |
| Russula | grata | | Britzelm | Russula laurocerasi - Russu | Russule à odeur de laurier cerise | 3174 |
| Russula | graveolens | | Romell | Russula purpurataRussula | Russule malodorante | 3149 |
| Russula | grisea | | Fr. | Russula leucospora | Russule grise | 3150 |
| Russula | helodes | | Melzer | Russula rhodopus var. pse | Russule sanguine des marais | 3152 |
| Russula | heterochroa | | Kuhner | | Russule des dryades | 3153 |
| Russula | heterophylla | | (Fr.) Fr. | | Russule hétérophile | 3154 |
| Russula | heterophylla | fo. adusta | J.E. Lange | | Russule hétérophile à chapeau brunâtre | 3155 |
| Russula | hortensis | | Sarnari | | Russule des jardins | 3156 |
| Russula | Hydrophila | | Horniček | Russula emetica var. grisea | Russule grisonnante | 3151 |
| Russula | ilicis | | Romagn., Chevassut & Privat | | Russule des chênes verts | 3157 |
| Russula | illota | | Romagn. | Russula laurocerasi var. ill | Russule à arête ponctuée | 3158 |
| Russula | inamoena | | Sarnari | | Russule désagréable | 3160 |
| Russula | innocua | | (Singer) Singer | Russula smaragdina fo. et | Russule à chapeau gris verdâtre | 3161 |
| Russula | insignis | | Quéf. | Russula livescens sensu Bre | Russule à voile jaune | 3162 |
| Russula | integra | | (L.) Fr. | | Russule intègre | 3163 |
| Russula | integra | fo. pseudoolivascens | (Singer) P.A. Mo | Russula integra var. pseud | Russule intègre à chapeau olivacé | 3164 |
| Russula | integra | fo. purpurella | (Singer) Bon | Russula integra var. purpu | Russule intègre de couleur pourpre | 3165 |
| Russula | integra | var. oreas | Romagn. | Russula fusca var. oreas | Russule intègre des montagnes | 3166 |
| Russula | intermedia | | P. Karst. | Russula mesospora - Russu | Russule de Lundell | 3185 |
| Russula | ionochlora | | Romagn. | Russula grisea var. ionochl | Russule verte et violette | 3167 |
| Russula | laccata | | Huijsman | Russula norvegicaRussula r | Russule de Norvège | 3170 |
| Russula | laeta | | F.H. Møller & Ju | Russula borealis sensu auc | Russule de couleur gaie | 3171 |
| Russula | langei | | Bon | | Russule de Lange | 3172 |
| Russula | laricina | | Velen. | | Russule des mélèzes | 3173 |
| Russula | lepida | var. alba | Quéf. | | Russula lepida à chapeau blanc ocracé | 3176 |
| Russula | lepida | var. lactea | (Pers.) F.H. Møller & Jul. Schäff. | | Variété blanchâtre de Russula lepida | 3177 |
| Russula | lepida | var. salmonea | Zvara | | Variété rose de Russula lepida | 3178 |
| Russula | lepida | var. speciosa | Zvara | | Variété élégante de Russula lepida | 3179 |
| Russula | lepidicolor | | Romagn. | | Russule à chapeau rouge carminé | 3180 |
| Russula | lilacea | | Quéf. | Russula cremeoflavescensf | Russule lilas | 3182 |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|----------------|--------------------|--|--|------|
| Russula | littoralis | | Romagn. | | Russule maritime | 3184 |
| Russula | longipes | | (Singer) Moënn | Russula emetica var. longip | Russule émétique à long pied | 3126 |
| Russula | lutensis | | Romagnesi & Le Gal | | Russule des bourbiers | 3186 |
| Russula | luteotacta | | Rea | Russula persicina var. oligo | Russule jaunissante | 3187 |
| Russula | maculata | | Quéf. | Russula straminea - Russul | Russule maculée | 3188 |
| Russula | medullata | | Romagn. | | Russule à pied farci | 3190 |
| Russula | melitodes | | Romagn. | | Russule des trembles | 3191 |
| Russula | melliolens | | Quéf. | Russula atropurpurea var. | Russule à odeur de miel | 3192 |
| Russula | melzeri | | Zvara | | Russule de Melzer | 3193 |
| Russula | minutula | | Velen. | Russula rosea var. minutul | Russule minuscule | 3194 |
| Russula | monspeiliensis | | Sarnari | | Russule des cistes de Montpellier | 3195 |
| Russula | mustelina | | Fr. | | Russule couleur de belette | 3197 |
| Russula | nana | | Killerm. | Russula emetica var. alpina | Russule naine | 3198 |
| Russula | nauseosa | | (Pers.) Fr. | | Russule nauséuse | 3199 |
| Russula | nitida | | (Pers.) Fr. | Russula betulina | Russule brillante | 3201 |
| Russula | nobilis | | Velen. | Russula fageticola - Russul | Russule de Maire | 3189 |
| Russula | nympharum | | F. Hampe & Marxm. | | Russule des nymphes | 3202 |
| Russula | ochroleuca | | Pers. | Russula citrina | Russule ocre et blanche | 3204 |
| Russula | odorata | | Romagn. | | Russule odorante | 3206 |
| Russula | olivacea | | (Schaeff.) Fr. | | Russule olivacée | 3207 |
| Russula | olivacea | var. pavonina | (Bres.) Reumaux | | Russule olivacée à chapeau rouge pourpre | 3208 |
| Russula | olivaceoviolascens | | Gillet | Russula atrorubens var; olivaceoviolascens | | 3832 |
| Russula | olivascens | | Fr. | Russula postiana - Russula | Russule olivâtre | 3209 |
| Russula | pallidospora | | J. Blum ex Romagn. | | Russule à sporée pâle | 3210 |
| Russula | paludosa | | Bitzelmayr | Russula elatior | Russule des marais | 3211 |
| Russula | parazurea | | Jul. Schäff. | Russula ochrospora | Russule bleu-vert | 3212 |
| Russula | pascua | | (F.H. Møller & Ju | Russula xerampelina var. p | Russule des alpages | 3213 |
| Russula | pectinata | | Fr. | | Russule pectinée | 3214 |
| Russula | pelargonia | | Niolle | Russula cremeolilacina | Russule à odeur de pelargonium | 3215 |
| Russula | persicina | | Krombh. | | Russule couleur de pêche | 3216 |
| Russula | persicina | var. intactior | (Jul. Schäff.) Bor | Russula intactior | Russula persicina à chapeau décoloré | 3217 |
| Russula | persicina | var. rubrata | Romagn. | | Russula persicina à chapeau rouge vif | 3218 |
| Russula | poikilochroa | | Sarnari | Russula citrinolilacina - Rus | Russule polychrome | 3219 |
| Russula | poikilochroa | fo. Eliochroma | Sarnari | | Russule polychrome à chapeau jaune | 3220 |
| Russula | praetervisa | | Sarnari | Russula pectinatoides sens | Russule à odeur de baudruche | 3221 |
| Russula | pseudo-olivascens | | Kärcher | Russula elaeodes | Russule jaune verdâtre | 3124 |
| Russula | pseudoaeruginea | | (Romagn) Kuype | Russula aeruginea var. pseu | Sosie de Russula aeruginea | 3222 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|------|
| Russula | pseudoaeruginea | fo. galochroa | Sarnari | | Russula pseudoaeruginea à chapeau pâle | 3223 |
| Russula | pseudocampestris | | Kuhner | | Sosie de Russula campestris | 3224 |
| Russula | pseudodelica | | J.E. Lange | | Sosie de Russula delica | 3225 |
| Russula | pseudointegra | | Arnould & Goris ex Maire | | Russule coccinée | 3226 |
| Russula | pseudoraoultii | | Ayel & Biidaud | | Sosie de Russula raoultii | 3227 |
| Russula | pseudoromellii | | J. Blum ex Bon | | Sosie de Russula romellii | 3228 |
| Russula | puellaris | | Fr. | | Russule jeune fille | 3229 |
| Russula | puellula | | Ebbesen, F.H. Møller & Jul. Schäff. | | Russule timide | 3230 |
| Russula | putida | | Sarnari | | Russule rance | 3231 |
| Russula | queletii | | Fr. | | Russule de Quélet | 3232 |
| Russula | raoultii | | Quél. | | Russule de Raoult | 3233 |
| Russula | recondita | | Melera & Ostellari | | Russule mystérieuse | 3234 |
| Russula | rhodomarginata | | Sarnari | | Russule à marge rosée | 3235 |
| Russula | rhodomelaena | | Sarnari | Russula emeticella sensu R | Russule des chênes | 3236 |
| Russula | rhodopus | | Zvara | Russula rhodopoda | Russule à pied rouge | 3237 |
| Russula | risigallina | | (Batsch) Sacc. | Russula lutea - Russula vite | Russule caméléon | 3238 |
| Russula | robertii | | J. Blum | Russula sphagnophila sens | Russule des sphaignes | 3239 |
| Russula | romellii | | Maire | | Russule de Romell | 3240 |
| Russula | rosea | | Pers. | Russula lepida - Russula lin | Russule jolie | 3175 |
| Russula | roseipes | | Secr. ex Bres. | | Russule à pied rosé | 3241 |
| Russula | roseoaurantia | | Sarnari | | Russule rose orangée | 3242 |
| Russula | rubroalba | | (Singer) Romagn. | | Russule rouge et blanche | 3244 |
| Russula | rubroalba | var. albocretacea | Sarnari | | Variété pâle de Russula rubroalba | 3245 |
| Russula | rutila | | Romagn. ex Romagn. | | Russule rutilante | 3246 |
| Russula | rutila | fo. oxydabilis | Romagn. | | Russule rutilante réagissant au gaiac | 3247 |
| Russula | salmonicolor | | (Romagn.) Reum | Russula zvarae var. salmor | Russula zvarae de couleur saumon | 3292 |
| Russula | sanguinaria | | (Schumach.) Rau | Russula sanguinea | Russule sanguine | 3248 |
| Russula | sanguinaria | var. pseudorosacea | Maire | Russula sanguinea var. pse | Variété jaunissante de Russula sanguinea | 3249 |
| Russula | sardonias | | Fr. | Russula drimeia | Russule sardoine | 3250 |
| Russula | sardonias | fo. pseudorrhodopoda | Romagn. | | Variété rouge pourpre de Russula sardonias | 3251 |
| Russula | sardonias | fo. viridis | Singer | | Forme olivâtre de Russula sardonias | 3252 |
| Russula | sardonias | var. mellina | Melzer | Russula drimeia fo. melina | Russula sardonias à chapeau jaune de coing | 3253 |
| Russula | seperina | | Dupain | | Russule de la Sèvre | 3254 |
| Russula | sericatula | | Romagn. | Russula cupreoviolacea var | Russule soyeuse | 3255 |
| Russula | silvestris | | (Singer) Reumau | Russula emetica var. et fo. | Russule des forêts | 3256 |
| Russula | solaris | | Ferdinandson & Winge | | Russule soleil | 3257 |
| Russula | sororia | | Fr. | Russula pectinata var. sorc | Russule sœur | 3258 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---|------|
| Russula | stenotricha | | Romagn. | | Russule à poils cuticulaires étroits | 3259 |
| Russula | subaffinis | | Bidaud & P.A. M | Russula atrorubens var. su | Voisine de Russula atrorubens | 3260 |
| Russula | subazurea | | Bon | | Voisine de Russula azurea | 3261 |
| Russula | suberetorum | | Dagron | | Russule des chênes-lièges | 3262 |
| Russula | subfoetens | | W.G. Smith | Russula foetens var. subfo | Russula fausse-fétide | 3263 |
| Russula | sublevispora | | (Romagn.) Kùhner & Romagn. | | Russule grise des peupliers | 3264 |
| Russula | subrubens | | (J.E. Lange) Bon | Russula chamiteae | Russule des saules | 3265 |
| Russula | subterfurcata | | Romagn. | Russula basifucata sensu K | Russule à lames fourchues | 3266 |
| Russula | terenopus | | Romagn. | | Russule à pied fragile | 3267 |
| Russula | tinctipes | | J. Blum ex Bon | | Russule à pied teinté | 3268 |
| Russula | torulosa | | Bres. | | Russule robuste des pinèdes | 3269 |
| Russula | turci | | Bres. | | Russule cocardée | 3270 |
| Russula | tyrrhenica | | Sarnari | | Russule tyrrhénienne | 3271 |
| Russula | variegatula | | Romagn. | Russula variegata | Russule au chapeau panaché | 3272 |
| Russula | velenovskyi | | Melzer & Zvara | | Russule rouge cuivre | 3273 |
| Russula | versatilis | | Romagn. | | Russule versatile | 3275 |
| Russula | versicolor | | Jul. Schäff. | | Russule versicolore | 3276 |
| Russula | vesca | | Fr. | | Russule comestible | 3277 |
| Russula | vesca | fo. viridata | Singer | | Russule comestible à chapeau vert | 3278 |
| Russula | veternosa | | Fr. | Russula schiffneri - Russula | Russule languissante | 3279 |
| Russula | vinosa | | Lindblad | Russula decolorans var. ob | Russule vineuse | 3280 |
| Russula | vinosobrunnea | | (Bres.) Romagn. | Russula alutacea fo. vinosc | Russule brun vineux | 3281 |
| Russula | vinosobrunnea | var. paraolivacea | Bon | | Russule à chapeau olivâtre | 3282 |
| Russula | vinosopurpurea | | Jul. Schäff. | | Russule lie-de-vin | 3283 |
| Russula | violacea | | Quél. | | Russule violacée | 3284 |
| Russula | violeipes | | Quél. | Russula amoena var. violei | Russule à pied violet | 3285 |
| Russula | violeipes | fo. citrina | (Quél.) Romagn. | | Forme jaune de la Russule à pied violet | 3286 |
| Russula | virescens | | (Schaeff.) Fr. | | Russule verdoyante (Palomet) | 3287 |
| Russula | viscida | | Kudrna | | Russule visqueuse | 3288 |
| Russula | xerampelina | | (Schaeff.) Fr. | | Russule feuille morte | 3289 |
| Russula | zonatula | | Ebbesen & Jul. S | Russula rhodella sensu Sar | Russule jovencelle | 3290 |
| Russula | zvarae | | Velen. | | Russule rose tendre | 3291 |
| Rutstroemia | bulgarioides | | (P. Karst.) P. Kar | Piceomphale bulgarioides | Pézize des cônes d'épicéas | 3293 |
| Rutstroemia | firma | | (Pers.) P. Karst. | Peziza firma - Poculum firm | Pézize rigide | 3295 |
| Sagaranella | erosa | | (Fr.) V. Hofst., Cl | Collybia erosa - Lyophyllum | Tricholome à spores verruqueuses | 3296 |
| Sagaranella | gibberosa | | (Jul. Schäff.) V. H | Tephroclybe gibberosa - Co | Collybie à spores bossues | 3297 |
| Sagaranella | tesquorum | | (Fr.) Hofstetter & | Collybia tesquorum - Teph | Colybie des friches | 3298 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|--|------|
| Sagaranella | tylicolor | | (Fr.) V. Hofst., C | Lyophyllum tylicolor - Colly | Tephroclybe gris-brun | 3299 |
| Sarcodon | cyrneus | | Maas Geest. | | Sarcodon corse | 3301 |
| Sarcodon | imbricatus | | (L.) P. Karst. | Hydnum imbricatum | Hydne imbriqué | 3305 |
| Sarcodon | joeides | | (Pass.) Bataille | Sarcodon roseolus | Sarcodon à chair violette | 3306 |
| Sarcodon | leucopus | | (Pers.) Maas Geest. & Nannf. | | Sarcodon à pied blanc | 3308 |
| Sarcodon | regalis | | Maas Geest. | | Sarcodon royal | 3310 |
| Sarcodontia | spumea | | (Sowerby) Spirin | Spongipellis spumeus - Pol | Polypore cotonneux | 3314 |
| Sarcomyxa | serotina | | Pers. | Pleurotus serotinus - Panu | Pleurote tardif | 3315 |
| Sarcoscypha | austriaca | | (Beck) Boud. | Peziza austriaca | Pézize d'autriche | 3316 |
| Sarcoscypha | coccinea | | (Scop.) Lambott | Peziza coccinea | Pézize écarlate | 3317 |
| Sarcoscypha | jurana | | (Boud.) Baral | Sarcoscypha coccinea var. | Pézize du Jura | 3318 |
| Sarcosphaera | coronaria | | (Jacq.) Boud. | Sarcosphaera crassa - Sarco | Pézize couronnée | 3319 |
| Sarcosphaera | coronaria | var. nivea | (M.M. Moser) P | Sarcosphaera coronaria fo | Variété blanchâtre de Sarcosphaera coronaria | 3320 |
| Schizophyllum | amplum | | (Lév.) Nakasone | Auriculariopsis ampla | Fausse oreille de Judas | 3321 |
| Schizophyllum | commune | | Fr. | | Schizophylle commun | 3322 |
| Schizopora | paradoxa | | (Schrad.) Donk | Xylodon paradoxus | Schizopore paradoxal | 3323 |
| Scleroderma | areolatum | | Ehreb. | Scleroderma lypercoides | Scléroderme aréolé | 3325 |
| Scleroderma | bovista | | Fr. | Scleroderma verucosum va | Scléroderme ressemblant à une Boviste | 3326 |
| Scleroderma | citrinum | | Pers. | Scleroderma vulgare | Scléroderme commun | 3327 |
| Scleroderma | meridionale | | Demoulin & Malençon | | Scléroderme méridional | 3328 |
| Scleroderma | polyrhizum | | (Pers.) Pers. | Scleroderma geaster - Scler | Scléroderme en forme d'étoile | 3329 |
| Scleroderma | verrucosum | | Bull. | | Scléroderme verruqueux | 3330 |
| Scopuloides | rimosa | | (Cooke) Julich | Kneiffia rimosa - Peniophora rimosa | Phanerochaete rimosa | 3833 |
| Scutellinia | crinita | | (Bull.) Lambotte | Peziza crinita - Ciliaria crini | Pézize à longs poils | 3331 |
| Scutellinia | decipiens | | Le Gal | | | 3834 |
| Scutellinia | kerghuelensis | | (Berk.) Kuntze | Peziza kerguelensis - Ciliari | Pézize des îles Kerguelen | 3332 |
| Scutellinia | nigrohirtula | | (Svrček) Le Gal | Lachnea setosa var. nigrohirtula | | 3835 |
| Scutellinia | olivascens | | (Cooke) Kuntze | Ciliaria ampullacea | | 3836 |
| Scutellinia | pilatii | | (Velen.) Svrcek | | Pézize de Pilat | 3333 |
| Scutellinia | scutellata | | (L.) Lambotte | Ciliaria scutellata - Peziza s | Pézize en forme de coupe | 3334 |
| Scutigera | pes-caprae | | (Pers.) Bondart | Albatrellus pes-caprae - Pc | Polypore pied de chèvre | 3338 |
| Scytinostroma | hemidichophyticum | | Pouzar | | Corticium à structure subramifiée | 3341 |
| Sebacina | epigaea | | (Berk. & Broome | Sebacina livescens - Treme | Tremelle terrestre | 3342 |
| Sebacina | grisea | | Bres. | Exidiopsis grisea | Tremelle grise | 3343 |
| Sebacina | incrustans | | (Pers.) Tul. & C. | Sebacina laciniata - Sebac | Tremelle incrustante | 3344 |
| Serpula | himantioides | | (Fr.) Fr. | Gyrophana himantioides - | Mérule des bois | 3345 |
| Serpula | lacrymans (ou lacrimans) | | (Wulfen) J. Schr | Gyrophana lacrymans | Mérule des habitations | 3346 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|--------------------------|--|---|------|
| Simocybe | centunculus | | (Fr.) P. Karst. | Agrocybe centunculus - Ra | Simocybe olivâtre | 3347 |
| Simocybe | centunculus | var. obscura | (Romagn.) Singe | Simocybe obscura - Ramico | Variété brun noirâtre de Simocybe centunculus | 3348 |
| Simocybe | geraniolens | | (Clowez & Diaz) | Ramicola geraniolens | Simocybe à odeur de géranium | 3349 |
| Simocybe | haustellaris | | (Fr.) Fr. | Ramicola rubi - Simocybe r | Simocybe des marais | 3350 |
| Simocybe | quebecensis | | Redhead | | Simocybe du Québec | 3352 |
| Simocybe | sumptuosa | | (P.D. Orton) Sing | Agrocybe sumptuosa - Ran | Simocybe somptueux | 3353 |
| Singerocybe | adirondackensis | | (Peck) Zhu L. Yar | Clitocybe phaeophthalmaS | Clitocybe à odeur très désagréable | 3837 |
| Sistotrema | brinkmannii | | (Bres.) J. Erikss. | Grandinia brinkmannii | | 3838 |
| Sistotrema | confluens | | Pers. | | Corticium confluent | 3355 |
| Skeletocutis | amorpha | | (Fr.) Kot. & Pouz | Gloeoporus amorphus - Po | Tramète saumonée | 3356 |
| Skeletocutis | carneogrisea | | A. David | Bjerkandera mollusca - Polyporus molluscus | | 3839 |
| Skeletocutis | lilacina | | A. David & Jean Keller | | | 3840 |
| Skeletocutis | nivea | | (Jungh.) Jean Ke | Incrustoporia nivea - Polyp | Tramète blanc de neige | 3357 |
| Sowerbyella | imperialis | | (Peck) Korf | Peziza imperialis - Sowerby | Pézize impériale | 3358 |
| Sowerbyella | rhenana | | (Fuckel) J. Mora | Aleuria rhenana - Peziza rh | Pézize de Rhenanie | 3695 |
| Sparassis | brevipes | | Krombh. | Sparassis laminosa - Spara | Clavaire lamelleuse | 3359 |
| Sparassis | crispa | | (Wulfen) Fr. | Clavaria crispa - Sparassis r | Clavaire crépue | 3360 |
| Sparassis | minoensis | | Blanco-Dios & Zheng Wang | | Clavaire des pins maritimes | 3361 |
| Spathularia | alpestris | | (Rehm) Rahm | Spathularia flavida var. alp | Spathulaire alpestre | 3362 |
| Spathularia | flavida | | Pers. | | Spathulaire jaune | 3363 |
| Sphaerobolus | stellatus | | Tode | Carpobolus stellatus | Sphéroboule en étoile | 3364 |
| Sphagnurus | paluster | | (Peck) Redhead | Tephroclype palustris - Lyo | Tephroclype des sphaignes | 3365 |
| Spodocybe | collina | | (Velen.) Vizzini, | Clitocybe collina | Clitocybe des collines | 406 |
| Spodocybe | fontqueri | | R. Heim | Clitocybe fontqueri | Clitocybe petite souris | 411 |
| Spodocybe | trulliformis | | (Fr.) Vizzini. P. A | Clitocybe trulliformis | Clitocybe à chapeau infundibuliforme | 436 |
| Spongiporus | floriformis | | (Quél.) Zmitr. | Oligoporus floriformis - Leg | Polypore en forme de fleur | 2882 |
| Squamanita | fimbriata | | Gulden | | Amanite-à-écailles fimbriée | 3367 |
| Squamanita | odorata | | (Cool) Imbach | Armillaria odorata - Tricho | Amanite-à-écailles odorante | 3368 |
| Squamanita | paradoxa | | (A.H. Sm. & Sing | Dissoderma paradoxum - C | Amanite-à-écailles paradoxale | 3369 |
| Steccherinum | bourdotii | | Saliba & A. Davi | Irpex bourdotii | | 3841 |
| Steccherinum | fimbriatum | | (Pers.) J. Erikss. | Mycoleptodon fimbriatum | Corticium fimbrié | 3370 |
| Steccherinum | ochraceum | | Pers. | Mycoleptodon ochraceus - | Hydne ochracé | 3371 |
| Stemonitis | axifera | | (Bull.) T. Macbr. | | Stémonite à spores sublisses | 3372 |
| Stemonitis | fusca | | Roth | | Stémonite brun foncé | 3373 |
| Stephanospora | caroticolor | | (Berk.) Pat. | Octaviana caroticolor - Hyc | Fausse truffe couleur carotte | 3374 |
| Stereum | gausapatum | | (Fr.) Fr. | Haematostereum gausapa | Stérée à chapeau pelucheux | 3375 |
| Stereum | hirsutum | | (Wild.) Gray | | Stérée hirsute | 3376 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--|------|
| Stereum | insignitum | | Qué. | | Stérée remarquable | 3378 |
| Stereum | ochraceoflavum | | (Schw.) Ellis | Stereum striatum var. ochr | Stérée jaune ochracé | 3379 |
| Stereum | rugosum | | Pers. | Haematostereum rugosum | Stérée rugueux | 3380 |
| Stereum | sanguinolentum | | Fr. | Haematostereum sanguinc | Stérée rougissant | 3381 |
| Stereum | subtomentosum | | Pouzar | | Stérée subtamenteux | 3382 |
| Strobilomyces | strobilaceus | | (Scop.) Berk. | Strobilomyces floccopus - I | Bolet pomme de pin | 3383 |
| Strobilurus | esculentus | | (Wulfen) Singer | Collybia esculenta - Maras | Collybie des cônes d'épicéas | 3384 |
| Strobilurus | stephanocystis | | (Hora) Singer | Pseudohiatula stephanocy | Collybie des cônes de pin | 3385 |
| Strobilurus | tenacellus | | Pers. | Collybia tenacella - Maras | Collybie tenace | 3386 |
| Stropharia | aeruginosa | | (Curtis) Qué. | Psilocybe aeruginosa | Strophaire vert de gris | 3387 |
| Stropharia | aeruginosa | var. alpina | M. Lange | Stropharia alpina | Variété de la zone alpine du Strophaire vert de gris | 3388 |
| Stropharia | albonitens | | (Fr.) Qué. | Psilocybe albonitens | Strophaire blanc soyeux | 3389 |
| Stropharia | caerulea | | Kreisel | Stropharia cyanea sensu T | Strophaire bleutée | 3390 |
| Stropharia | halophila | | Pacioni | Psilocybe halophila | Strophaire des dunes | 3392 |
| Stropharia | hornemannii | | (Fr.) Fr. | Stropharia depilata - Psiloc | Strophaire de Hornemann | 3393 |
| Stropharia | inuncta | | (Fr.) Fr. | Psilocybe inuncta | Strophaire porphyre | 3394 |
| Stropharia | melanosperma | | Bull. | Geophylla melanosperma | Strophaire à lames noires | 3395 |
| Stropharia | pseudocyanea | | (Desm.) Morgan | Stropharia ochrocyanea - S | Strophaire blanc bleuté | 3396 |
| Stropharia | pseudocyanea | var. ochrocyanea | (Bon) P. Roux | | Variété jaune ochracé de Stropharia pseudocyanea | 3397 |
| Stropharia | pseudocyanea | var. procera | Kreisel | | Variété élevée de Stropharia pseudocyanea | 3398 |
| Stropharia | rugosoannulata | | Farl. ex Murrill | Psilocybe rugosoannulata | Strophaire à anneaux rugueux | 3399 |
| Stropharia | rugosoannulata | fo. Lutea | Hongo | | Forme jaune de Stropharia rugosoannulata | 3400 |
| Suillellus | caucasicus | | (Singer ex Alessi | Boletus caucasicus - Boletu | Bolet du Caucase | 3401 |
| Suillellus | comptus | | (Simonini) Vizzin | Boletus comptus | Bolet élégant | 3402 |
| Suillellus | luridus | | (Schaeff.) Murril | Boletus luridus | Bolet blafard | 3403 |
| Suillellus | luridus | fo. primulicolor | (Simonini) Blanc | Boletus luridus fo. primulic | Bolet blafard à chapeau jaune | 3404 |
| Suillellus | luridus | var. erythroteron | (Bezdek) Blanco | Boletus erythroteron | Bolet blafard à chair rouge | 3405 |
| Suillellus | luridus | var. lupiniformis | (J. Blum) Blanco | Boletus luridus var. lupinif | Bolet blafard à chapeau pâle | 3406 |
| Suillellus | luridus | var. queletiformis | (J. Blum) Blanco | Boletus luridus var. quelet | Bolet blafard à base du pied vineuse | 3407 |
| Suillellus | luridus | var. rubriceps | (Maire) Blanco-I | Boletus luridus var. rubrice | Bolet blafard à chapeau pourpre | 3408 |
| Suillellus | queletii | | (Schulzer) Vizzin | Boletus queletii | Bolet de Quélet | 3409 |
| Suillellus | gabretae | | (Pilát) Blanco-Di | Boletus gabretae | Bolet de "Silva Gabreta" (Bavière) | 268 |
| Suillus | bellinii | | (Inzenga) Kuntze | Boletus bellinii | Bolet de Bellini | 3411 |
| Suillus | bovinus | | (L.) Roussel | Boletus bovinus | Bolet des bouviers | 3412 |
| Suillus | bresadolae | | (Qué.) Gerhold | Boletus bresadolae - Suillu | Bolet de Bresadola | 3413 |
| Suillus | brunneolus | | (Kühner) Klofac | Suillus viscidus fo. brunne | Bolet brun des mélèzes | 3431 |
| Suillus | cavipes | | (Opat.) A.H. Sm. | Boletinus cavipes - Boletus | Bolet à pied creux | 3414 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------|-----------------------------|--|------------------------------------|------|
| Suillus | collinitus | | L. | Boletus collinitus - Suillus r | Bolet à base du pied rose | 3416 |
| Suillus | flavidus | | (Fr.) Fr. | Boletus flavidus | Bolet jaunâtre | 3418 |
| Suillus | granulatus | | (L.) Roussel | Boletus granulatus | Bolet granulé | 3419 |
| Suillus | grevillei | | (Klotzch) Singer | Suillus elegans - Boletus el | Bolet de Greville (Bolet élégant) | 3420 |
| Suillus | lakei | | (Murrill) A.H. Sm | Boletinus landkammeri - B | Bolet de Lake | 3421 |
| Suillus | luteus | | (L.) Roussel | Boletus luteus | Nonnette voilée | 3422 |
| Suillus | luteus | fo. albus | | Wasser & Soldatova | Forme blanche de la Nonette voilée | 3423 |
| Suillus | mediterraneensis | | (Jacq. & Blum) R | Boletus mediterraneensisB | Bolet méditerranéen | 3424 |
| Suillus | placidus | | (Bonorden) Sing | Boletus placidus - Gyrodor | Bolet placide | 3425 |
| Suillus | plorans | | (Rolland) Kuntze | Boletus plorans | Bolet larmoyant | 3426 |
| Suillus | sibiricus | | (Singer) Singer | Boletus sibiricus | Bolet de Sibérie | 3427 |
| Suillus | tridentinus | | (Bres.) Singer | Boletus tridentinus | Bolet du Trentin | 3428 |
| Suillus | variegatus | | (Sowerby) Richo | Boletus variegatus | Bolet moucheté | 3429 |
| Suillus | viscidus | | (L.) Roussel | Suillus aeruginascens - Bol | Bolet gris des mélèzes | 3430 |
| Szczepkamyces | campestris | | (Quél.) Zmitr. | Trametes campestris - Dich | Polypore champêtre | 1199 |
| Tapesia | fusca | | (Pers.) Fuckel | Mollisia fusca | | 3842 |
| Tapesia | lividofusca | | (Fr.) Rehm | Mollisia lividofusca | | 3843 |
| Taphrina | alni | | (Berkeley & Broome) Gjaerum | | Cloque des chatons de l'aulne | 3844 |
| Taphrina | deformans | | (Berkeley) Tulasne | | Cloque du pêcher | 3845 |
| Taphrina | pruni | | (Fuckel) Tulasne | | | 3846 |
| Tapinella | atrotomentosa | | (Batsch) Sutara | Paxillus atrotomentosus - S | Paxille à pied noir | 3432 |
| Tapinella | panuoides | | (Fr.) Fr. | Paxillus panuoides - Serpul | Paxille en forme de Panus | 3433 |
| Tarzetta | catinus | | Holmsk. | Pustularia catinus - Peziza | Pézize en forme de calice | 3435 |
| Tarzetta | cupularis | | (L.) Svrcek | Peziza cupularis - Pustulari | Pézize en forme de coupe | 3436 |
| Tectella | patellaris | | (Fr.) Murrill | Panellus patellaris | Tectelle en forme de patelle | 3437 |
| Tephrocyebe | ambusta | | (Fr.) Donk | Lyophyllum ambustum | Lyophylle des sols brûlés | 2351 |
| Tephrocyebe | anthracophyla | | (Lasch) P.D. Ort | Lyophyllum anthracophyly | Lyophylle des charbonnières | 2352 |
| Tephrocyebe | atrata | | (Fr.) Donk | Lyophyllum atratum - Lyop | Lyophylle noirâtre | 2353 |
| Tephrocyebe | mephitica | | (Fr.) M.M. Mose | Collybia mephitica - Lyoph | Collybie moisie | 3439 |
| Tephrocyebe | osmophora | | (E-J. Gilbert) Bor | Lyophyllum osmophorum | Lyophylle odorant | 2369 |
| Tephrocyebe | putida | | (P. Karst.) M.M. | Lyophyllum putidum - Coll | Collybie fétide | 3442 |
| Tephrocyebe | rancida | | (Fr.) Donk | Lyophyllum rancidumLyopl | Lyophylle rance | 2372 |
| Tephrocyebe | scobis | | (Métrod ex Con | Lyophyllum scobis | Lyophylle de la sciure | 2375 |
| Terana | caerulea | | (Lam.) Kuntze | Pulcherricium caeruleum - Corticium bleu | | 3443 |
| Thaxterogaster | caesiolamellatus | | (Bidaud) Niskan | Cortinarius caesiolamellatu | Cortinaire à lames bleutées | 620 |
| Thaxterogaster | causticus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius causticus | Cortinaire caustique | 637 |
| Thaxterogaster | collocandoides | | Reumaux | Cortinarius collocandoides | Proche de Cortinarius collocandus | 656 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|------------------------------|--|---|------|
| Thaxterogaster | croceocoeruleus | | (Pers.) Niskanen | Cortinarius croceocoeruleus | Cortinaire bleu jaunissant | 668 |
| Thaxterogaster | eburneus | | (Velen.) Niskanen | Cortinarius eburneus | Cortinaire ivoirin | 701 |
| Thaxterogaster | emollitus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius emollitus | Cortinaire à chair molle | 707 |
| Thaxterogaster | fulvo-ochraceus | | (Rob. Henry) Niskanen | Cortinarius fulvo-ochraceus | Cortinaire fauve ochracé | 739 |
| Thaxterogaster | galeobdolon | | (Melot) Niskanen | Cortinarius galeobdolon | Cortinaire à chapeau crème ochracé | 742 |
| Thaxterogaster | herpeticus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius herpeticus | Cortinaire à chapeau brun visqueux | 766 |
| Thaxterogaster | leucophanes | | (P. Karst.) Niskanen | Cortinarius leucophanes | Cortinaire blanchâtre | 802 |
| Thaxterogaster | lustratus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius lustratus | Cortinaire blanc pur | 808 |
| Thaxterogaster | magicus | | (Elchorn) Niskanen | Cortinarius magicus | Cortinaire magique | 810 |
| Thaxterogaster | microspermus | | (J.E.Lange) Niskanen | Cortinarius microspermus | Cortinaire à petites spores | 820 |
| Thaxterogaster | multiformis | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius multiformis | Cortinaire multiforme | 826 |
| Thaxterogaster | occidentalis | | (A.H. Sm.) Niskanen | Cortinarius occidentalis | Cortinaire des régions atlantiques | 842 |
| Thaxterogaster | ochroleucus | | (Schaeff.) Niskanen | Cortinarius ochroleucus | Cortinaire ocre blanc | 844 |
| Thaxterogaster | pluvialis | | (Kühner) Niskanen | Cortinarius pluvialis | Cortinaire de couleur mastic | 887 |
| Thaxterogaster | pluvius | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius pluvius | Cortinaire jaune doré | 888 |
| Thaxterogaster | porphyropus | | (Alb. & Schwein.) Niskanen | Cortinarius porphyropus | Cortinaire à pied pourpré | 895 |
| Thaxterogaster | purpurascens | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius eumarginatus - Cortinarius purpureus | Cortinaire purpurascents | 922 |
| Thaxterogaster | rufoallutus | | (Rob. Henry ex Fr.) Niskanen | Cortinarius rufoallutus | Cortinaire à chapeau orangé saturé | 942 |
| Thaxterogaster | scaurus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius scaurus | Cortinaire pied-bot | 960 |
| Thaxterogaster | subporphyropus | | (Pilát) Niskanen | Cortinarius subporphyropus | Proche de Cortinarius porphyropus | 1000 |
| Thaxterogaster | subpurpurascens | | (Batsch) Niskanen | Cortinarius subpurpurascens | Proche de Cortinarius purpurascens | 1001 |
| Thaxterogaster | talus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius ochropallidus - Cortinarius talus | Cortinaire à talon | 1010 |
| Thaxterogaster | turmalis | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius turmalis | Cortinaire grégaire | 1030 |
| Thaxterogaster | variegatus | | (Bres.) Niskanen | Cortinarius fulvidolilaceus - Cortinarius variegatus | Cortinaire panaché | 1038 |
| Thaxterogaster | vespertinus | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius variipes - Cortinarius vespertinus | Cortinaire du soir | 1047 |
| Thaxterogaster | vesterholtii | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius provencalis - Cortinarius vesterholtii | Cortinaire de Vesterholt | 1048 |
| Thaxterogaster | vibratilis | | (Fr.) Niskanen & | Cortinarius vibratilis | Cortinaire scintillant | 1049 |
| Thelephora | anthocephala | | (Bull.) Fr. | Phylacteria anthocephala | Théléphore à tête ramifiée | 3444 |
| Thelephora | caryophyllea | | (Schaeff.) Pers. | Phyllacteria caryophyllea | Théléphore à chapeau lacéré | 3445 |
| Thelephora | palmata | | (Scop.) Fr. | Phyllacteria palmata | Théléphore palmé | 3446 |
| Thelephora | penicillata | | (Pers.) Fr. | Thelephora mollissima - Phylacteria penicillata | Théléphore pénicillé | 3447 |
| Thelephora | terrestris | | Ehrh. | Phylacteria terrestris | Théléphore terrestre | 3448 |
| Tolyocladium | capitatum | | (Holmsk.) C.A. Oudemans | Cordyceps capitata | Cordyceps capité | 3449 |
| Tolyocladium | ophioglossoides | | (J.F. Gmel.) C.A. Oudemans | Cordyceps ophioglossoides | Cordyceps en forme de langue de serpent | 3450 |
| Trametes | cinnabarina | | (Jacq.) Fr. | Pycnoporus cinnabarinus - Trametes cinnabarina | Tramète rouge cinabre | 2961 |
| Trametes | gibbosa | | Pers. | Pseudotrametes gibbosa | Tramète bossue | 3451 |
| Trametes | hirsuta | | (Wulfen) Lloyd | Coriolus hirsutus | Tramète hirsute | 3452 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|--|------|
| Trametes | ochracea | | (Pers.) Gilb. & R | Trametes multicolor - Cori | Tramète à chapeau zoné | 3453 |
| Trametes | pubescens | | (Schumach.) Pilá | Coriolus pubescens - Tram | Tramète pubescente | 3454 |
| Trametes | suaveolens | | (L.) Fr. | Haploporus suaveolens | Tramète à odeur agréable | 3455 |
| Trametes | trogii | | Berk. | Funalia trogii - Cerrena tro | Tramète de Trog | 3456 |
| Trametes | versicolor | | (L.) Lloyd | Coriolus versicolor | Tramète versicolore | 3457 |
| Trechispora | farinacea | | (Pers.) Liberta | Hydnum farinaceum | | 3847 |
| Tremella | exigua | | Desm. | Tremella atrovirens | Trémelle exiguë | 3460 |
| Tremella | indecorata | | Sommerf. | Tremella moriformis | Trémelle non décorée | 3462 |
| Tremella | mesenterica | | (Schaeff.) Pers. | Tremella lutescens | Trémelle mésentérique | 3464 |
| Tremella | steidleri | | (Bres.) Bourdot | Tremella encephala var. st | Trémelle de Steidle | 3465 |
| Tremellodendropsis | tuberosa | | (Grev.) D.A. Cra | Thelephora contorta - The | Théléphore en forme de Clavaire | 3466 |
| Trichaptum | abietinum | | Velen. | Hirschioporus abietinus - T | Tramète du sapin | 3467 |
| Trichaptum | biforme | | (Fr.) Ryvarden | Trichaptum pergamenum - | Tramète parcheminée | 3468 |
| Trichaptum | fuscoviolaceum | | (Ehrenb.) Ryvarden | | Tramète brun sombre violacé | 3469 |
| Trichia | crateriformis | | GW Martin | Trichia decipiens var olivacea | | 3848 |
| Trichia | scabra | | Rostafinski | | | 3849 |
| Trichia | varia | | (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. | | Trichia variable | 3470 |
| Trichocybe | puberula | | (Kuyper) Vizzini | Clitocybe puberula | Clitocybe à chapeau velouté | 3471 |
| Trichoderma | alutaceum | | Jaklitsch | Podostroma alutaceum - H | Trichoderme alutacé | 3472 |
| Trichoderma | citrinum | | (Pers.) Jaklitsch, | Hypocrea citrina | Trichoderme citrin | 3473 |
| Trichoderma | pulvinatum | | (Fuckel) Jaklitsch | Hypocrea pulvinata - Hypo | Hypocrea pulviné | 1813 |
| Trichoglossum | hirsutum | | (Pers.) Boud. | Geoglossum hirsutum | Trichoglosse hirsute | 3474 |
| Tricholoma | acerbum | | (Bull.) Qué. | Tricholoma roseoacerbum | Tricholome acerbe | 3475 |
| Tricholoma | aestuans | | (Fr.) Fr. | | Tricholome brûlant | 3476 |
| Tricholoma | albidum | | Bon | | Tricholome blanc ivoire | 3477 |
| Tricholoma | albobrunneum | | (Pers.) P. Kumm | Tricholoma striatum | Tricholome brun et blanc | 3478 |
| Tricholoma | album | | (Schaeff.) P. Kumm. | | Tricholome blanc | 3479 |
| Tricholoma | apium | | Jul. Schäff. | | Tricholome à odeur de céleri | 3480 |
| Tricholoma | apium | var. helviodor | (Pilát & Svrcek) | Tricholoma helviodor | Tricholoma apium à chapeau brun olivâtre | 3481 |
| Tricholoma | argyraceum | | (Bull.) Gillet | Tricholoma sculpturatum v | Tricholome argenté | 3482 |
| Tricholoma | arvernense | | Bon | Tricholoma sejunctoidesTri | Tricholome d'Auvergne | 3483 |
| Tricholoma | atrosquamosum | | Sacc. | Tricholoma nigromarginatu | Tricholome à squames noires | 3484 |
| Tricholoma | aurantium | | (Schaeff.) Ricken | | Tricholome orangé | 3485 |
| Tricholoma | basirubens | | (Bon) Riva & Bo | Tricholoma orirubens var. | Tricholome à base du pied rouge | 3486 |
| Tricholoma | batschii | | Gulden ex Mort. | Tricholoma fracticum sens | Tricholome de Batsch | 3487 |
| Tricholoma | bonii | | Basso & Candusso | | Tricholome dédié à Marcel Bon | 3488 |
| Tricholoma | boreosulphurescens | | Mort. Chr. & Heilm.-Claus | | Tricholome boréal jaunissant | 3489 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---|------|
| Tricholoma | bresadolanum | | Cléménçon | | Tricholome de Bresadola | 3491 |
| Tricholoma | bryogenum | | Mort. Chr., Heilm.-Claus. & Vauras | | Tricholome des forêts moussues | 3492 |
| Tricholoma | caligatum | | (Viv.) Ricken | | Tricholome chaussé | 3493 |
| Tricholoma | cedretorum | | (Bon) Riva | Tricholoma tridentinum va | Tricholome des cèdres | 3494 |
| Tricholoma | cedretorum | var. ochraceopallidum | (Bon) Riva | Tricholoma tridentinum va | Forme ochracée de Tricholoma cedretorum | 3495 |
| Tricholoma | cedrorum | | Maire | | Tricholome des cédraies | 3496 |
| Tricholoma | chrysophyllum | | Riva, Hermosilla & J. Sanchez | | Tricholome à lames jaune d'or | 3497 |
| Tricholoma | cingulatum | | (Almfelt) Jacobashch | | Tricholome ceinturé | 3498 |
| Tricholoma | colossus | | (Fr.) Quél. | Megatracholoma colossus | Tricholome colosse | 3499 |
| Tricholoma | columbetta | | (Fr.) Fr. | Tricholoma impolatum | Tricholome columbette | 3500 |
| Tricholoma | concolor | | (Delile) P.-A. Mo | Tricholoma psammopus va | Tricholoma psammopus à grandes spores | 3537 |
| Tricholoma | dulciolens | | Kytov | | Tricholome à odeur agréable | 3503 |
| Tricholoma | equestre | | (L) P. Kumm. | Tricholoma auratum - Trich | Tricholome équestre | 3504 |
| Tricholoma | filamentosum | | (Alessio) Alessio | Tricholoma pardinum var. | Tricholome filamenteux | 3528 |
| Tricholoma | focale | | (Fr.) Ricken | Tricholoma robustum fo. f | Tricholome cravaté | 3505 |
| Tricholoma | focale | var. pseudocaligatum | Bon | | Variété proche du Tricholome caligatum | 3506 |
| Tricholoma | frondosae | | Kalamees & Sjts | Tricholoma equestre var. p | Tricholome des feuillus | 3507 |
| Tricholoma | fucatum | | (Fr.) P. Kumm. | | Tricholome fardé | 3508 |
| Tricholoma | fulvum | | DC. | Tricholoma flavobrunneum | Tricholome fauve | 3510 |
| Tricholoma | gausapatum | | (Fr.) Quél. | Tricholoma terreum var.ga | Tricholome pelucheux | 3511 |
| Tricholoma | guldeniae | | Mort. Chr. | | Tricholome de Gulden | 3512 |
| Tricholoma | hemisulphureum | | (Kühner ex Bon) | Tricholoma sulphureum va | Tricholome soufré des montagnes | 3513 |
| Tricholoma | ilkkae | | Mort. Chr. et al. | | | 3709 |
| Tricholoma | imbricatum | | (Fr.) Fr. | Tricholoma subimbricatum | Tricholome imbriqué | 3514 |
| Tricholoma | inamoenum | | (Fr.) Fr. | | Tricholome à odeur désagréable | 3515 |
| Tricholoma | inodermeum | | (Fr.) Sacc. | | Tricholome à chapeau fibrilleux | 3517 |
| Tricholoma | joachimii | | Bon & Riva | Tricholoma singeri | Tricholome de Joachim | 3518 |
| Tricholoma | josserandii | | Bon | Tricholoma sudum sensu J | Tricholome de Josserand | 3519 |
| Tricholoma | lascivum | | (Fr.) Fr. | | Tricholome gai | 3520 |
| Tricholoma | leucoterreum | | Mariotto & Turetta | | Tricholome blanchâtre | 3521 |
| Tricholoma | luridum | | (Schaeff.) P. Kumm. | | Tricholome blafard | 3522 |
| Tricholoma | matsutake | | (S. Ito & S. Imai) | Tricholoma nauseosumTric | Matsutaké | 3523 |
| Tricholoma | olivaceotinctum | | Mort. Chr. & Heilm.-Claus. | | Tricholome olivacé | 3525 |
| Tricholoma | orirubens | | Quél. | | Tricholome rougissant | 3526 |
| Tricholoma | pardinum | | (Pers.) Quél. | Tricholoma unguentatus | Tricholome tigré | 3527 |
| Tricholoma | pessundatum | | (Fr.) Fr. | | Tricholome à détruire | 3529 |
| Tricholoma | populinum | | J.E. Lange | Tricholoma pessundatum v | Tricholome des peupliers | 3530 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|--|------|
| Tricholoma | populinum | fo. campestre | (Fr.) Bon | | Forme champêtre de Tricholoma populinum | 3531 |
| Tricholoma | portentosum | | (Fr.) Fr. | | Tricholome prétentieux | 3532 |
| Tricholoma | portentosum | var. album | Jacquetant ex Bon | | Variété blanche de Tricholoma portentosum | 3533 |
| Tricholoma | portentosum | var. boutevillei | Bon | | Tricholome de Bouteville | 3534 |
| Tricholoma | portentosum | var. lugdunensium | Bon | | Variété lyonnaise de Tricholoma portentosum | 3535 |
| Tricholoma | psammopus | | (Kalchbr.) Quél. | | Tricholome à pied sablé | 3536 |
| Tricholoma | pseudonictitans | | Bon | Tricholoma fulvum var. pse | Tricholome luisant | 3538 |
| Tricholoma | quercetorum | | Contu, Lavorato & Simonini | | Tricholome des chênes | 3539 |
| Tricholoma | ramentaceum | | (Bull. ex Pers.) Ricken | | Tricholome à anneau cortiniforme | 3540 |
| Tricholoma | rapipes | | (Krombh.) Heilm | Tricholoma saponaceum v | Tricholome à pied radicant | 3524 |
| Tricholoma | robustum | | (Alb. & Schwein | Mastoleucomyces robustu | Tricholome robuste | 3541 |
| Tricholoma | rufenum | | Donati | | Tricholome des chênes | 3543 |
| Tricholoma | saponaceum | | (Fr.) P. Kumm. | | Tricholome à odeur de savon | 3544 |
| Tricholoma | saponaceum | fo. nympharum | Malençon | | Forme blanche de Tricholoma saponaceum | 3545 |
| Tricholoma | saponaceum | var. ardosiacum | Bres. | Tricholoma saponaceum fo | Variété à chapeau couleur ardoise | 3710 |
| Tricholoma | saponaceum | var. atrovirens | (Pers.) P. Karst. | | Variété à chapeau verdâtre fuligineux | 3546 |
| Tricholoma | saponaceum | var. squamosum | (Cooke) Rea | | Variété squamuleuse de Tricholoma saponaceum | 3547 |
| Tricholoma | scalpturatum | | (Fr.) Quél. | | Tricholome gravé | 3548 |
| Tricholoma | scalpturatum | fo. album | Hermosilla & Sanchez | | Forme blanche de Tricholoma scalpturatum | 3549 |
| Tricholoma | sciodes | | (Pers.) C. Martin | Tricholoma sciodelumTrich | Tricholome gris perfide | 3550 |
| Tricholoma | sciodes | var. virgatoides | Bon | | Sosie de Tricholoma virgatum | 3551 |
| Tricholoma | sculpturatum | | (Fr.) Quél. | | Tricholome jaunissant | 3850 |
| Tricholoma | sejunctum | | (Sowerby) Quél. | Tricholoma coryphaeumTri | Tricholome disjoint | 3552 |
| Tricholoma | sejunctum | var. coniferarum | Bon | | Tricholoma disjoint variété des conifère | 3553 |
| Tricholoma | stans | | (Fr.) Sacc. | Tricholoma pessundatum v | Tricholome élancé | 3555 |
| Tricholoma | stiparophyllum | | Fr. & N. Lund | Tricholoma pseudoalbum | Tricholome blanc des bouleaux | 3556 |
| Tricholoma | subglobisporum | | Bon | Tricholoma fucatum var. su | Tricholoma fucatum à spores subglobuleuses | 3509 |
| Tricholoma | sulphurescens | | Bres. | Tricholoma resplendens | Tricholome jaunissant | 3557 |
| Tricholoma | sulphureum | | Bull. | Tricholoma bufonium - Tric | Tricholome soufré | 3558 |
| Tricholoma | sulphureum | var. coronarium | (Pers.) Nuesch. | | Variété à odeur de seringa | 3559 |
| Tricholoma | sulphureum | var. rhodophylla | Metrod | | Variété à lames couleur saumon | 3560 |
| Tricholoma | terreum | | (Schaeff.) P.Kum | Tricholoma myomyces | Petit gris | 3561 |
| Tricholoma | tridentinum | | Singer | Tricholoma pessundatum s | Tricholome du Trentin | 3562 |
| Tricholoma | triste | | (Scop.) Quél. | Tricholoma terreum var. tr | Tricholome obscur | 3563 |
| Tricholoma | umbonatum | | (J.E. Lange) ex Cléménçon & Bon | | Tricholome omboné | 3564 |
| Tricholoma | ustale | | (Fr.) Fr. | | Tricholome brûlé | 3565 |
| Tricholoma | ustaloides | | Bon | | Sosie de Tricholome ustale | 3566 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|---|
| Tricholoma | ustaloides | var. aurantioides | Bon & Marchand | Variété orangée de Tricholoma ustaloides | 3567 |
| Tricholoma | vaccinum | | (Schaeff.) P. Kumm. | Tricholome couleur de vache | 3568 |
| Tricholoma | virgatum | | (Fr.) Fr. | Tricholome vergeté | 3569 |
| Tricholoma | viridifucatum | | Bon | Tricholome verdâtre | 3570 |
| Tricholoma | viridilutescens | | M.M. Moser | Tricholoma fucatum var. lu | Tricholome vert jaunâtre |
| Tricholomella | constricta | | (Fr.) Fr. | Calocybe constricta - Lyop | Calocybe étranglé |
| Tricholomopsis | decora | | (Fr.) Singer | Tricholoma decorum | Tricholome décoré |
| Tricholomopsis | flammula | | Métrod ex Holc | Tricholomopsis rutilans fo. | Tricholome flammule |
| Tricholomopsis | ornata | | (Fr.) Singer | Tricholoma ornatum | Tricholome orné |
| Tricholomopsis | rutilans | | (Schaeff.) Singer | Tricholoma rutilans | Tricholome rutilant |
| Tricholomopsis | rutilans | var. splendidissima | Bon | | Tricholomopsis rutilans variété resplendissante |
| Tricholomopsis | rutilans | var. variegata | (Scop.) Bon | Tricholoma variegata - Tric | Tricholome rutilant à chapeau panaché |
| Tricholomopsis | sulphureoides | | (Peck) Singer | Tricholomopsis osiliensis e | Tricholome jaune pâle |
| Trochila | ilicina | | (Nedes ex Fr.) Courtec. | | Trochile du houx |
| Truncospora | ochroleuca | | (Berk.) Pilát | Polyporus ochroleucus - Pe | Polypore des bruyères |
| Tubaria | confragosa | | (Fr.) Harmaja | Naucoria confragosa | Tubaire annelée |
| Tubaria | conspersa | | Pers. | Naucoria conspersa | Tubaire voilée |
| Tubaria | dispersa | | (Pers.) Singer | Tubaria autochtona - Nauc | Tubaire de l'aubépine |
| Tubaria | furfuracea | | (Pers.) Gillet | Naucoria furfuracea - Tuba | Tubaire furfuracée |
| Tubaria | romagnesiana | | Arnolds | Tubaria pellucida - Tubaria | Tubaire de Romagnesi |
| Tuber | aestivum | | Vittad | | Truffe d'été - Truffe de la saint-jean |
| Tuber | borchii | | Vittad. | Tuber albidum | Truffe de Borch |
| Tuber | brumale | | Vittad. | | Truffe d'hiver |
| Tuber | excavatum | | Vittadini | | |
| Tuber | himalayense | | Zhang & Minter | | Truffe de l'himalaya |
| Tuber | indicum | | Cooke & Massee | | Truffe chinoise |
| Tuber | magnatum | | Pico | | Truffe blanche du Piémont |
| Tuber | melanosporum | | Vittad. | | Truffe du Périgord |
| Tuber | mesentericum | | Vittadini | | |
| Tuber | oligospermum | | (Tul. & C. Tul.) T | Terfezia oligosperma - Tub | Truffes blanches et noires |
| Tuber | puberulum | | Berk. & Broome | | Truffe pubescente |
| Tuber | sphaerospermum | | (Malençon) P. R | Tuber borchii var. sphaero | Truffe en forme de boule |
| Tuber | uncinatum | | Chatin | Tuber blotii var. uncinatum | Truffe de Bourgogne |
| Tubercularia | berolinensis | | (Wollenw.) Ross | Dendrodochium berolinense | |
| Tubifera | ferruginosa | | (Batsch) J.F. Gm | Tubifera cylindrica - Stemonitis ferruginosa | |
| Tubulifera | arachnoidea | | Jacq. | | Tubifère ferrugineux |
| Tulasnella | violea | | (Quél.) Bourdot | Corticium violeum | Corticium violet |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------|
| Tulosesus | hiascens | | (Fr.) D. Wächt & | Coprinus hiascens - Coprin | Coprin à chapeau sillonné | 494 |
| Tulosesus | marculentus | | (Britzelm.) D. W | Coprinellus marculentusCc | Coprin à spores anguleuses | 3855 |
| Tulosesus | subdisseminatus | | (M. Lange) D. W | Coprinus subdisseminatusC | Coprin dispersés | 500 |
| Tulostoma | brumale | | Pers. | Tulostoma mammosum | Tulostome hivernal | 3599 |
| Tulostoma | fimbriatum | | Fr. | Tulostoma brumale var. fin | Tulostome fimbrié | 3600 |
| Tylopilus | felleus | | Bull. | Boletus felleus - Suillus fell | Bolet amer (Chicotin) | 3601 |
| Tylopilus | felleus | var. alutarius | (Fr.) P. Karst. | Boletus alutarius | Variété à chair douce de Tylopilus felleus | 3602 |
| Typhrasa | gossypina | | Bull. | Psathyrella gossypina | Psathyrelle à voile copieux | 3603 |
| Typhrasa | nanispora | | Orstadius, Hauskn. & E. Larss. | | Psathyrelle à petites spores | 3604 |
| Typhula | contorta | | (Holmsk.) Olaria | Clavaria contorta - Macrotr | Clavaire tordue | 2391 |
| Typhula | erythropus | | (Pers.) Fr. | Clavaria erythropus | Typhule à pied rouge | 3605 |
| Typhula | fistulosa | | (Holmsk.) Olaria | Clavaria fistulosa - Macrotr | Clavaire fistuleuse | 2392 |
| Typhula | juncea | | (Alb. & Schwein | Macrotyphula juncea - Cla | Typhule filiforme | 3606 |
| Tyromyces | chioneus | | (Fr.) P.Karst. | Leptoporus albellus - Leptc | Polypore blanc de neige | 3607 |
| Urnula | craterium | | (Schwein.) Fr. | Peziza craterium | Pézize noire en forme de coupe | 3608 |
| Vanderbylla | fraxinea | | (Bull.) D.A. Red | Polyporus fraxineus - Pere | Polypore des frênes | 2704 |
| Veluticeps | abietina | | (Pers.) Hjortstar | Stereum abietinum - Thele | Corticium du sapin | 3611 |
| Verpa | bohemica | | (Krombh.) J. Sch | Ptychoverpa bohemica - M | Verpe de Bohême | 3612 |
| Verpa | digitaliformis | | Pers. | Verpa conica | Verpe en forme de doigt ou dé | 3613 |
| Vexillomyces | atrovirens | | (Pers.) Baral. Qu | Coryne atrovirens | Coryne vert foncé | 1062 |
| Vibrissea | truncorum | | (Alb. & Schwein | Leotia truncorum | Leotie des troncs | 3614 |
| Vitreoporus | dichrous | | (Fr.) Zmitr. | Caloporus dichrous - Gloec | Polypore à deux couleurs | 1442 |
| Volvariella | aethiops | | A. Favre & Vialard | | Volvaire noirâtre | 3615 |
| Volvariella | bombycina | | (Schaeff.) Singer | Volvaria bombycina | Volvaire soyeuse | 3616 |
| Volvariella | bombycina | var. flaviceps | (Murrill) Schaeff. | | Volvariella bombycina à chapeau jaune | 3617 |
| Volvariella | caesiotincta | | P.D. Orton | | Volvaire verdâtre | 3618 |
| Volvariella | fuscidula | | (Bres.) M.M. Mc | Volvaria fuscidula | Volvaire à chapeau sombre | 3619 |
| Volvariella | hypopithys | | (Fr.) M.M. Mose | Volvaria hypopithys - Volva | Volvaire plumeuse | 3620 |
| Volvariella | media | | (Schumach.) Sin | Volvaria media | Volvaire de taille moyenne | 3621 |
| Volvariella | murinella | | (Qué.) Courtec. | Volvaria murinella | Volvaire gris souris | 3622 |
| Volvariella | pusilla | | Pers. | Volvariella parvula - Volvar | Volvaire naine | 3623 |
| Volvariella | surrecta | | (Knapp) Singer | Volvariella loveiana - Volva | Volvaire parasite | 3624 |
| Volvariella | taylorii | | (Berk) Singer | Volvaria taylorii - Volvariell | Volvaire de Taylor | 3625 |
| Volvariella | terrea | | Musumeci & Riva | | Volvaire terreuse | 3626 |
| Volvariella | volvacea | | (Bull.) Singer | Volvaria volvacea - Volvari | Volvaire cultivée | 3627 |
| Volvopluteus | gloiocephalus | | DC. | Volvariella gloiocephala - V | Volvaire à chapeau visqueux | 3628 |
| Vuilleminia | comedens | | (Nees) Maire | Corticium comedens | Corticium sur bois décortiqué | 3629 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|-----------------------------|--|------|
| Vuilleminia | coryli | | Boidin, Lanquetin & Gilles | | 3856 | |
| Xanthoporia | radiata | | (Sow.) Tura, Zmi | Inonotus radiatus - Polypo | Polypore de l'aulne | 3630 |
| Xenasma | pruinatum | | (Pat.) Donk | Corticium pruinatum | Peniophora pruinosa | 3857 |
| Xenasmatella | vaga | | (Fr.) Stalpers | Trechispora vaga - Phlebia | Corticium mal défini | 3631 |
| Xerocomellus | chrysenteron | | (Bull.) Sutara | Boletus chrysenteron - Xer | Bolet à chair jaune | 3632 |
| Xerocomellus | cisalpinus | | (Simonini et al.) | Boletus cisalpinus - Xeroco | Bolet cisalpin | 3633 |
| Xerocomellus | porosporus | | (Imler ex Bon & | Xerocomus porosporus - B | Bolet à chapeau fissuré | 3634 |
| Xerocomellus | pruinatus | | (Fr. & Hök) Suta | Xerocomus pruinatus | Bolet pruineux | 3635 |
| Xerocomellus | redeuilhii | | A.F.S. Taylor et d | Xerocomus dryophilus sen | Bolet de Redeuilh | 3636 |
| Xerocomellus | ripariellus | | (Redeuilh) Sutar | Xerocomus ripariellus - Bo | Bolet des rives | 3637 |
| Xerocomellus | sarnarii | | Simonini, Vizini & U. Eberh. | | Bolet de Sarnari | 3638 |
| Xerocomus | chrysonemus | | A.E. Hills & A.F.S. Taylor | | Bolet à mycélium jaune d'or | 3639 |
| Xerocomus | ferrugineus | | (Schaeff.) Bon | Boletus ferrugineus - Bolet | Bolet ferrugineux | 3640 |
| Xerocomus | intermedius | | (Smith & Thiers) | Xerocomus fennicus - Xero | Bolet intermédiaire | 3641 |
| Xerocomus | marekii | | (Sutara & Skala) | Boletus marekii - Xerocom | Bolet rouge à spores tronquées | 3642 |
| Xerocomus | silwoodensis | | A.E. Hills, U. Eberhardt & A.F.S. Taylor | | Xerocomus des peupliers | 3643 |
| Xerocomus | subtomentosus | | (L.) Qué. | Xerocomus xanthus - Bolet | Bolet subtomenteux | 3644 |
| Xeromphalina | brunneola | | O.K. Mill. | | Xéromphaline de couleur sombre | 3645 |
| Xeromphalina | campanella | | (Batsch) Kühner | Omphalina campanella | Omphale clochette | 3646 |
| Xeromphalina | campanelloides | | Redhead | | Sosie de Xeromphaline campanella | 3647 |
| Xeromphalina | cauticalis | | (Sow.) Kühner & | Xeromphalina fulvobulbill | Xéromphaline amère | 3648 |
| Xeromphalina | cornui | | Qué. | Omphalina cornui | Omphale clochette brune | 3649 |
| Xeromphalina | fraxinophila | | A.H. Smith | Xeromphalina fellea var. fr | Xéromphaline des frênes | 3650 |
| Xerophorus | olivascens | | (Boud.) Bon | Calistosporium olivascens | Callistospore olivacé | 293 |
| Xerula | melanotricha | | Dörfelt | Oudemansiella badia sensu | Collybie à longs poils noirs | 3651 |
| Xerula | pudens | | Pers. | Oudemansiella longipes - C | Collybie à poils ras | 3652 |
| Xylaria | carpophila | | (Pers.) Fr. | | Xylaie des faînes de hêtres | 3654 |
| Xylaria | filiformis | | (Alb. & Schwein.) Fr. | | Xylaie filiforme | 3655 |
| Xylaria | hypoxylon | | (L.) Grev. | | Xylaie du bois | 3656 |
| Xylaria | longipes | | Nitschke | | Xylaie à long pied | 3657 |
| Xylaria | oxyacanthae | | Tul. & C. Tul. | | Xylaie des fruits de l'aubépine | 3658 |
| Xylaria | polymorpha | | Pers. | | Xylaie polymorphe | 3659 |
| Xylobolus | frustulatus | | (Pers.) P. Karst. | Stereum frustulosum - The | Stérée craquelée-aréolée | 3660 |
| Xylobolus | illudens | | (Berk.) Boidin | Xylobolus illudens - Haema | Stérée de l'Eucalyptus | 3377 |
| Xylobolus | subpileatus | | (Berk. & M.A. Cu | Stereum subpileatum - Ste | Stérée à chapeau incomplet | 3661 |
| Xylodon | asper | | (Fr.) Hjortstam & | Hyphodontia aspera | Grandinia aspera - Odontia irregularis | 3858 |
| Xylodon | nespori | | (Bres.) Hjortstar | Grandinia nespори - Hypho | Xylodon de Nesper | 3662 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------|
| Xylodon | radula | | (Fr.) Tura, Zmitr. | Hyphoderma radula - Badi | Xylodon à longues dents | 3663 |
| Xylodon | raduloides | | (Pers.) Hallenb. | Schizopora radula - Polypo | Schizopore à pores irpicoïdes | 3324 |
| Zhuliangomyces | illinitus | | (Fr.) Redhead 20 | Limacella illinita | Limacelle baveuse | 2325 |