

SORTIE D'ÉTUDE SUR LE TERRAIN le 5 novembre 2022

Responsable de sortie Claudine Vicherd accompagnée de Suzanne Chardon et Cécile Martinet pour la partie mycologique.

Les Chambarans étant dépourvus d'une poussée fongique suffisamment importante, nous avons décidé de visiter un autre lieu plus humide. Notre choix s'est arrêté sur le Bois du Marais situé le long du Guiers Mort, près de Entre Deux Guiers.



Malgré une température un peu frisquette, 17 personnes dont une dizaine de nouveaux adhérents ont été surpris par la quantité de champignons que recelait ce bois.



Quant au pique-nique au Col de Porte et la détermination des espèces trouvées, nous les avons faits à l'abri, car la neige et la pluie étaient au rendez-vous... sans avoir été invitées !

Ci-joint une liste non-exhaustive des champignons identifiés :

Ordre des Boletales

... Bolets au sens large : **champignons à tubes terminés par des pores « détachables »**

- Vus : *Boletus edulis* (Cèpe de Bordeaux), *Neoboletus erythropus* (Bolet à pied rouge, chapeau brun, sec et velouté, pores rouges, pied jaune ponctué de rouge, chair bleuissant), *Imleria badia* (Bolet bai, chapeau brun et sec, pores jaunes, pied jaune à chinures brunes, chair bleuissant), *Xerocomellus chrysenteron* (Bolet à chair jaune, chapeau brun et sec, pores jaunes, pied jaune et ponctué de rouge en bas, chair bleuissant)

Nb : Dans les *Boletales*, on trouve aussi des champignons à lames

Ordres des Russulales : champignons à lames

... *Russula* (russules) : **chair cassante, absence de lait, sporée blanche à ocre**

- Vus : *Russula ochroleuca* (Russule ocre et blanche), *Russula cavipes* (Russule à pied creux)

... *Lactarius* (lactaires) : **chair cassante, présence de lait, sporée blanche à ocre**

- Vus : *Lactarius salmonicolor* (Lactaire du sapin ou Lactaire saumon, chapeau orange, lait orange, pousse sous les sapins), *Lactarius intermedius* (chapeau jaune zoné, pied peu scrobiculé, lait blanc puis jaune), *Lactarius camphoratus* (Lactaire à odeur de chicorée)

Ordre des Agaricales : champignons principalement à lames (mais pas que), chair fibreuse

... *Tricholoma* (tricholomes) : **sporée blanche, lames souvent échancrées***

- Vu : *Tricholoma sulphureum* (Tricholome soufré, à odeur de « gaz d'éclairage »)

... *Laccaria* (laccaires) : **sporée blanche, lames épaisses ou espacées, lames souvent adnées***

- Vu : *Laccaria laccata*, *Laccaria amethystina*

... *Clitocybe* (clitocybes) : **sporée blanche, lames souvent décurrentes*, lames souvent fines et serrées**

- Vus : *Clitocybe nebularis* (Clitocybe nébuleux), *Clitocybe phyllophila* (Clitocybe des feuilles ou Faux meunier)

... *Clitopilus* (clitopiles) : **sporée rose, lames pentues à décurrentes**

- Vu : *Clitopilus prunulus* (Meunier, attention aux confusions avec les clitocybes « blancs »)

... *Pluteus* (plutées) : **sporée rose, lignicole, lames libres**

- Vu : *Pluteus cervinus* (Plutée couleur de cerf)

... *Cortinarius* (cortinaires) : **sporée brune**

- Vu : *Cortinarius varius*

... *Hypholoma* (hypholomes) : **sporée sombre noirâtre**

- Vu : *Hypholoma fasciculare* (Hypholome en touffes)

... *Lycoperdon* (lycoperdons) : **hyménium interne, spores enfermées à l'intérieur d'un « globe » (champignons en forme de boule)**

- Vu : *Lycoperdon perlatum* (Vesse de loup perlée)

Ordre des Cantharellales :

... *Craterellus* (chanterelles) : **champignons à plis**

- Vus : *Craterellus cinereus* (Chanterelle cendrée), *Craterellus tubaeformis* (Chanterelle en tube)

... *Hydnum* (hydnes) : **champignons à aiguillons**

- Vu : *Hydnum repandum* (Pied-de-Mouton)

... *Clavulina* (clavaires) : **champignons ramifiés**

- Vu : *Clavulina cristata* (Clavaire à crêtes)

Ordre des Polyporales : champignons à tubes terminés par des pores « non détachables »

... Polypores au sens large : champignons à chair coriace lignicoles

- Vu : *Fomitopsis pinicola* (Polypore marginé, épais, dessus foncé au centre et blanc à jaune à la marge), *Trametes versicolor*, *Daedaleopsis tricolor*, *Climacocystis borealis*, *Merulius tremellosus*

Ordre des Tremellales et des Auriculariales (ancienne classe des *Phragmobasidiomycetes*) : champignons consistance gélatineux ou cartilagineuse

... (*Phaeo*)tremella (trémelles)

- Vu : *Phaeotremella foliacea* (Trémelle foliacée)

... *Pseudohydnum* (faux-hydnes)

- Vu : *Pseudohydnum gelatinosum* (Faux-hydne gélatineux ou Trémelle gélatineuse, seule espèce gélatineuse à posséder des aiguillons en Europe)

Ordre des Pezizales (appartient aux ascomycètes**) :

... *Helvella* (helvelles) : champignons lobés

- Vu : *Helvella crispa*, *Helvella elastica*

... *Otidea* (otidea) : champignons possédant une fente sur toute sa hauteur

- Vu : *Otidea onotica* (Oreille de lièvre), *Otidea umbrina*

Ordre des Helotiales (appartient aux ascomycètes**) :

- Vu : *Leotia lubrica* (Léotie lubrique, consistance molle, attention aux confusions avec les chanterelles en tube)


Ordre des Xylariales (appartient aux ascomycètes**) :

- Vu : *Xylaria hypoxylon* (Xylaïre du bois)

Ordre des Hypocreales (appartient aux ascomycètes**) :

- Vu : *Tolypocladium capitatum* (Cordyceps capité)

*Insertion des lames



Source : <https://www.mycodb.fr/glossaire.php>

**Les ascomycètes sont des champignons dont les spores sont à l'intérieur de tubes, appelés des « asques ». D'un point de vue macroscopique, ils regroupent les morilles, les helvelles, les gyromitres, les truffes, les pezizes, et beaucoup d'autres champignons aux formes « bizarres ». L'hyménium est de consistance lisse.



Neoboletus erythropus



Xerocomellus chrysenteron



Tricholoma sulphureum



Clitocybe nebularis



Hypholoma fasciculare



Leotia lubrica



Fomitopsis pinicola



Trametes versicolor

Photos Charles Rougier