


SORTIE DU 30 AOUT 2025
Col de Porte, (alt. 1300 m. env) Chartreuse

Mycologue : Cécile MARTINET
Responsable : Élisabeth MEDAGLIA


Liste des participants :

BONNET MACHOT Gilles
CELLIER Emmanuel
CHARDON Suzanne
CHEN Chi-Wei
DEBROUX Jean et Michèle
DEROBERT Renée et Bernard
GIBIER Didier
HATEM Lucie
LAFOND Mathieu
LARTIGUE Jean-François et Sylvie
MAFTOUL Mme/M Joseph et Marcela
MARTINET Cécile
MEDAGLIA Élisabeth
ROUGIER Charles
TREFOUEL Floriane
VICHERD Claudine
~~DEVIATIAROVA Nastasia~~

20 participants, 1 désistement



Profil altimétrique



 **2h 6 min** 1.7 km
↗ 187.2 m ↘ -178.9 m

Lieu de départ : Le Banchet, Col de Porte

Conditions : Journée brumeuse, pas de pluie.

Chemin parfois difficilement praticable à cause des débris laissés après un récent élagage et abattage d'arbres.



Synthèse de la sortie : Trouvailles supérieures aux attentes, 62 espèces déterminées.

Nous remercions Cécile MARTINET et les autres mycologues présents qui ont enrichi la sortie avec leurs explications.

Merci à Robert GARCIN pour son travail au microscope nécessaire pour la détermination de certaines espèces et à Jean DEBROUX, Michelle DEBROUX et Charles ROUGIER pour avoir contribué aux approfondissements microscopiques.

Merci à Didier GIBIER pour la rédaction de la liste détaillée des champignons et les vérifications dans la nomenclature actuelle des espèces.

Photos diverses :













*



Inventaire des 62 espèces récoltées et déterminées :

GENRE	ESPECE	VARIETE	LIEU_DIT	ALT	LAT	LON	DETER_TERRAIN1	DETER_TERRAIN2	DETER_MICROSCOPE
Amanita	excelsa var	spissa	Col de Porte	1300	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Artomyces	pyxidatus		Col de Porte	1301	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Apioperdon	pyriforme		Col de Porte	1302	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Calocera	viscosa		Col de Porte	1303	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Cantharellus	cibarius		Col de Porte	1304	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Cerioporus	varius		Col de Porte	1305	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Clavariadelphus	truncatus		Col de Porte	1306	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Craterellus	cornucopioides		Col de Porte	1307	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Craterellus	tubaeformis		Col de Porte	1308	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Dacrymyces	stillatus		Col de Porte	1309	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Fomitopsis	pinicola		Col de Porte	1310	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Ganoderma	carnosum		Col de Porte	1311	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Geastrum	fimbriatum		Col de Porte	1312	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Gloeophyllum	odoratum		Col de Porte	1313	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Guepinia	helvelloides		Col de Porte	1314	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Gymnopilus	penetrans		Col de Porte	1315	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Gymnopus	confluens		Col de Porte	1316	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Hydnellum	peckii		Col de Porte	1317	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Hydnum	repandum		Col de Porte	1318	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Hygrophoropsis	aurantiaca		Col de Porte	1319	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Hygrophorus	discoxanthus		Col de Porte	1320	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Hypholoma	capnoides		Col de Porte	1321	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Hypholoma	fasciculare		Col de Porte	1322	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Infundibulicybe	costata		Col de Porte	1323	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Infundibulicybe	gibba		Col de Porte	1324	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Inocybe	fastigiata		Col de Porte	1325	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Inocybe	geophylla	lilacina	Col de Porte	1326	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Laccaria	laccata		Col de Porte	1327	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Lactarius	fuliginosus		Col de Porte	1328	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Lactarius	intermedius		Col de Porte	1329	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Lactarius	pallidus		Col de Porte	1330	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Lactarius	salmonicolor		Col de Porte	1331	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Laeticutis	cristata		Col de Porte	1332	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Leucocybe	connata		Col de Porte	1333	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Lycoperdon	perlatum		Col de Porte	1334	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Lyophyllum	decastes		Col de Porte	1335	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Marasmiellus	ramealis		Col de Porte	1336	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Marasmius	cohaerens		Col de Porte	1337	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Marasmius	rotula		Col de Porte	1338	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Megacollybia	platyphylla		Col de Porte	1339	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Mycena	leptocephala		Col de Porte	1340	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Neoboletus	erythropus	junquiellus	Col de Porte	1341	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Paragymnopus	perforans		Col de Porte	1342	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Pholiota	flammans		Col de Porte	1343	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Pleurotus	dryinus		Col de Porte	1344	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Pseudohydnum	gelatinosum		Col de Porte	1345	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Pyrrhulomyces	astragalinus		Col de Porte	1346	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Ramaria	flava		Col de Porte	1347	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Rubroboletus	rubrosanguineus		Col de Porte	1348	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Russula	anthracina	insipida	Col de Porte	1349	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Russula	chloroides		Col de Porte	1350	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Russula	cyanoxantha		Col de Porte	1351	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Russula	fellea		Col de Porte	1352	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Russula	laurocerasi		Col de Porte	1353	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Russula	nobilis		Col de Porte	1354	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Russula	olivacea		Col de Porte	1355	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Russula	olivacea	pavonina	Col de Porte	1356	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Russula	viscida		Col de Porte	1357	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Sarcodon	imbricatus		Col de Porte	1358	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Suillellus	caucasicus		Col de Porte	1359	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	RG
Suillellus	luridus		Col de Porte	1360	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	
Xerula	pudens		Col de Porte	1361	45.30346N	5.768251E	Cécile Martinet	JD, CR	

A suivre :

Description détaillée des espèces trouvées, tableau de Didier GIBIER

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Dacrymycetes**
 Ord.. **Dacrymycetales**
 Fam. **Dacrymycetaceae**



Comestibilité **Toxique**



Calocera viscosa

Chartreuse Rompue

Calocera viscosa Pers.

301

Syn. : .

Nom français : **Calocère visqueuse**

Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères.

Odeur : Inodore.

En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé.

Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Dacrymycetes**
 Ord.. **Dacrymycetales**
 Fam. **Dacrymycetaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Dacrymyces stillatus

Chartreuse Rompue

Dacrymyces stillatus Nees

1162

Syn. : **Dacrymyces deliquescens**

Nom français : **Dacrymyces en forme de bouton**

Habitat : Sur troncs décortiqués de feuillus ou de conifères.

Odeur : Inodore.

Espèces gélatineuses, lentiformes, pulvinées.

Fixation au substrat par un pied rudimentaire.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Auriculariales**
 Fam. **Exidiaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Guepinia helvelloides

Chartreuse Rompue

Guepinia helvelloides (DC.) Fr.

1469

Syn. : **Tremiscus helvelloides**

Nom français : **Guépinie en helvelle**

Habitat : Au bord des chemins, dans les fossés humides.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Fructifications orangées, en forme de spatule.

Chair gélatineuse, tremblotante.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Auriculariales**
 Fam. **Exidiaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Pseudohydnum gelatinosum

Chartreuse Rompue

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.

2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**

Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.

Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Internet

Cerioporus leptcephalus (Jacq.) Zmitr. & Kovalenko

332

Syn. : **Melanopus varius - Polyporus leptcephalus**
Polyporus varius - Cerioporus varius

Nom français : **Polypore variable**

Habitat : Sur bois mort de feuillus (surtout sur hêtres).

Odeur : Nulle.

Chapeau +/- réniforme, lisse, ocre-jaune, mince.

Pores petits, arrondis - Stipe excentré, à base noirâtre.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Chartreuse Rompue

Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst.

1395

Syn. : **Ungulina marginata**

Nom français : **Polypore marginé**

Habitat : Saprophyte des conifères, parfois des feuillus.

Odeur : Acide, forte, évoquant l'odeur des poulaillers.

Fructifications dimidiées à surface brun-rouge.

L'un des polypores les plus communs.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Ganodermataceae**

**Ganoderma carnosum** Pat.

1426

Syn. :

Nom français : **Ganoderme charnu**

Habitat : En montagne, sur souches de conifères.

Odeur : Agréable de polypore.

Chapeau de couleur brun-rouge ou acajou.

Stipe bosselé, sinueux, vernissé - Pores arrondis.

Comestibilité **Sans intérêt**

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gloeophyllales**
 Fam. **Gloeophyllaceae**

**Gloeophyllum odoratum** (Wulfen) Imazeki

1457

Syn. : **Trametes odorata**Nom français : **Tramète odorante**

Habitat : Sur bois mort d'épicéas, surtout en montagne.

Odeur : Forte d'anis, de vanille ou de pain d'épices.

Chapeau jaune orangé noduleux, feutré.

Trame noircissant en présence de NH3.

Comestibilité **Sans intérêt**

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Albatrellaceae**

**Laeticutis cristata** (Schaeff.) Audet

3336

Syn. : **Albatrellus cristatus** - **Polyporus cristatus**
Scutiger cristatusNom français : **Polypore à chapeau craquelé**

Habitat : Sous conifères de montagne, surtout sous épicéas.

Odeur : Désagréable.

Chapeaux multiples, brunâtres à vert jaunâtre.

Stipe court, excentrique - Pores petits, arrondis.

Comestibilité **Sans intérêt**

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Amylostereaceae**

**Artomyces pyxidatus** (Pers. ex Fr.) Jülich

219

Syn. : **Clavaria pyxidata**Nom français : **Clavaire en chandeliers**

Habitat : Sur bois pourrissant de feuillus.

Odeur : Insignifiante.

Sous forme de buissons ramifiés assez charnus.

Rameaux terminés par une petite coupe ornée de pics.

Comestibilité **Sans intérêt**

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Cantharellales**
 Fam. **Hydnaceae**

**Cantharellus cibarius** Fr.

320

Syn. :

Nom français : **Chanterelle ou girolle**

Habitat : Surtout sous feuillus, en terrain non calcaire.

Odeur : Forte et agréable, fruitée, d'abricot.

Chapeau jaune vif uniforme - Chair blanche ou jaune.

Plis décourants, fourchus, jaune orangé.

Comestibilité **Comestible**

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gomphales**
 Fam. **Clavariadelphaceae**

**Clavariadelphus truncatus** Donk

379

Syn. : **Clavaria truncata**Nom français : **Clavaire tronquée**

Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain calcaire.

Odeur : Faible, non caractéristique.

En forme de massue tronquée au sommet.

Hyménium lisse à ridé, jaune ochracé - Saveur douce.

Comestibilité **Sans intérêt**

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Cantharellales**
 Fam. **Hydnaceae**

Comestibilité **Comestible****Craterellus cornucopioides** Pers.

1066

Syn. : **Cantharellus cornucopioides**
Craterellus cornucopioides var. flavicans et var. roseus

Nom français : **Trompette des morts**

Habitat : Surtout sous feuillus, dans les hêtraies calcaires.

Odeur : Forte, de charcuterie en train de sécher.

Chapeau en profond entonnoir, noir puis grisâtre.

Hyménium sublisce, non plissé - Stipe creux.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Cantharellales**
 Fam. **Hydnaceae**

Comestibilité **Comestible****Craterellus tubaeformis** Bull.

1080

Syn. : **Cantharellus tubaeformis**Nom français : **Chanterelle en tube**

Habitat : Surtout sous conifères, dans les mousses humides.

Odeur : Agréable, fruitée.

Chapeau en entonnoir, brun gris à brun ochracé.

Plis bien formés, fourchus, gris-brun - Stipe brun-jaune.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Thelephorales**
 Fam. **Bankeraceae**

Comestibilité **Sans intérêt****Hydnellum peckii** Banker

1662

Syn. :

Nom français : **Hydne de Peck**

Habitat : Sur litières d'aiguilles, en montagne.

Odeur : Faiblement acidulée.

Chapeau orné de gouttes rouges par l'humidité.

Aiguillons blancs et saveur très âcre, piquante.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Cantharellales**
 Fam. **Hydnaceae**

Comestibilité **Comestible****Hydnum repandum** L.

1672

Syn. :

Nom français : **Pied-de-mouton**

Habitat : Sous feuillus et conifères, jusqu'en montagne.

Odeur : Agréable, fruitée.

Chapeau de jaune pâle à couleur abricot.

Aiguillons très serrés, fragiles, faciles à séparer.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gomphales**
 Fam. **Gomphaceae**

Comestibilité **Sans intérêt****Ramaria flava** (Schaeff.) Quél.

2969

Syn. : **Clavaria flava**Nom français : **Clavaire jaune**

Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres.

Odeur : Un peu aromatique ou herbacée.

Tronc court, épais, trapu, jaune en haut, blanc en bas.

Rameaux jaune pâle, à extrémités jaune verdâtre.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Thelephorales**
 Fam. **Bankeraceae**

Comestibilité **Comestible****Sarcodon imbricatus** (L.) P. Karst.

3305

Syn. : **Hydnum imbricatum**Nom français : **Hydne imbriqué**

Habitat : Sous conifères de montagne, surtout sous épicéas.

Odeur : Légèrement épicée.

Grande espèce à chapeau grossièrement écaillé.

Hyménium constitué d'aiguillons subulés et fragiles.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Hygrophoraceae**



Hygrophorus discoxanthus Charles Rougier

Comestibilité **Sans intérêt**

Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea

1745

Syn. : **Hygrophorus chrysaspis**

Nom français : **Hygrophore à disque jaune**

Habitat : Dans les hêtraies, sur sols calcaires.

Odeur : De peau de mandarine à anisée.

Chapeau visqueux, lisse, blanc à crème ochracé.

Brunissement roux vif à partir de la marge.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Pleurotaceae**



Pleurotus dryinus Internet

Comestibilité **Sans intérêt**

Pleurotus dryinus Pers.

2822

Syn. : **Pleurotus corticatus**

Nom français : **Pleurote des chênes**

Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sur troncs vivants.

Odeur : Subnulle.

Chapeau flabelliforme à réniforme, blanchâtre.

Lames fortement décurrentes, blanches à crème.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Incertae sedis**



Infundibulicybe costata Internet

Comestibilité **Comestible**

Infundibulicybe costata (Kühner & Romagn.) Harmaja

1833

Syn. : **Clitocybe costata**

Nom français : **Clitocybe côtelé**

Habitat : Sous conifères calcicoles.

Odeur : Cyanique.

Chapeau infundibuliforme, café au lait, chamois.

Stipe fibrilleux, tomenteux de blanc à la base.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Tricholomataceae**



Comestibilité **Comestible**

Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja

1835

Syn. : **Clitocybe gibba**

Nom français : **Clitocybe bossu**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Cyanique.

Chapeau en entonnoir, beige à beige ochracé.

Lames très décurrentes, crème - Stipe blanchâtre.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Incertae sedis**



TOXIQUE



Leucocybe connata Rougier Charles

Comestibilité **Toxique**

Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini et al.

2300

Syn. : **Clitocybe connata - Lyophyllum connatum**

Nom français : **Clitocybe en touffes**

Habitat : Au bord des chemins, en troupes et fasciculés.

Odeur : Herbacée, de petits pois ou de haricots.

Chapeau blanc pur ou glacé, soyeux, marbré de gris.

Chair blanche, cartilagineuse - Pieds blancs, connés.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Hydnangiaceae**



Comestibilité **Comestible**



Laccaria laccata Charles Rougier

Laccaria laccata (Scop.) Cooke

1989

Syn. :

Nom français : **Laccaire laqué**

Habitat : Dans les bois, au bord des chemins.

Odeur : Insignifiante.

Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisce.

Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.

16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Lyophyllaceae Comestibilité Comestible		Lyophyllum decastes (Fr.) Singer 2357 Syn. : Lyophyllum aggregatum - Tricholoma aggregatum Nom français : Lyophylle agrégé Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les endroits herbeux. Odeur : Nulle. Chapeau noisette à brun-gris - Chair élastique. Stipes blanchâtres, aggrégés - Saveur douce.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen 1495 Syn. : Collybia confluens - Marasmius confluens Gymnopus confluens Nom français : Collybie en touffe Habitat : En rond de sorcière, ubiquiste. Odeur : Légèrement cyanique. Chapeau beige mastic à brun pâle, hygrophane. Lames très serrées, étroites et pied pruneux.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira 1515 Syn. : Micromphale perforans Gymnopus perforans Nom français : Marasme perforant Habitat : Sur des aiguilles de conifères, surtout d'épicéas. Odeur : De chou pourri ou d'eau croupie. Chapeau de 0,5 -1,5 cm, beige rosâtre, strié-ridé. Lames crème, espacées - Stipe velouté, vite noirâtre.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Collybiopsis ramealis (Bull.) Millsp. 2396 Syn. : Marasmius ramealis - Micromphale ramealis Marasmiellus ramealis Nom français : Marasme des rameaux Habitat : Sur brindilles ou branches de feuillus au sol. Odeur : Nulle. Reconnaissable à sa poussée en troupes sur brindilles et à ses lames serrées, non collariées.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Marasmiaceae Comestibilité Sans intérêt		Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Qué. 2404 Syn. : Nom français : Marasme à pied corné Habitat : Sur feuilles ou branches tombées. Odeur : Nulle. Stipe luisant, brun-rouge foncé à la base, corné, dur. Lames ornées de spinules pointues (microscope).
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Marasmiaceae Comestibilité Sans intérêt		Marasmius rotula Fr. 2414 Syn. : Nom français : Marasme petite roue Habitat : Greffé sur rameaux et branchettes de feuillus au sol. Odeur : Insignifiante. Chapeau blanchâtre, cannelé en forme de parachute. Lames espacées, rattachées au stipe à un collarium.

17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Marasmiaceae  Comestibilité Sans intérêt	Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar2419 Syn. : Collybia platyphylla - Gymnopus platyphyllus Oudemansiella platyphylla Nom français : Collybie à larges lamelles Habitat : Surtout sur souches ou racines de feuillus. Odeur : Terreuse à herbacée. Chapeau rayé-vergeté - Lames larges et espacées. Présence de rhizoïdes à la base du stipe.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Physalacriaceae  Comestibilité Sans intérêt	Xerula pudens (Pers.) Singer3652 Syn. : Oudemansiella longipes - Collybia longipes Oudemansiella pudens Nom français : Collybie à poils ras Habitat : Sur racines enfouies de feuillus, sur les souches. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun chocolat - Stipe droit, renflé-fusiforme, radicant, entièrement velouté - Lames blanches.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  Comestibilité Sans intérêt	Mycena leptcephala (Pers.) Gillet2517 Syn. : Mycena alcalina sensu auct. Nom français : Mycène à chair mince Habitat : Dans les aiguilles de conifères ou sur terre. Odeur : Nitreuse, parfois fugace. Chapeau gris-brun, hygrophane, fortement strié. Stipe fragile, blanc jaunâtre, hérissé-laineux à la base.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae   Comestibilité A rejeter	Amanita excelsa (Fr.) Neville & Poumarat118 var. spissa Syn. : Amanita spissa Nom français : Amanite épaisse Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Nette odeur raphanoïde. Port robuste - Chapeau gris à brun - Volve friable. Anneau juponnant, strié - Stipe à bulbe napiforme.
25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae   Comestibilité Toxique	Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav.1875 Syn. : Inocybe rimosa - Inocybe fastigiata Nom français : Inocybe fastigié Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères. Odeur : Spermatique. Chapeau paille à jaunâtre, nettement vergeté. Lames ventruées, jaunâtre olivacé - Stipe blanchâtre.
25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae   Comestibilité Toxique	Inocybe geophylla (Peck) Gillet1888 var. lilacina Syn. : Nom français : Inocybe geophylla de couleur lilas Habitat : Surtout sous feuillus. Odeur : Spermatique. Chapeau violet ou lilas puis pâissant. Stipe lilacin pâle ou +/- lavé de jaune.

26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Toxique		Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill 1484 Syn. : Gymnopilus stabilis - Gymnopilus hybridus Nom français : Gymnopile pénétrant Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus. Odeur : Légèrement herbacée. Chapeau feutré, jaune orangé - Cortine persistante. Lames jaunâtres et saveur amère.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Comestible		Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. 1794 Syn. : Geophila capnoides Nom français : Hypholome à lames enfumées Habitat : Sur souches et racines de conifères. Odeur : Plutôt agréable. En touffes, à chapeaux lisses et jaune olive. Lames lavées de lilas puis noirâtres - Saveur douce.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Toxique		Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 1800 Syn. : Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis Nom français : Hypholome en touffes Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères. Odeur : De polypore. En touffes sur les souches ou le bois mort. Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Pyrrhulomyces astragalinus (Fr.) E.J. Tian & Matheny 2768 Syn. : Flammula astragalina - Pholiota astragalina Nom français : Pholiote rouge brique Habitat : Fasciculés sur bois pourrissant de conifères. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau ochracé abricot à briqueté ou rose orangé. Stipe élancé, souvent flexueux - Saveur amère.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. 2773 Syn. : Nom français : Pholiote jaune feu Habitat : Fasciculé sur bois mort de conifères. Odeur : Faiblement aromatique. Chapeau jaune citrin à fauve orangé, squamuleux. Stipe jaune sulfurin, revêtu de squames retroussées.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula anthracina Romagn. 3076 var. insipida Syn. : Nom français : Variété douce de Russula anthracina Habitat : Sous feuillus. Odeur : Faible, un peu fruitée. Diffère du type par sa saveur douce, même dans les lames.

27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Sans intérêt		Russula chloroides (Krombh.) Bres. 3101 Syn. : Nom français : Russule à lames glauques Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres. Odeur : Forte, fruitée. Grande espèce à chapeau blanc, sec, déprimé. Lames étroites - Stipe parfois zoné de vert au sommet.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Comestible		Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 3113 Syn. : Nom français : Russule charbonnière Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres. Odeur : Faible, non significative. Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce. Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula fellea (Fr.) Fr. 3133 Syn. : Nom français : Russule de fiel Habitat : Généralement sous hêtres. Odeur : De compote de pommes. Entièrement de couleur ochracée à ocre - Saveur âcre. Lames blanc crème nuancé d'ochracé
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula grata Britzelm 3174 Syn. : Russula laurocerasi - Russula fragrans Russula foetens var. laurocerasi Nom français : Russule à odeur de laurier cerise Habitat : Surtout sous feuillus. Odeur : D'amandes amères, de laurier cerise. Chapeau ochracé roussâtre - Saveur âcre. Lames crème blanchâtre +/- tachées de roussâtre.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Toxique		Russula nobilis Velen. 3189 Syn. : Russula fageticola - Russula mairei Nom français : Russule de Maire Habitat : Sous hêtres, en terrain acide. Odeur : De coco. Port robuste et chapeau ferme, d'un beau rouge. Lames blanc glauque - Saveur âcre - Stipe blanc pur.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Mortel		Russula olivacea (Schaeff.) Fr. 3207 Syn. : Nom français : Russule olivacée Habitat : En montagne, sous hêtres et épicéas. Odeur : Faible, un peu fruitée. Chapeau vert à brun ou jaune, sec - Saveur douce. Phénol = pourpre - Lames jaunes.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula viscida Kudrna

3288

Syn. :

Nom français : **Russule visqueuse**

Habitat : Sous conifères, dans les pessières calcicoles.

Odeur : Complexe, fruitée, un peu raphanoïde.

Chapeau de rouge sombre à pourpre-violet.

Saveur âcre - Lames crème - Stipe brunissant.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Toxique**



Russula olivacea (Bres.) Reumaux var. pavonina

3208

Syn. :

Nom français : **Russule olivacée à chapeau rouge pourpre**

Habitat : En montagne, sous hêtres (Fagus) et épicéas (Picea).

Odeur : Faible, un peu fruitée.

Diffère du type par sa grande taille et par la couleur rouge pourpre de son chapeau.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr.

2046

Syn. :

Nom français : **Lactaire fuligineux**

Habitat : Sous feuillus et résineux (surtout Picea).

Odeur : Subnulle.

Chapeau brun-bistre, velouté, non zoné.

Latex blanc, virant lentement au rose saumoné.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Toxique**



Lactarius intermedius Krombh ex Berk. & Broome

2055

Syn. :

Nom français : **Lactaire des sapins**

Habitat : Dans les hêtraies-sapinières.

Odeur : Subnulle ou un peu fruitée.

Chapeau jaune ochracé, non ou peu zoné.

Latex peu abondant, jaunissant à l'air, âcre.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Lactarius pallidus Pers.

2070

Syn. :

Nom français : **Lactaire pâle**

Habitat : Uniquement sous hêtres, surtout sur sol calcaire.

Odeur : Subnulle.

Chapeau charnu, crème carné à beige pâle.

Latex peu abondant, immuable, un peu âcre.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Comestible**



Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair

2091

Syn. :

Nom français : **Lactaire couleur saumon**

Habitat : Sous les sapins.

Odeur : Faible, légèrement savonneuse.

Chapeau jaune orangé, sans traces de vert.

Latex abondant, rouge carotte, subimmuable.

29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn 2601 Syn. : Boletus erythropus Nom français : Bolet à pied rouge Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne. Odeur : +/- fruitée. Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté. Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Toxique		Rubroboletus rubrosanguineus (Cheype) Kuan Z. & Zhu L.Y. 3044 Syn. : Boletus rubrosanguineus - Suillellus rubrosanguineus Boletus purpureus var. rubrosanguineus Nom français : Bolet rouge sang Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain calcaire. Odeur : Non caractéristique. Chapeau gris café au lait, rouge sang à la détersion. Stipe trapu, à réseau dense, rouge sang.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Sans intérêt		Suillellus caucasicus (Singer ex Alessio) Blanco-Dios 3401 Syn. : Boletus caucasicus - Boletus luridus var. caucasicus Nom français : Bolet du Caucase Habitat : Dans les bois de feuillus, surtout sous hêtres. Odeur : Non caractéristique. Chapeau briqueté, fibrilleux. Pores rouges +/- sombres. Chair jaune sous les tubes - Stipe réticulé - lode = 0
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Toxique		Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill 3403 Syn. : Boletus luridus Nom français : Bolet blafard Habitat : Sous conifères et feuillus, de la plaine à la montagne. Odeur : Agréable, fruitée. Chapeau ocre-orange, feutré - Pores orangés. Stipe orné d'un réseau saillant, à mailles allongées.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Neoboletus junquilleus (Qué.) Gelardi, Simonini et Vizzini 2136 Syn. : Neoboletus erythropus var. junquilleus Sutorius junquilleus Nom français : Bolet jonquille Habitat : Sous feuillus (Hêtres et chênes) et épicéas. Odeur : +/- fruitée. Grande espèce à chapeau jaunâtre et pores jaunes Stipe jaune, lisse - Bleuissement très intense partout.
30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Hygrophoropsidaceae Comestibilité Comestible		Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire 1728 Syn. : Nom français : Fausse chanterelle Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gastrales Fam. Geastraceae Comestibilité Sans intérêt		Geastrum fimbriatum Fr. 1432 Syn. : Geastrum sessile Nom français : Geastre sessile Habitat : Sous conifères parmi les aiguilles. Odeur : Inodore. Carpophore divisé en 6 ou 7 lanières. Endopériidium globuleux, papyracé, gris-ocre.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Comestible		Lycoperdon perlatum Pers. 2345 Syn. : Lycoperdon gemmatum Nom français : Vesse de loup perlée Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles. Odeur : Non caractéristique. Fructifications blanches recouvertes d'aiguillons. Gléba blanche puis olive - Stipe conique.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Lycoperdaceae Comestibilité Sans intérêt		Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini 2456 Syn. : Lycoperdon pyriforme - Morganella pyriformis Nom français : Vesse de loup en forme de poire Habitat : En touffes sur souches ou bois mort de conifères. Odeur : Plutôt désagréable. Fructifications piriforme - Exopériidium brun-jaune. Gléba blanche puis verdâtre - Subgléba blanche.