


Sortie SMD du 14 septembre 2025

Freydières (Belledonne)

Cette sortie s'est déroulée sous la responsabilité de Jean Debroux et Nathalie Szylowicz. Vingt-sept adhérents étaient présents au point de rendez-vous, près du restaurant La Gelinotte à Freydières :

Isabelle Anselmet, Jean-Marc Belleville, Camille Blanchin, Valentine Bolcato, Gilles Bonnet-Machot, Annick et Alain Bucci, Emmanuel Cellier, Suzanne Chardon, Chi-Wei Chen, Marie-Christine Cordeau, Michèle et Jean Debroux, Zite Duclot, Marcella et Joseph Maftoul, Mathieu Lafond, Sylvie et Jean-François Lartigue, Cécile Martinet, François Pierre, Jacqueline et Patrick Quesney, Charles Rougier, Nathalie Szylowicz, Floriane Trefouel, Claudine Vicherd. A noter deux personnes excusées pour un problème mécanique de dernière minute, Kelly Garlick et Mérédith Lacuve.



Après un court trajet jusqu'au lieu nommé Ferpeyret sur la carte, nous avons démarré la prospection dans les bois entourant la prairie. Très rapidement nous avons pu constater une poussée fongique significative, après des semaines de disette. Une centaine d'espèces différentes ont en effet été récoltées durant les deux heures consacrées à la recherche. Comme d'habitude, elles ont été réparties sur table, et classées suivant le type d'hyménium et la couleur de la sporée. Un inventaire aussi exhaustif que possible a alors été entrepris sur le vif. Compte tenu du grand nombre d'espèces, il est vite apparu que la démarche ne pourrait satisfaire certains des participants les moins aguerris. Une autre table a alors été alimentée de quelques espèces que nos mycologues ont pris soin de décrire plus en détail.

Enfin, pour ne pas déroger à la tradition, le groupe s'est réuni pour partager, dans la bonne humeur, force victuailles et boissons !

Merci à Jean-Debroux, Cécile Martinet, Gilles Bonnet-Machot et Charles Rougier pour l'encadrement sur le terrain et le travail de détermination qui s'est prolongé jusqu'au lundi soir, au local de la SMD. Merci également à Claudine Vicherd pour l'organisation et les photos, à François Pierre pour le rapport, ainsi qu'à Didier Gibier pour la fourniture des fiches descriptives présentées à la suite.



09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
 Clas. **Pezizomycetes**
 Ord.. **Pezizales**
 Fam. **Discinaceae**



Comestibilité **Mortel**



Paragyromitra infula (Schaeff.) X.C. Wang & W.Y. Zhuang

1525

Syn. : **Gyromitra infula - Physomitra infula**

Nom français : **Gyromitre en turban**

Habitat : En montagne, sur bois dégradé, en automne.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau cannelle, mitriforme, formé de 2 à 4 lobes.
 Stipe très irrégulier, creux, à chair cassante.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
 Clas. **Pezizomycetes**
 Ord.. **Pezizales**
 Fam. **Otideaaceae**



Comestibilité **Toxique**



Otidea onotica (Pers.) Fuckel

2647

Syn. : **Aleuria onotica - Peziza onotica**
Aleuria abietina - Peziza abietina - Otidea abietina

Nom français : **Otidée en forme d'oreille d'âne**

Habitat : Sur terre nue, sous conifères et feuillus.

Odeur : Nulle.

Fructification fendue sur le côté, en forme d'oreille.
 Hyménium orange pâle et pied velouté de blanc.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Dacrymycetes**
 Ord.. **Dacrymycetales**
 Fam. **Dacrymycetaceae**



Comestibilité **Toxique**



Calocera viscosa Pers.

301

Syn. : .

Nom français : **Calocère visqueuse**

Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères.

Odeur : Inodore.

En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé.
 Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Auriculariales**
 Fam. **Exidiaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Pseudohydnum gelatinosum (Scoop.) P. Karst.

2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**

Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.

Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Albatrellaceae**

Comestibilité **Comestible**



Albatrellus citrinus Ryman

70

Syn. :

Nom français : **Polypore citrin**

Habitat : Sous conifères en montagne.

Odeur : Non caractéristique.

Espèce à chair tendre, chapeau blanchâtre au début puis jaune citrin.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Meruliaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spirin & Zmitr.

230

Syn. : **Peniophora sanguinea - Phanerochaete sanguinea**

Nom français : **Péniophore sanguin**

Habitat : Sur bois mort de conifères.

Odeur : Nulle.

Fructifications pelliculaires vertes tachées de rouge et teintant le bois.

14/09/2025 Sortie Freydières

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Cerioporus leptcephalus (Jacq.) Zmitr. & Kovalenko

332

Syn. : **Melanopus varius - Polyporus leptcephalus**
Polyporus varius - Cerioporus varius

Nom français : **Polypore variable**

Habitat : Sur bois mort de feuillus (surtout sur hêtres).

Odeur : Nulle.

Chapeau +/- réniforme, lisse, ocre-jaune, mince.

Pores petits, arrondis - Stipe excentré, à base noirâtre.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst.

1395

Syn. : **Ungulina marginata**

Nom français : **Polypore marginé**

Habitat : Saprophyte des conifères, parfois des feuillus.

Odeur : Acide, forte, évoquant l'odeur des poulaillers.

Fructifications dimidiées à surface brun-rouge.

L'un des polypores les plus communs.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gloeophyllales**
 Fam. **Gloeophyllaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

1457

Syn. : **Trametes odorata**

Nom français : **Tramète odorante**

Habitat : Sur bois mort d'épicéas, surtout en montagne.

Odeur : Forte d'anis, de vanille ou de pain d'épices.

Chapeau jaune orangé noduleux, feutré.

Trame noircissant en présence de NH3.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Cyanosporus caesius (Schrad.) Mc Ginty

2617

Syn. : **Postia caesia - oligoporus caesius - Tyromyces caesius**

Nom français : **Polypore bleuté des conifères**

Habitat : Surtout sur bois de conifères.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Fructifications molles, tachées de bleu, porées.

Pores arrondis, souvent déchirés (3 pores / mm).

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Stereaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Stereum hirsutum (Wild.) Gray

3376

Syn. :

Nom français : **Stérée hirsute**

Habitat : En colonies, sur bois mort de feuillus.

Odeur : Nulle.

Fructifications résupinées à étalées-réfléchies.

Surface fertile hirsute - Hyménium lisse, brun-orange.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Trametes gibbosa Pers.

3451

Syn. : **Pseudotrametes gibbosa**

Nom français : **Tramète bossue**

Habitat : Saprophyte, sur troncs ou souches de feuillus.

Odeur : Nulle.

Reconnaissable à ses pores allongés radialement et à sa bosse près du point d'insertion.

14/09/2025 Sortie Freydières

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Fomitopsidaceae



Comestibilité Sans intérêt

Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. et al.

2814

Syn. : **Piptoporus betulinus - Polyporus betulinus**

Nom français : **Polypore du bouleau**

Habitat : Sur bois mort de bouleau.

Odeur : Agréable, acidulée.

Chapeau arrondi, pulviné, gris-beige alutacé.

Hyménium finement poré, blanchâtre - Stipe absent.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Amylostereaceae



Comestibilité Sans intérêt

Artomyces pyxidatus (Pers. ex Fr.) Jülich

219

Syn. : **Clavaria pyxidata**

Nom français : **Clavaire en chandeliers**

Habitat : Sur bois pourrissant de feuillus.

Odeur : Insignifiante.

Sous forme de buissons ramifiés assez charnus.

Rameaux terminés par une petite coupe ornée de pics.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae



Comestibilité Comestible



Cantharellus cibarius Fr.

320

Syn. :

Nom français : **Chanterelle ou girole**

Habitat : Surtout sous feuillus, en terrain non calcaire.

Odeur : Forte et agréable, fruitée, d'abricot.

Chapeau jaune vif uniforme - Chair blanche ou jaune.

Plis décurrents, fourchus, jaune orangé.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae



Comestibilité Sans intérêt

Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt.

388

Syn. : **Clavaria rugosa**

Nom français : **Clavaire rugueuse**

Habitat : Dans les forêts de conifères, en bordure des chemins.

Odeur : Insignifiante.

Fructifications simples, à extrémités obtuses, digitées.

Hyménium rugueux, sillonné ou plissé, blanc à crème.

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae



Comestibilité Toxique



Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead et al.

171

Syn. : **Clitocybe clavipes**

Nom français : **Clitocybe à pied en massue**

Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain acide.

Odeur : De jasmin ou fruitée, de fleur de mandarinier.

Stipe à base claviforme, spongieuse - Chapeau beige. Lames décurrentes, blanches puis crème jaunâtre.

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae



Comestibilité Toxique



Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.

421

Syn. : **Lepista nebularis**

Nom français : **Clitocybe nébuleux**

Habitat : En lisière des bois, souvent en ronds de sorcières.

Odeur : Farino-spermatique, plutôt désagréable.

Chapeau gris prumineux - Lames adnées-décurrentes.

Stipe en massue, grisâtre pâle - Chair épaisse, grise.

14/09/2025 Sortie Freydières

14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Incertae sedis  Comestibilité Comestible	Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 424 Syn. : Nom français : Clitocybe anisé Habitat : Feuillus et conifères, surtout en montagne. Odeur : Fortement anisée. Chapeau vert à gris-vert, parfois décoloré, mat. Lames adnées, blanches ou verdâtres - Saveur douce.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Comestible	Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja 1835 Syn. : Clitocybe gibba Nom français : Clitocybe bossu Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Cyanique. Chapeau en entonnoir, beige à beige ochracé. Lames très décurrentes, crème - Stipe blanchâtre.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hydnangiaceae  Comestibilité Comestible	Laccaria amethystina Cooke 1987 Syn. : Laccaria amethystea Laccaria laccata var. amethystina Nom français : Laccaire améthyste Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères. Odeur : Légèrement fruitée. Chapeau hygrophane, violet foncé puis pâlisant. Lames très espacées, larges, épaisses, violettes.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hydnangiaceae  Comestibilité Comestible	Laccaria laccata (Scop.) Cooke 1989 Syn. : Nom français : Laccaire laqué Habitat : Dans les bois, au bord des chemins. Odeur : Insignifiante. Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisce. Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Sans intérêt	Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 3544 Syn. : Tricholoma boudieri Nom français : Tricholome à odeur de savon Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne. Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide. Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante. Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Comestible	Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini 2669 Syn. : Lepista flaccida - Clitocybe inversa Lepista inversa Nom français : Clitocybe inversé des feuillus Habitat : Sous feuillus. Odeur : Fongique. Chapeau toujours en entonnoir, fauve vif, flasque. Lames arquées-décurrentes, non brunissantes.

17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Connopus acervatus (Fr.) Fr. 466 Syn. : Gymnopus acervatus - Collybia acervata Nom français : Collybie en touffes Habitat : En touffes sur troncs de conifères. Odeur : Faible, légèrement fongique. Chapeau brun rosâtre à beige ochracé - Lames crème. Stipe lisse, glabre, brun-rouge à gris-brun.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen 1495 Syn. : Collybia confluens - Marasmius confluens Gymnopus confluens Nom français : Collybie en touffe Habitat : En rond de sorcière, ubiquiste. Odeur : Légèrement cyanique. Chapeau beige mastic à brun pâle, hygrophane. Lames très serrées, étroites et pied pruneux.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira 1515 Syn. : Micromphale perforans - Marasmiellus perforans Gymnopus perforans Nom français : Marasme perforant Habitat : Sur des aiguilles de conifères, surtout d'épicéas. Odeur : De chou pourri ou d'eau croupie. Chapeau de 0,5 -1,5 cm, beige rosâtre, strié-ridé. Lames crème, espacées - Stipe velouté, vite noirâtre.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen 1516 Syn. : Collybia peronata - Marasmius peronatus Gymnopus peronatus - Marasmiellus peronatus Nom français : Collybie guêtrée Habitat : Surtout sur feuilles de hêtres qu'il agglomère. Odeur : De vinaigre à la trituration. Chapeau brun noisette, hygrophane. Lames échancrées, d'un beau jaune de buis.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Marasmiaceae Comestibilité Comestible		Marasmius oreades (Bolton) Fr. 2413 Syn. : Nom français : Marasme des oréades Habitat : Au printemps, dans les prés, pâturages et alpages. Odeur : Fortement cyanique. Chapeau brun-roux, hygrophane et lames espacées. Dans l'herbe en ronds de sorcières.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité A rejeter		Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox 3001 Syn. : Collybia butyracea Nom français : Collybie beurrée Habitat : Sous feuillus et conifères, sur sols pauvres. Odeur : Agréable, épicée. Chapeau brun-rouge, hygrophane, gras au toucher. Stipe clavé, farci ou creux, concolore, fibrilleux, sec.

18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Marasmiaceae Comestibilité Sans intérêt	 Mycena flavoalbaCharles Roussel	Atheniella flavoalba (Fr.) Redhead et al.232 Syn. : Mycena flavoalba Nom français : Mycène jaune pâle Habitat : Dans les pelouses, les lieux herbeux ou moussus. Odeur : Faible. Chapeau strié, jaune pâle à blanchâtre - Saveur douce. Lames adnées, blanches - Stipe pruneux au sommet.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt	 Mycena aurantiomarginataCharles Roussel	Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quéf.2472 Syn. : Mycena elegans sensu auct. Nom français : Mycène à arête des lames orange Habitat : Dans les forêts de conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-gris à marge jaune ou jaune orangé. Arête des lames orange vif.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt	 Prunulus diosmusCharles Roussel	Prunulus diosmus (Krieglst. & Schwöbel) C. Hahn2490 Syn. : Mycena diosma Nom français : Mycène à deux odeurs Habitat : Dans les forêts de hêtres sur sol calcaire. Odeur : De radis mêlée à celle du tabac froid. Chapeau hygrophane, violet à brun-violet par l'humidité puis beige en séchant - Lames lilas pâle.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt	 Mycena epipterygiaCharles Roussel	Mycena epipterygia (Scop.) Gray2493 Syn. : Prunulus epipterygius Nom français : Mycène des fougères Habitat : Sur humus et débris végétaux, feuilles ou aiguilles. Odeur : Subnulle ou farineuse rance. Chapeau jaune citrin - Stipe visqueux, jaune citrin vif. Une pellicule visqueuse séparable couvre le chapeau.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt	 Mycena galericulataCharles Roussel	Mycena galericulata (Scop.) Gray2505 Syn. : Nom français : Mycène en casque Habitat : Sur souches et branches de feuillus ou de conifères. Odeur : Faible, farineuse (saveur très farineuse). Stipe tenace, souvent comprimé, hirsute à la base. Lames souvent rose pâle, fortement interveinées.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt	 Mycena maculataCharles Roussel	Mycena maculata P. Karst.2519 Syn. : Nom français : Mycène tachée Habitat : Sur bois mort de feuillus et de conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-gris à brun-rouge, longuement strié. Toutes les parties se tachent de brun-rouge.

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae



Comestibilité **Toxique**



Mycena pura (Pers.) P. Kumm.

2546

Syn. : **Prunulus purus**

Nom français : **Mycène pur**

Habitat : Sous feuillus et conifères, sur divers types de sols.

Odeur : Raphanoïde.

Chapeau violet lilas à violet rose, hygrophane.

Pied creux, cassant, blanchâtre à gris-violet ou rose.

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae



Comestibilité **Toxique**



Mycena rosea Gramberg

2558

Syn. : **Mycena pura fo. et var. rosea**

Nom français : **Mycène rose**

Habitat : Surtout sous feuillus, sur terre nue, parmi les feuilles.

Odeur : Raphanoïde.

Chapeau de couleur vieux rose, hygrophane.

Stipe blanc à rose pâle, finement fibrilleux.

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité **Sans intérêt**



Mycena rosella (Fr.) P. Kumm.

2560

Syn. : **Mycena roseola**

Nom français : **Mycène rosâtre**

Habitat : En troupe, sur tapis d'aiguilles, sous pins et épicéas.

Odeur : Insignifiante.

Chapeau fragile, strié-cannelé, rose tendre.

Stipe blanc à reflets roses, orné de rhizoïdes.

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité **Sans intérêt**



Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm.

2562

Syn. :

Nom français : **Mycène sanguinolente**

Habitat : Dans les forêts de feuillus et dans les pessières.

Odeur : Faible de radis ou non caractéristique.

Chapeau rouge brunâtre - Arête des lames rouge.

Apparition d'un latex rougeâtre à la cassure du pied.

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae



Comestibilité **Toxique**



Lepiota magnispora Murrill

2210

Syn. : **Lepiota ventriosospora**
Lepiota ventriosospora var. fulva

Nom français : **Lépiote à voile jaune**

Habitat : Uniquement sous conifères (pins, épicéas).

Odeur : Douce, non caractéristique.

Chapeau couvert d'écailles fauve orangé.

Stipe guirlandé par un voile floconneux jaune.

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae



Comestibilité **Comestible**



Macrolepiota procera (Scop.) Singer

2387

Syn. : **Lepiota procera**

Nom français : **Lépiote élevée (Coulemelle)**

Habitat : Dans les prés, les lisières ou clairières gramineuses.

Odeur : Faible, fongique.

Reconnaissable à sa grande taille, à son chapeau squameux, à son stipe chiné, à son anneau coulissant.

20 - Les agarics

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Agaricaceae**



Comestibilité **Comestible**



Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck

50

Syn. :

Nom français : **Agaric sylvicole**

Habitat : Forêts de feuillus et de conifères.

Odeur : Forte odeur anisée.

Grande espèce - Chapeau blanc, jaunissant.

Lames blanc rosâtre à rose - Anneau membraneux.

21 - Coprins et psathyrelles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Psathyrellaceae**



Comestibilité **Toxique**



Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.

2659

Syn. : **Panaeolus sphinctrinus - Panaeolus campanulatus**

Nom français : **Panéole à marge du chapeau dentée**

Habitat : Dans les pâturages, sur excréments d'herbivores.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau conique-campanulé, noir olivacé, à marge fermée par des lambeaux triangulaires du voile.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Amanita excelsa (Fr.) Neville & Poumarat var. spissa

118

Syn. : **Amanita spissa**

Nom français : **Amanite épaisse**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Nette odeur raphanoïde.

Port robuste - Chapeau gris à brun - Volve friable.

Anneau juponnant, strié - Stipe à bulbe napiforme.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **Toxique**



Amanita muscaria (L.) Lam.

130

Syn. :

Nom français : **Amanite tue-mouches**

Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs.

Anneau membraneux, juponnant - Lames blanches.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Amanita porphyria Alb. & Schw.

144

Syn. :

Nom français : **Amanite porphyre**

Habitat : Surtout sous conifères de montagne, sur sols acides.

Odeur : Raphanoïde.

Chapeau porphyre - Bulbe hémisphérique, marginé.

Anneau blanchâtre, vite violacé - Saveur douce.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**

Comestibilité **Comestible**



Amanita rubescens (Pers.) Gray

152

Syn. :


Nom français : **Amanite rougissante (Golmotte)**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Rougisement de la chair - Anneau ample et strié. Volve friable - Stipe napiforme.

22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae Comestibilité Sans intérêt		Amanita submembranacea (Bon) Gröger 160 Syn. : Amanitopsis submembranacea Nom français : Amanite à volve grise Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain acide. Odeur : Non caractéristique. Espèce robuste à chapeau brun-jaune nuancé d'olive. Volve semi-membraneuse, de couleur grise.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae Comestibilité Comestible		Amanita vaginata (Bull.) Lam. 162 Syn. : Nom français : Amanite vaginée Habitat : Ubiquiste, sans liaison avec des essences précises. Odeur : Inodore. Stipe sans anneau - Chapeau grisâtre, mamelonné. Volve membraneuse, très engainante - Spores rondes.
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Entolomataceae Comestibilité Comestible		Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kummer 450 Syn. : Nom français : Meunier Habitat : Sous feuillus et résineux, dans les clairières. Odeur : Fortement farineuse. Chapeau de forme variable, blanchâtre, cassant. Lames très décurrentes, blanches puis roses.
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Entolomataceae Comestibilité Toxique		Entocybe nitida (Quél.) T.J. Baroni, Largent & V. Hofst. 1302 Syn. : Entoloma nitidum Nom français : Entolome brillant Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les tourbières. Odeur : Légèrement farineuse à raphanoïde. Chapeau umboné, bleu métallisé, fibrilleux. Stipe bleu-gris, strié, parfois teinté de jaune à la base.
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Pluteaceae Comestibilité Sans intérêt		Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 2838 Syn. : Pluteus brunneoradiatus - Pluteus atricapillus Nom français : Plutée couleur de cerf Habitat : Sur souches et bois mort de feuillus et de conifères. Odeur : Nettement raphanoïde. Chapeau gris brunâtre, sans nuances olivâtres. Lames à arête concolore - Hyphes non bouclées.
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Pluteaceae Comestibilité Sans intérêt		Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner 2872 Syn. : Pluteus tricuspidatus - Pluteus nigrofloccosus Pluteus cervinus var. atromarginatus Nom français : Plutée à lames bordées de noir Habitat : Sur souches ou troncs couchés de conifères. Odeur : Faible, non franchement raphanoïde. Chapeau mamelonné, brun, squamuleux au disque. Arête des lames floconneuse, ponctuée de brun-noir.

24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius bolaris (Pers.) Zawadzki 609 Syn. : Nom français : Cortinaire ocre rouge Habitat : Montagnard, sous hêtres et bouleaux, en terrain acide. Odeur : Insignifiante. Chapeau couvert de fines plaques rouge brique. Lames beiges à brunes - Stipe orné de mèches rouges.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Comestible		Cortinarius caperatus Pers. 632 Syn. : Rozites caperata Nom français : Pholiote ridée Habitat : Sous conifères et feuillus, dans les myrtilliers. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau ochracé pâle, givré de blanc grisâtre. Stipe orné d'un anneau membraneux blanchâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Mortel		Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. Orton 645 Syn. : Nom français : Cortinaire jaune cannelle Habitat : Dans les endroits humides, jusqu'en zone alpine. Odeur : Insignifiante. Chapeau de 1 à 4 cm, jaune olivâtre, feutré. Lames jaunes - Stipe jaune - Chair blanchâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius malicorius Fr. 814 Syn. : Cortinarius croceifolius Nom français : Cortinaire à chair olive Habitat : Dans les pessières, en montagne, sur sols calcaires. Odeur : Légèrement raphanoïde ou iodée. Chapeau brun-rouge, couvert par un voile orangé vif. Chair olive foncé - Stipe jaune orangé - Saveur douce.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Phlegmacium percome (Fr.) A. Blytt 875 Syn. : Cortinarius percomis Nom français : Cortinaire aromatique Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain calcaire. Odeur : Aromatique, suave, de fleur d'oranger. Chapeau jaune doré à fauve, à marge excédante. Lames, stipe et chair jaune citron vif.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen & Liimat 922 Syn. : Cortinarius eumarginatus - Cortinarius purpurascens Nom français : Cortinarius purpureuscent Habitat : Sous conifères (épicéas), sur sols acides. Odeur : Nulle. Chapeau visqueux, gris-bleu, orné de fibrilles brunes. Lames se tachant de violet sombre au froissement.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Cortinariaceae**



Comestibilité **Mortel**



Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray

953

Syn. : **Cortinarius puniceus**

Nom français : **Cortinaire sanguin**

Habitat : Dans les sapinières et pessières humides.

Odeur : Raphanoïde ou de bois de cèdre.

Coloration entièrement rouge sang - Mycélium orangé.
 Silhouette élancée - Chapeau finement squamuleux.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Cortinariaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Cortinarius stillatitius Fr.

984

Syn. : **Cortinarius integerrimus**

Nom français : **Cortinaire dégoulinant**

Habitat : Dans les pessières à myrtilles.

Odeur : De miel, par grattage à la base du pied.

Chapeau très glutineux, brun châtain ochracé.
 Stipe bleu violacé, très visqueux - Chair blanchâtre.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Cortinariaceae**

Comestibilité **Comestible**



Cortinarius varius (Schaeff.) Fr.

1040

Syn. :

Nom français : **Cortinaire variable**

Habitat : En montagne, exclusivement associé à l'épicéa.

Odeur : Faible, un peu fétide à la coupe.

Chapeau visqueux, jaune orangé +/- vif - Lames lilas.
 Stipe en massue, blanc, à voile blanchâtre peu épais.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Inocybaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm.

1083

Syn. :

Nom français : **Crépidote aplani**

Habitat : Sur bois mort de feuillus, plus rare sur conifères.

Odeur : Faible, de caoutchouc.

Chapeau lisse, à marge striée, blanc à beige ochracé.
 Stipe nul ou réduit - Spores globuleuses, verruqueuses.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Toxique**



Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill

1484

Syn. : **Gymnopilus stabilis - Gymnopilus hybridus**

Nom français : **Gymnopile pénétrant**

Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus.

Odeur : Légèrement herbacée.

Chapeau feutré, jaune orangé - Cortine persistante.
 Lames jaunâtres et saveur amère.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Gymnopilus picreus Pers.

1485

Syn. :

Nom français : **Gymnopile amer**

Habitat : En montagne, sur bois dégradé de conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brun orangé vif et lames jaune d'or.
 Stipe brun-rouge et saveur nettement amère.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Comestible**

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.

1794

Syn. : **Geophila capnoides**

Nom français : **Hypholome à lames enfumées**

Habitat : Sur souches et racines de conifères.

Odeur : Plutôt agréable.

En touffes, à chapeaux lisses et jaune olive.

Lames lavées de lilas puis noirâtres - Saveur douce.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Toxique**

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

1800

Syn. : **Geophila fascicularis** - **Psilocybe fascicularis**

Nom français : **Hypholome en touffes**

Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.

Odeur : De polypore.

En touffes sur les souches ou le bois mort.

Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm.

2773

Syn. :

Nom français : **Pholiote jaune feu**

Habitat : Fasciculé sur bois mort de conifères.

Odeur : Faiblement aromatique.

Chapeau jaune citrin à fauve orangé, squamuleux.

Stipe jaune sulfurin, revêtu de squames retroussées.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Pholiota lenta (Pers.) Singer

2782

Syn. : **Flammula lenta**
Dryophila lenta

Nom français : **Pholiote glutineuse**

Habitat : Sous feuillus et conifères, sur bois dégradé.

Odeur : Faible, légèrement iodée.

Chapeau beige ochracé jaunâtre, très visqueux, avec des flocons blancs noyés dans le mucus.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Toxique**

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quéf.

3387

Syn. : **Psilocybe aeruginosa**

Nom français : **Strophaire vert de gris**

Habitat : En lisière des bois, sur débris végétaux pourrissant.

Odeur : Légèrement herbacée.

Chapeau bleu-vert, visqueux, à marge appendiculée.

Arête des lames blanche - Anneau visqueux, pendant.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Russula aeruginea Lindblad ex Fr.

3058

Syn. :

Nom français : **Russule vert de gris**

Habitat : Souvent sous bouleaux, parfois sous conifères.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau gris verdâtre, vergeté, taché de rouille.

Lames crème puis ocre - Saveur légèrement âcre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Comestible**



Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

3113

Syn. :

Nom français : **Russule charbonnière**

Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres.

Odeur : Faible, non significative.

Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce.

Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Russula fellea (Fr.) Fr.

3133

Syn. :

Nom français : **Russule de fiel**

Habitat : Généralement sous hêtres.

Odeur : De compote de pommes.

Entièrement de couleur ochracée à ocre - Saveur âcre.

Lames blanc crème nuancé d'ochracé

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Russula fragilis Fr.

3138

Syn. : **Russula bataillei - Russula emetica fo. knauthii**
Russula fragilis var. knauthii - Russula knauthii

Nom français : **Russule fragile**

Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les hauts-marais.

Odeur : Agréable, de coco ou d'acétate d'amyle.

Chapeau fragile, visqueux, rouge violacé à lilas.

Saveur très âcre - Lames assez espacées, blanches.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Russula integra (L.) Fr.

3163

Syn. : **Russula piceetorum - Russula adulterina**

Nom français : **Russule intègre**

Habitat : Dans les pessières de montagne.

Odeur : Très faible d'iode à la coupe.

Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns.

Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Russula grata Britzelm

3174

Syn. : **Russula laurocerasi - Russula fragrans**
Russula foetens var. laurocerasi

Nom français : **Russule à odeur de laurier cerise**

Habitat : Surtout sous feuillus.

Odeur : D'amandes amères, de laurier cerise.

Chapeau ochracé roussâtre - Saveur âcre.

Lames crème blanchâtre +/- tachées de roussâtre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Toxique**



Russula nobilis Velen.

3189

Syn. : **Russula fageticola - Russula mairei**

Nom français : **Russule de Maire**

Habitat : Sous hêtres, en terrain acide.

Odeur : De coco.

Port robuste et chapeau ferme, d'un beau rouge.

Lames blanc glauque - Saveur âcre - Stipe blanc pur.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Comestible**

Russula mustelina Fr.

3197

Syn. :

Nom français : **Russule couleur de belette**

Habitat : Dans les pessières à myrtilles, en montagne.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Espèce compacte - Chapeau sec, brun noisette.

Saveur douce - Lames crème - Chair épaisse.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Russula ochroleuca Pers.

3204

Syn. :

Nom français : **Russule ocre et blanche**

Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des tourbières.

Odeur : Faiblement fruitée.

Chapeau ochracé - Lames blanches à crème pâle.

Saveur âcre à presque douce - Stipe blanc, grisonnant.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Russula puellaris Fr.

3229

Syn. :

Nom français : **Russule jeune fille**

Habitat : Surtout sous conifères (épicéas), rare sous feuillus.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Petite espèce à chapeau pourpre - Lames crème.

Saveur subdouce - Jaunissement de toutes les parties.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Toxique**



Russula queletii Fr.

3232

Syn. :

Nom français : **Russule de Quélet**

Habitat : Sous épicéas de montagne, en terrain calcaire.

Odeur : De compote de pommes.

Chapeau pourpre foncé - Lames blanches à crème.

Saveur âcre - Chair blanche - Stipe rose pourpre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.

3289

Syn. :

Nom français : **Russule feuille morte**

Habitat : Sous conifères de montagne, près des hauts-marais.

Odeur : De crustacés en train de cuire.

Chapeau pourpre - Stipe rose rouge - Lames ocre.

Saveur douce - Réaction verte avec SO4Fe.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Lactarius albocarneus Britzelm.

2010

Syn. : **Lactarius glutinopallens**

Nom français : **Lactaire glutineux**

Habitat : Sous conifères, dans les hauts-marais.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau gris-beige nuancé de lilacin, gluant.

Latex blanc puis crème verdâtre, très âcre.

28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius blennius Fr. 2020 Syn. : Nom français : Lactaire muqueux Habitat : Exclusivement sous hêtres. Odeur : Subnulle. Chapeau gris-brun mêlé d'olive, très visqueux. Latex abondant, âcre, tachant les lames de gris.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius necator (Bull.) Pers. 2067 Syn. : Lactarius plumbeus - Lactarius turpis Nom français : Lactaire plombé Habitat : Sous bouleaux, dans les lieux humides. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau charnu, brun-olivâtre, feutré. Latex copieux, jaune verdâtre, vite très âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius trivialis (Fr.) Fr. 2107 Syn. : Nom français : Lactaire trivial Habitat : Dans les pessières, les tourbières. Odeur : Vaguement fruitée. Chapeau visqueux, gris-brun vineux, parfois beige. Latex très âcre, beige verdâtre en séchant.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Boletus edulis Bull. 263 Syn. : Nom français : Cèpe de Bordeaux Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide. Odeur : Fongique, très agréable. Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre. Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Boletus pinophilus Pilát & Dermek 271 Syn. : Boletus pinicola Nom français : Cèpe des pins Habitat : Conifères (pins, sapins, épicéas), rare sous feuillus. Odeur : Agréable, d'écaille de noix, un peu iodée. Chapeau brun-rouge acajou - Pores blancs au début. Stipe blanc puis ocre-roux, avec un réseau concolore.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Sans intérêt		Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 342 Syn. : Boletus piperatus - Chalciporus amarellus Nom français : Bolet poivré Habitat : Sous conifères de montagne, rarement sous feuillus. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-rouge à brun-jaune - Saveur poivrée. Pores amples, anguleux, cuivrés - Base du stipe jaune.

29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Imleria badia (Fr.) Vizzini 1824 Syn. : Boletus badius - Xerocomus badius Nom français : Bolet bai Habitat : Sous conifères et feuillus. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau bai à marron, de couleur uniforme. Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn 2601 Syn. : Boletus erythropus Nom français : Bolet à pied rouge Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne. Odeur : +/- fruitée. Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté. Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Sans intérêt		Tylopilus felleus Bull. 3601 Syn. : Boletus felleus - Suillus felleus Nom français : Bolet amer (Chicotin) Habitat : Sous conifères et feuillus, de la plaine à la montagne. Odeur : Faible, agréable. Chapeau sec, feutré, brun noisette - Chair immuable. Pores blancs à roses - Stipe orné d'un réseau en relief.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara 3632 Syn. : Boletus chrysenteron - Xerocomus chrysenteron Nom français : Bolet à chair jaune Habitat : Sous feuillus et résineux. Odeur : De scléroderme. Chapeau brun clair, rougeâtre dans les blessures. Pores amples, anguleux - Stipe rayé de rouge carminé.
30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Gomphidiaceae  Comestibilité Comestible		Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. 1463 Syn. : Nom français : Gomphide glutineux Habitat : Sous conifères de montagne. Odeur : Insignifiante. Chapeau brun ochracé, recouvert d'un voile glutineux. Lames espacées, très décurrentes.
30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Hygrophoropsidaceae  Comestibilité Comestible		Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire 1728 Syn. : Nom français : Fausse chanterelle Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

30 - Les bolétales lamellés

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Paxillaceae**



Comestibilité **Mortel**



Paxillus involutus (Batsch) Fr.

2685

Syn. :

Nom français : **Paxille enroulé**

Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs.

Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau roux ochracé, à marge involutée.

Lames très serrées, étroites, facilement détachables.

30 - Les bolétales lamellés

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Tapinellaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Tapinella atrotomentosa (Batsch) Sutara

3432

Syn. : **Paxillus atrotomentosus - Sarcopaxillus atrotomentosus**

Nom français : **Paxille à pied noir**

Habitat : A la base des souches de conifères.

Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau dimidié, ocre à brun rouille, finement feutré.

Stipe latéral, chaussé d'un tomentum brun-noir.

31 - Les gastéromycètes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Agaricaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Bovista plumbea Pers.

279

Syn. :

Nom français : **Boviste couleur de plomb**

Habitat : Prés, pâturages, pelouses subalpines et alpines.

Odeur : Inodore.

Carpophores globuleux ou aplatis, de 2 à 3 cm.

Exopéridium blanc - Endopéridium gris à maturité.

31 - Les gastéromycètes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Agaricaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Lycoperdon molle Pers.

2342

Syn. :

Nom français : **Vesse de loup molle**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications globuleuses à piriformes, café au lait. Aiguillons courts, mous - Gléba brun chocolat.

31 - Les gastéromycètes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Agaricaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Lycoperdon nigrescens Pers.

2343

Syn. : **Lycoperdon foetidum**

Nom français : **Vesse de loup noircissante**

Habitat : Sur terre nue, sous feuillus et conifères, sur sol acide.

Odeur : Désagréable chez les jeunes exemplaires.

Carpophores turbinés - Aiguillons courts, brun clair.

Gléba blanche puis brun olive.

31 - Les gastéromycètes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Agaricaceae**

Comestibilité **Comestible**



Lycoperdon perlatum Pers.

2345

Syn. : **Lycoperdon gemmatum**

Nom français : **Vesse de loup perlée**

Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications blanches recouvertes d'aiguillons.

Gléba blanche puis olive - Stipe conique.

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Agaricaceae

Comestibilité Sans intérêt



Lycoperdon umbrinum Pers.

2347

Syn. :

Nom français : **Vesse de loup brun d'ombre**

Habitat : Sur terre, surtout sous épicéas de montagne.

Odeur : Non caractéristique.

Fuctifications piriformes ornées d'aiguillons denses.

Gléba blanche puis brunâtre-olivacé, compacte.

Myxomycètes

Div. Amoebozoa

Clas. Myxogastrea

Ord.. Liceida

Fam. reticulariaceae

Comestibilité Sans intérêt



Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel.

3711

Syn. : **Tubifera cylindrica - Stemonitis ferruginosa**

Nom français :

Habitat : Sur bois mort plus ou moins enfouis, sapinière humide.

Odeur : Odeur non caractéristique.

Plasmode d'abord blanc, virant au rose, puis rouge corail et enfin rouge brique sombre.