

Exposition des champignons du Dauphiné

tenue à l'Hôtel de Ville de Grenoble

le samedi 26 octobre et le dimanche 27 octobre 2024

Les aléas climatiques bouleversant considérablement la présence de champignons l'automne, c'est la raison pour laquelle, cette année, l'exposition annuelle a été tenue à la fin octobre, plutôt qu'à la fin septembre. Et, de fait, il a été, ainsi, possible de présenter aux nombreux visiteurs, près de 800 personnes, 230 espèces de champignons de la région.



09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
Clas. **Leotiomycetes**
Ord.. **Helotiales**
Fam. **Helotiaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Calycina citrina (Hedw.) Gray

247

Syn. : **Bisporella citrina**

Nom français : **Bisporelle citrine**

Habitat : Troncs et branches décortiquées de feuillus (hêtres).

Odeur : Inodore.

Fructifications sessiles et cupuliformes de 1 à 3 mm.

Hyménium et surface externe lisses, jaune citron.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
Clas. **Geoglossomycetes**
Ord.. **Geoglossales**
Fam. **Geoglossaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Geoglossum cookeanum Nannf. ex Minter & P.F. Cannon

1443

Syn. :

Nom français : **Géoglosse de Cooke**

Habitat : Plutôt sur sable, parmi les mousses et les graminées.

Odeur : Nulle.

Fructification noire, composée d'une massue aplatie et d'un stipe étroit.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
Clas. **Peizomycetes**
Ord.. **Peizales**
Fam. **Helvellaceae**



Comestibilité **Toxique**



Helvella crispa (Scop.) Fr.

1587

Syn. :

Nom français : **Helvelle crépue**

Habitat : Sous feuillus, dans les terrains sablonneux.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau en forme de selle, avec de 2-3 lobes.

Stipe lacuneux, costé-sillonné longitudinalement.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
Clas. **Peizomycetes**
Ord.. **Peizales**
Fam. **Helvellaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Helvella elastica Bull.

1589

Syn. : **Leptopodia elastica**

Nom français : **Helvelle élastique**

Habitat : Au bord des chemins, dans les mousses.

Odeur : Inodore.

Chapeau en forme de selle, à 2 ou 3 lobes.

Stipe creux, élancé, non sillonné en long.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
Clas. **Peizomycetes**
Ord.. **Peizales**
Fam. **Helvellaceae**



Comestibilité **Toxique**



Helvella lacunosa Atzel. : Fr.

1592

Syn. : **Helvella sulcata**

Nom français : **Helvelle lacuneuse**

Habitat : Sous feuillus et conifères, dans l'herbe.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau à 2 ou 3 lobes irréguliers et ondulés.

Stipe lacuneux, gris-noir, sillonné-alvéolé.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
Clas. **Sordariomycetes**
Ord.. **Hypocreales**
Fam. **Hypocreaceae**



Comestibilité **Sans intérêt**

Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul.

1817

Syn. : **Peckiella lateritia**

Nom français : **Hypomyces couleur de brique**

Habitat : Sur l'hyménium de certains lactaires.

Odeur : Inodore.

Subiculum blanc, puis jaune pâle à brun jaunâtre.

Périthèces partiellement immergés, brun-jaune d'or.

09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Leotiomycetes Ord.. Helotiales Fam. Leotiaceae  Comestibilité Toxique		Leotia lubrica (Scop.) Pers. 2176 Syn. : Leotia viscosa Nom français : Leotie lubrique Habitat : Sur terre, en groupes, dans les mousses. Odeur : Insignifiante. Fructifications gélatineuses avec une tête et un stipe. Chapeau visqueux, arrondi, bosselé, lobé, vert-jaune.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Peizomycetes Ord.. Peizales Fam. Pyronemataceae Comestibilité Sans intérêt		Otidea alutacea (Pers.) Massee 2642 Syn. : Peziza alutacea - Aleuria alutacea Nom français : Otidée alutacée Habitat : Dans les forêts de feuillus ou mixtes, sur terre. Odeur : Nulle. En forme de coupe irrégulière fendue sur le côté. Hyménium couleur argile foncé à gris-brun.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Peizomycetes Ord.. Peizales Fam. Otideaceae  Comestibilité Toxique		Otidea onotica (Pers.) Fuckel 2647 Syn. : Aleuria onotica - Peziza onotica Aleuria abietina - Peziza abietina - Otidea abietina Nom français : Otidée en forme d'oreille d'âne Habitat : Sur terre nue, sous conifères et feuillus. Odeur : Nulle. Fructification fendue sur le côté, en forme d'oreille. Hyménium orange pâle et pied velouté de blanc.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Peizomycetes Ord.. Peizales Fam. Discinaceae  Comestibilité Mortel		Paragyromitra infula (Schaeff.) X.C. Wang & W.Y. Zhuang 1525 Syn. : Gyromitra infula - Physomitra infula Nom français : Gyromitre en turban Habitat : En montagne, sur bois dégradé, en automne. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau cannelle, mitriforme, formé de 2 à 4 lobes. Stipe très irrégulier, creux, à chair cassante.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Sordariomycetes Ord.. Xylariales Fam. Xylariaceae Comestibilité Sans intérêt		Xylaria hypoxylon (L.) Grev. 3656 Syn. : Nom français : Xylaire du bois Habitat : Sur bois mort, surtout de feuillus, toute l'année. Odeur : Nulle. Fructifications aplaties, en forme de cornes de cerf. Pédoncule noir et poilu - Périthèces verruqueux.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Sordariomycetes Ord.. Xylariales Fam. Xylariaceae Comestibilité Sans intérêt		Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. 3659 Syn. : Nom français : Xylaire polymorphe Habitat : Sur souches de feuillus, surtout sur hêtres. Odeur : Nulle. Fructifications claviformes, brun clair à noires. Stipe nul ou indistinct - Trame compacte, blanche.

10 - Les basidiomycètes à
basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Auriculariales
Fam. Auriculariaceae



Comestibilité Sans intérêt

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers.

238

Syn. : **Tremella violacea**

Nom français : **Auriculaire mésentérique**

Habitat : Sur bois de feuillus morts ou vivants (hêtres, érables).

Odeur : Faible, agréable.

Fructifications étalées-réfléchies, zonées, poilues.

Chapeaux +/- formés - Consistance gélatineuse.

10 - Les basidiomycètes à
basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Dacrymycetes
Ord.. Dacrymycetales
Fam. Dacrymycetaceae



Comestibilité Toxique



Calocera viscosa Pers.

301

Syn. :

Nom français : **Calocère visqueuse**

Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères.

Odeur : Inodore.

En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé.

Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

10 - Les basidiomycètes à
basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Auriculariales
Fam. Exidiaceae



Comestibilité Sans intérêt

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.

2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**

Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.

Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

10 - Les basidiomycètes à
basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Tremellomycetes
Ord.. Tremellales
Fam. Tremellaceae



Comestibilité Sans intérêt

Tremella mesenterica (Schaeff.) Pers.

3464

Syn. : **Tremella lutescens**

Nom français : **Trémelle mésentérique**

Habitat : Sur bois mort, branches tombées, toute l'année.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications cérébriformes formant une masse gélatineuse de couleur jaune d'œuf.

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Albatrellaceae



Comestibilité Comestible

Albatrellus citrinus Ryman

70

Syn. :

Nom français : **Polypore citrin**

Habitat : Sous conifères en montagne.

Odeur : Non caractéristique.

Espèce à chair tendre, chapeau blanchâtre au début puis jaune citrin.

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Albatrellaceae



Comestibilité Sans intérêt

Albatrellus confluent (Alb. & Schwein.) Teixeira

3335

Syn. : **Scutiger confluent** - **Polyporus confluent**

Nom français : **Polypore confluent**


Habitat : Sous épicéas de montagne.

Odeur : Faible, agréable.

Chapeaux irréguliers, brun orangé - Pores arrondis.

Stipes difformes, courts et épais - Chair cassante.

11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Amaropostia stiptica (Pers.) B.K. Cui et coll.2619 Syn. : Postia stiptica - Tyromyces stipticus Oligoporus stipticus Nom français : Polypore amer Habitat : Saprophyte sur bois mort de conifères. Odeur : Fortement fongique. En forme de console, largement fixé au substrat. Chair cassante, blanche, tendre, fortement amère.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Hymenochaetales Fam. Hymenochaetaceae Comestibilité Sans intérêt		Coltricia perennis (L.) Murrill463 Syn. : Nom français : Polypore vivace Habitat : Sur charbonnières, sol acide sous feuillus et conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeau plan à déprimé, cannelle, étroitement zoné. Stipe brun foncé - Pores arrondis, décurrents, 2-4 / mm.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Cyanosporus caesius (Schrad.) Mc Ginty2617 Syn. : Postia caesia - oligoporus caesius - Tyromyces caesius Nom français : Polypore bleuté des conifères Habitat : Surtout sur bois de conifères. Odeur : Faible, non caractéristique. Fructifications molles, tachées de bleu, porées. Pores arrondis, souvent déchirés (3 pores / mm).
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Fomitopsidaceae Comestibilité Sans intérêt		Daedalea quercina (L.) Pers.1165 Syn. : Lenzites quercinus Nom français : Lenzite du chêne Habitat : Sur bois mort de chênes et de châtaigniers. Odeur : Agréable. Fructifications lamellées, en forme de console. Lamelles labyrinthées, de couleur beige.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer1167 Syn. : Daedaleopsis confragosa var. tricolor Lenzites tricolor Nom français : Tramète tricolore Habitat : Sur bois mort de feuillus (souvent merisiers). Odeur : Inodore. Carpophores plats, minces, zonés. Hyménium constitué de lames serrées.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Fomitopsidaceae Comestibilité Sans intérêt		Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. et al.2814 Syn. : Piptoporus betulinus - Polyporus betulinus Nom français : Polypore du bouleau Habitat : Sur bois mort de bouleau. Odeur : Agréable, acidulée. Chapeau arrondi, pulviné, gris-beige alutacé. Hyménium finement poré, blanchâtre - Stipe absent.

11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Fomitopsidaceae Comestibilité Sans intérêt		Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst. 1395 Syn. : Ungulina marginata Nom français : Polypore marginé Habitat : Saprophyte des conifères, parfois des feuillus. Odeur : Acide, forte, évoquant l'odeur des poulaillers. Fructifications dimidiées à surface brun-rouge. L'un des polypores les plus communs.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Ganodermataceae Comestibilité Sans intérêt		Ganoderma applanatum (Schaeff.) With. 1425 Syn. : Ganoderma lipsiense Nom français : Ganoderme plat Habitat : Sur bois mort de feuillus. Odeur : Fongique, agréable. Chapeau poudré de brun par les spores. Hyménium poré, souvent parsemé de galles.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Ganodermataceae Comestibilité Sans intérêt		Ganoderma carnosum Pat. 1426 Syn. : Nom français : Ganoderme charnu Habitat : En montagne, sur souches de conifères. Odeur : Agréable de polypore. Chapeau de couleur brun-rouge ou acajou. Stipe bosselé, sinueux, vernissé - Pores arrondis.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gloeophyllales Fam. Gloeophyllaceae Comestibilité Sans intérêt		Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki 1457 Syn. : Trametes odorata Nom français : Tramète odorante Habitat : Sur bois mort d'épicéas, surtout en montagne. Odeur : Forte d'anis, de vanille ou de pain d'épices. Chapeau jaune orangé noduleux, feutré. Trame noircissant en présence de NH3.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Phanerochaetaceae Comestibilité Toxique		Hapalopilus rutilans (Fr.) P. Karst. 1538 Syn. : Hapalopilus nudilans - Phaeolus rutilans Phaeolus nidulans Nom français : Polypore rutilant Habitat : Sur bois mort, surtout de hêtres et de sapins. Odeur : Inodore. Chapeau tendre, feutré, non zoné, cannelle. Réaction violette en présence d'ammoniaque.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Bondarzewiaceae Comestibilité Sans intérêt		Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 1621 Syn. : Ungulina annosa - Polyporus annosus Nom français : Polypore du rond des pins Habitat : A la base des troncs et sur racines, surtout de pins. Odeur : Forte, fongique. De taille réduite - Face piléique brun rougeâtre, feutrée. Hyménium crème orangé, à grands pores (2-3 / mm).

11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Meruliaceae Comestibilité Sans intérêt		Mycoacia gilvessens (Bres.) Zmitr. 3800 Syn. : Ceriporiopsis gilvessens - Poria gilvessens Nom français : Polypore à pores rosissants Habitat : Sur bois mort de feuillus, hêtres surtout, rare sur conifères. Odeur : Nulle. Basidiome résupiné, charnu puis coriace en séchant. Pores arrondis-anguleux, rosissant au toucher.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Hymenochaetales Fam. Hymenochaetaceae Comestibilité Sans intérêt		Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. 2746 Syn. : Fomitiporia hartigii - Polyporus hartigii Nom français : Polypore des sapins Habitat : Parasite et saprophyte des sapins. Odeur : Non caractéristique. Fructification tuberculeuse à pulvinée puis ongluée. Pores arrondis (4-6/mm) jaune-brun à brun rougeâtre.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Hymenochaetales Fam. Hymenochaetaceae Comestibilité Sans intérêt		Phellinus tuberculosus (Baug.) Niemalä 2750 Syn. : Phellinus pomaceus - Ochroporus tuberculosus Nom français : Polypore des vergers Habitat : Parasite sur troncs vivants ou morts des pruniers. Odeur : Non caractéristique. Chapeau dimidié, mal formé, noduleux, cannelle. Pores minuscules (4-5 / mm), arrondis, pruneux.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko 2812 Syn. : Polyporus durus - Polyporus badius Polyporus picipes Nom français : Polypore bai Habitat : En touffes parfois conrescentes, sur bois mort. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau luisant et gras, brun-rouge sombre, glabre. Pores minuscules, arrondis, fermés, simples, blancs.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Fomitopsidaceae Comestibilité Sans intérêt		Postia ptychogaster (Kytov) Redhead 2886 Syn. : Oligoporus ptychogaster - Tyromyces ptychogaster Polyporus ptychogaster - Ptychogaster albus Nom français : Polypore fuligineux Habitat : Sur bois mort de conifères. Odeur : Nulle. Fructification d'abord velue (forme imparfaite), puis formant des petits chapeaux porés (forme fertile).
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Thelephorales Fam. Thelephoraceae Comestibilité Sans intérêt		Thelephora terrestris Ehrh. 3448 Syn. : Phylacteria terrestris Nom français : Théléphore terrestre Habitat : Sous conifères, sur terre ou sur litières d'aiguilles. Odeur : Faible ou nulle. Fructifications en rosettes - Chapeaux fibrilleux. Hyménium chagriné, brunâtre - Stipe rudimentaire.

11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 3451 Syn. : Pseudotrametes gibbosa Nom français : Tramète bossue Habitat : Saprophyte, sur troncs ou souches de feuillus. Odeur : Nulle. Reconnaisable à ses pores allongés radialement et à sa bosse près du point d'insertion.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Trametes trogii Berk. 3456 Syn. : Funalia trogii - Cerrena trogii - Corioloipsis trogii Nom français : Tramète de Trog Habitat : Sur bois mort de feuillus, surtout peupliers. Odeur : Nulle. Reconnaisable à son chapeau à peine zoné, couvert de poils hirsutes et à ses pores blancs puis jaunâtes.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Trametes versicolor (L.) Lloyd 3457 Syn. : Coriolus versicolor Nom français : Tramète versicolore Habitat : Sur bois peu dégradé, surtout de feuillus. Odeur : Nulle. Trame très mince - Pores fins et étroits, arrondis. Chapeaux multiples, concrescents, zonés, veloutés.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Trichaptum abietinum Velen. 3467 Syn. : Hirschioporus abietinus - Trametes abietina Nom français : Tramète du sapin Habitat : Sur bois mort de sapin. Odeur : Nulle. Fructifications résupinées, zonées, hirsutes, minces. Hyménium constitué de pores irpicoïdes, brun-violet.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae Comestibilité Comestible		Cantharellus cibarius Fr. 320 Syn. : Nom français : Chanterelle ou girolle Habitat : Surtout sous feuillus, en terrain non calcaire. Odeur : Forte et agréable, fruitée, d'abricot. Chapeau jaune vif uniforme - Chair blanche ou jaune. Plis décurrents, fourchus, jaune orangé.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae Comestibilité Comestible		Cantharellus cinereus Pers. 1065 Syn. : Craterellus cinereus Nom français : Chanterelle cendrée Habitat : Sous feuillus et conifères, en plaine et en montagne. Odeur : Fruitée, de mirabelle. Chapeau noir, en entonnoir, perforé au centre. Plis décurrents, bien formés, gris-bleu à grisâtres.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae Comestibilité Sans intérêt	 Clavaria fragilisRongeur chanterelle	Clavaria fragilisHolmsk. 386 Syn. : Clavaria vermicularis Nom français : Clavaire vermicelle Habitat : Dans les pelouses, les prés moussus. Odeur : Insignifiante. Fructification vermiforme, blanche, fragile, non ramifiée. Hyménium lisse ou strié - Stipe concolore.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gomphales Fam. Clavariadelphaceae Comestibilité Sans intérêt	 Clavariadelphus truncatusRongeur chanterelle	Clavariadelphus truncatusDonk 379 Syn. : Clavaria truncata Nom français : Clavaire tronquée Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain calcaire. Odeur : Faible, non caractéristique. En forme de massue tronquée au sommet. Hyménium lisse à ridé, jaune ochracé - Saveur douce.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae Comestibilité Sans intérêt	 Clavulina cinereaClavaria cinerea	Clavulina cinerea(Bull.) J. Schröt. 384 Syn. : Clavaria cinerea Nom français : Clavaire cendrée Habitat : Sous feuillus, sur sol riche en débris ligneux. Odeur : Faible, de beurre. Sous forme de buisson ramifié de 10 à 12 cm de haut. Rameaux grisâtres à reflets violets - Saveur douce.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae Comestibilité Sans intérêt	 Clavulina coralloidesRongeur chanterelle	Clavulina coralloides(L.) J. Schröt. 385 Syn. : Clavaria cristata - Clavulina cristata Nom français : Clavaire à crêtes de coq Habitat : Feuillus et conifères, souvent sur litières d'aiguilles. Odeur : Odeur insignifiante. Sous forme de buisson ramifié à rameaux déchiquetés Extrémité des rameaux simulant des crêtes de coq.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae Comestibilité Sans intérêt	 Clavulina rugosaRongeur chanterelle	Clavulina rugosa(Bull.) J. Schröt. 388 Syn. : Clavaria rugosa Nom français : Clavaire rugueuse Habitat : Dans les forêts de conifères, en bordure des chemins. Odeur : Insignifiante. Fructifications simples, à extrémités obtuses, digitées. Hyménium rugueux, sillonné ou plissé, blanc à crème.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae Comestibilité Comestible	 Craterellus cornucopioidesRongeur chanterelle	Craterellus cornucopioidesPers. 1066 Syn. : Cantharellus cornucopioides Craterellus cornucopioides var. flavicans et var. roseus Nom français : Trompette des morts Habitat : Surtout sous feuillus, dans les hêtraies calcaires. Odeur : Forte, de charcuterie en train de sécher. Chapeau en profond entonnoir, noir puis grisâtre. Hyménium sublisce, non plissé - Stipe creux.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae



Comestibilité Comestible



Craterellus tubaeformis Bull.

1080

Syn. : **Cantharellus tubaeformis**

Nom français : **Chanterelle en tube**

Habitat : Surtout sous conifères, dans les mousses humides.

Odeur : Agréable, fruitée.

Chapeau en entonnoir, brun gris à brun ochracé.

Plis bien formés, fourchus, gris-brun - Stipe brun-jaune.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Hericiaceae

Comestibilité Comestible



Hericium coralloides (Scop.) Pers.

1617

Syn. : **Dryodon coralloides**

Nom français : **Hydne en forme de corail**

Habitat : Sur tronc mort de sapin, en montagne (non sur hêtres).

Odeur : Agréable.

Branches coralloïdes, molles, ramifiées.

Aiguillons courts disposés en tous sens.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Thelephorales
Fam. Bankeraceae

Comestibilité Sans intérêt



Hydnum aurantiacum (Batsch) P. Karst.

1652

Syn. : **Calodon aurantiacus**

Nom français : **Hydne orangé**

Habitat : Sur litières d'aiguilles.

Odeur : Faible, aromatique.

Chapeau nuancé d'orangé, découpé en lobes.

Aiguillons décurrents, fins, serrés, orangés.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Thelephorales
Fam. Bankeraceae

Comestibilité Sans intérêt



Hydnum auratile (Britzelm.) Maas Geest.

1653

Syn. : **Hydnum auratile**

Nom français : **Hydne doré**

Habitat : Sous conifères et feuillus.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau irrégulier, brun orangé, squamuleux, zoné.

Aiguillons décurrents, brun orangé - Stipe court, central.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae



Comestibilité Comestible



Hydnum repandum L.

1672

Syn. :

Nom français : **Pied-de-mouton**

Habitat : Sous feuillus et conifères, jusqu'en montagne.

Odeur : Agréable, fruitée.

Chapeau de jaune pâle à couleur abricot.

Aiguillons très serrés, fragiles, faciles à séparer.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Gomphales
Fam. Gomphaceae

Comestibilité Sans intérêt



Phaeoclavulina flaccida (Fr.) Giachini

2725

Syn. : **Ramaria flaccida - Clavaria flaccida**

Nom français : **Ramaire flasque**

Habitat : Sur litières d'aiguilles d'épicéas, parfois en lignes.

Odeur : Insignifiante ou faiblement fruitée.

Tronc court, brun-ocre, orné de rhizomorphes blancs.

Rameaux serrés, dressés, flasques, jaune clair.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Thelephorales Fam. Bankeraceae  Comestibilité Sans intérêt	Phellodon niger (Fr.) P. Karst. 2753 Syn. : Hydnellum nigrum Nom français : Hydne noir Habitat : Sous feuillus et conifères, en troupes. Odeur : Faible sur le frais, de maggi en séchant. Chapeau tomenteux, bosselé, zoné, bleu-noir à noir. Aiguillons de 3 mm, fins, subulés, blancs puis gris.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gomphales Fam. Gomphaceae  Comestibilité Comestible	Ramaria aurea (Schaeff.) Quél. 2963 Syn. : Clavaria aurea Nom français : Clavaire dorée Habitat : Souvent sous feuillus, surtout sous hêtres. Odeur : Agréable, herbacée, rappelant le bois. Fructifications coralloïdes, à tronc massif, court, blanc. Rameaux courts, jaune citron clair à saumon.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Comestible	Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko 1124 Syn. : Hygrocybe virginea - Cuphophyllus niveus Hygrophorus virgineus Nom français : Hygrophore virginal Habitat : Dans l'herbe des prairies et des pelouses. Odeur : Nulle. Chapeau hygrophane, blanc à crème ochracé. Lames très décurretes, blanches à crème - Stipe blanc.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae  Comestibilité Sans intérêt	Hygrocybe aurantiosplendens R. Aar Haller 1683 Syn. : Hygrophorus aurantiosplendens Nom français : Hygrocybe d'un bel orangé Habitat : Dans l'herbe des prés et des prairies non fertilisés. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau hygrophane, jaune orangé à rouge orangé. Lames orange saumoné - Stipe jaune orangé.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae   Comestibilité A rejeter	Hygrocybe chlorophana (Fr.) Fr. 1688 Syn. : Hygrocybe euroflavescens - Hygrophorus chlorophanus Hygrophorus euroflavescens Nom français : Hygrocybe jaune soufre Habitat : Dans l'herbe des prés et des prairies non fertilisés. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau jaune citron à jaune orangé, visqueux. Stipe visqueux, concolore - Lames jaune citron.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae  Comestibilité Sans intérêt	Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. 1692 Syn. : Hygrophorus coccineus - Pseudohygrocybe coccinea Nom français : Hygrocybe écarlate Habitat : Dans les pelouses, les prairies subalpines. Odeur : Insignifiante. Chapeau rouge coccinelle, hygrophane. Lames adnées, jaune rougeâtre - Pied rouge.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Hygrophoraceae**



Comestibilité **Toxique**



Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.

1694

Syn. : **Hygrophorus conicus** - **Hygrocybe cinereifolia**
Hygrocybe olivaceonigra - **Hygrocybe nigrescens**
Nom français : **Hygrocybe conique**
Habitat : Dans les prés maigres, les alpages.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge tomate à orangé vif ou jaune verdâtre.
Chair noircissante. Lames jaune orangé - Saveur douce

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Hygrophoraceae**

Comestibilité **Sans intérêt**

Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm.

1709

Syn. : **Hygrophorus miniatus** - **Pseudohygrocybe miniata**
Nom français : **Hygrocybe vermillon**
Habitat : Dans l'herbe des prés et des prairies.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau sec, couvert de mèches rouge orangé.
Lames et pied rouges à rouge orangé - Saveur douce.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Hygrophoraceae**

Comestibilité **Sans intérêt**

Hygrocybe quieta (Kühner) Singer

1718

Syn. : **Hygrophorus quietus**
Nom français : **Hygrocybe tranquille**
Habitat : Dans l'herbe des prés et des prairies.
Odeur : De punaise, de Lactarius quietus.

Chapeau hygrophane, jaune citron à jaune orangé.
Stipe concolore - Lames orangées ou saumonées.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Hygrophoraceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.

1732

Syn. :
Nom français : **Hygrophore à odeur agréable**
Habitat : Dans les pessières, sur sols calcaires.
Odeur : D'amandes amères.

Chapeau gris-beige, obtusément mamelonné.
Pied blanchâtre ou gris, granuleux au sommet.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Hygrophoraceae**

Comestibilité **Comestible**



Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc.

1739

Syn. :
Nom français : **Hygrophore des chevreuils**
Habitat : En montagne sous conifères (Picea).
Odeur : Faible.

Chapeau brun rouge pourpre.
Lames très espacées, brun vineux sombre.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Hygrophoraceae**

Comestibilité **Sans intérêt**



Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea

1745

Syn. : **Hygrophorus chrysaspis**
Nom français : **Hygrophore à disque jaune**
Habitat : Dans les hêtraies, sur sols calcaires.
Odeur : De peau de mandarine à anisée.


Chapeau visqueux, lisse, blanc à crème ochracé.
Brunissement roux vif à partir de la marge.

13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité		Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr.1746 Syn. : Nom français : Hygrophore blanc d'ivoire Habitat : Surtout sous hêtres, parfois tardif. Odeur : De jacinthe ou de mandarine. Chapeau très visqueux, blanc pur, immuable. Stipe blanc à crème, aminci à la base, visqueux.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité Comestible		Hygrophorus fagi G. Becker & Bon1749 Syn. : Hygrophorus penarius var. fagi Nom français : Hygrophore du hêtre Habitat : Toujours sous hêtres. Odeur : Non caractéristique. Chapeau sec, blanc crème lavé de rose - Stipe déjeté. Lames décurrentes, espacées, crème à reflets rosés.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité Sans intérêt		Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr.1773 Syn. : Nom français : Hygrophore pudibond Habitat : Ubiquiste, sous sapins, jusqu'en zone alpine. Odeur : Résineuse, de térébenthine. Chapeau visqueux, rosé aurore ou saumon. Stipe ferme, à reflets jaune-orange, visqueux.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité Comestible		Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr.) Bataille1778 Syn. : Nom français : Hygrophore russule Habitat : Sous feuillus (surtout chênes et hêtres). Odeur : Fruitée, agréable. Chapeau charnu, vite taché de rose vineux. Chair blanchâtre ou teintée de rose, +/- amère.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gloeophyllales Fam. Gloeophyllaceae Comestibilité Sans intérêt		Neolentinus adhaerens (Alb. & Schwein.) Redhead & Ginns2610 Syn. : Lentinus adhaerens Nom français : Lentin collant Habitat : Sur bois mort de conifères (surtout sapins). Odeur : Non caractéristique. Chapeau arrondi, bombé, ou réniforme, collant. Lames sécrétant des gouttes résineuses serrulées.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Pleurotaceae Comestibilité Sans intérêt		Pleurotus eryngii var. laserpitii Angeli & Scandurra2825 Syn. : Nom français : Pleurote des ombellifères Habitat : Sur Laserpitium en montagne. Odeur : Nulle. Chapeau flabelliforme, de 8-15 cm - Stipe excentrique. Lames blanches, non décurrentes, espacées.

14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Physalacriaceae  Comestibilité Toxique		Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm. 188 Syn. : Nom français : Armillaire couleur de miel Habitat : Sur racines et souches de feuillus, des arbres fruitiers. Odeur : Agréable, fongique. Parasite virulent - Chapeau brun olive - Stipe glabre. Anneau membraneux - Lames subdécurrentes.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Physalacriaceae  Comestibilité Toxique		Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 189 Syn. : Armillariella ostoyae Nom français : Armillaire d'Ostoya Habitat : Souvent sur souches et racines d'épicéas. Odeur : Faible, de polypore. Chapeau brun-roux, couvert de mèches brun noirâtre. Anneau membraneux - Lames un peu décurrentes.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Toxique		Clitocybe metachroa (Fr.) Fr. 420 Syn. : Clitocybe bicolor - Clitocybe decembris Nom français : Clitocybe à chapeau bicolore Habitat : Généralement sous conifères, sur litières d'aiguilles. Odeur : Herbacée ou un peu terreuse, non farineuse. Chapeau hygrophane, brun +/- pâle, à marge striée. Lames décurrentes, grisâtres - Stipe grisonnant.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Toxique		Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 421 Syn. : Lepista nebularis Nom français : Clitocybe nébuleux Habitat : En lisière des bois, souvent en ronds de sorcières. Odeur : Farino-spermatique, plutôt désagréable. Chapeau gris prumineux - Lames adnées-décurrentes. Stipe en massue, grisâtre pâle - Chair épaisse, grise.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Incertae sedis  Comestibilité Comestible		Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 424 Syn. : Nom français : Clitocybe anisé Habitat : Feuillus et conifères, surtout en montagne. Odeur : Fortement anisée. Chapeau vert à gris-vert, parfois décoloré, mat. Lames adnées, blanches ou verdâtres - Saveur douce.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Toxique		Clitocybe phyllophila Pers. 429 Syn. : Clitocybe cerussata - Clitocybe pithyophila Nom français : Clitocybe des feuilles Habitat : Souvent sur litières d'aiguilles donc mal nommé. Odeur : Faible et agréable, légèrement farineuse. Chapeau blanc, prumineux-givré - Chair plutôt élastique. Lames adnées, blanches à beiges. Sporée crème-ocre.

14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Comestible		Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja1834 Syn. : Clitocybe geotropa Nom français : Tête de moine Habitat : Ubiquiste, en plaine et en montagne. Odeur : Fortement cyanique. Grande espèce, largement mamelonnée. Stipe plein puis spongieux, concolore, fibrilleux.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hydnangiaceae  Comestibilité Comestible		Laccaria amethystinaCooke1987 Syn. : Laccaria amethystea Laccaria laccata var. amethystina Nom français : Laccaire améthyste Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères. Odeur : Légèrement fruitée. Chapeau hygrophane, violet foncé puis pâlisant. Lames très espacées, larges, épaisses, violettes.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hydnangiaceae  Comestibilité Comestible		Laccaria laccata(Scop.) Cooke1989 Syn. : Nom français : Laccaire laqué Habitat : Dans les bois, au bord des chemins. Odeur : Insignifiante. Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisce. Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Incertae sedis  Comestibilité Toxique		Leucocybe connata(Schumach.) Vizzini et al.2300 Syn. : Clitocybe connata - Lyophyllum connatum Nom français : Clitocybe en touffes Habitat : Au bord des chemins, en troupes et fasciculés. Odeur : Herbacée, de petits pois ou de haricots. Chapeau blanc pur ou glacé, soyeux, marbré de gris. Chair blanche, cartilagineuse - Pieds blancs, connés.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Sans intérêt		Pseudoclitocybe cyathiformis(Bull.) Singer2934 Syn. : Clitocybe cyathiformis - Omphalia cyathiformis Nom français : Clitocybe en coupe Habitat : Dans les endroits herbeux, en bordure des chemins. Odeur : Cyanique. Chapeau en entonnoir, hygrophane, marron à gris. Lames décurrentes, falciformes, pentues, brun clair.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Sans intérêt		Melanoleuca exscissa(Fr.) Singer2431 Syn. : Melanoleuca kuehneri Nom français : Melanoleuca de Kühner Habitat : Dans les pelouses, les fourrés. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau gris +/- sombre, prumineux - Lames crème pâle Stipe subconcolore, poudré - Chair pâle.

15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Sans intérêt		Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill 2429 Syn. : Melanoleuca subbrevipes Nom français : Melanoleuca à pied rayé Habitat : Dans les prairies, les pré-bois, souvent en rond. Odeur : Un peu spermatique ou de fleur de sureau. Grande espèce à chapeau largement mamelonné. Stipe entièrement strié de bistre pâle.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Toxique		Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. 3479 Syn. : Nom français : Tricholome blanc Habitat : Sous feuillus, en terrain siliceux, surtout sous chênes. Odeur : Aromatique à subfarineuse, vite désagréable. Chapeau blanc, à marge enroulée, non cannelée. Stipe élancé, pruineux au sommet - Saveur âcre.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma atosquamosum Sacc. 3484 Syn. : Tricholoma nigromarginatum Tricholoma squarulosum Nom français : Tricholome à squames noires Habitat : Sous feuillus et conifères (hêtres, épicéas, chênes ...). Odeur : Nettement poivrée. Chapeau gris sombre, fibrilleux-squamuleux. Arête des lames pointillée de noir - Stipe blanchâtre.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma batschii Gulden ex Mort. Chr. & Noordel. 3487 Syn. : Tricholoma fracticum sensu auct. Tricholoma subannulatum Nom français : Tricholome de Batsch Habitat : Sous conifères, surtout sous pins. Odeur : Farineuse à la coupe. Chapeau brun-roux - Saveur amère - Lames blanches. Présence d'une zone blanche au sommet du pied.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma colossus (Fr.) Qué. 3499 Syn. : Megatracholoma colossus Nom français : Tricholome colosse Habitat : Sous conifères, pins surtout, en montagne. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau de 10-25 cm, blanchâtre puis brun-roux. Stipe en massue, blanc puis brunissant par la base.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité A rejeter		Tricholoma columbetta (Fr.) Fr. 3500 Syn. : Tricholoma impolitum Nom français : Tricholome columbette Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres, en terrain acide. Odeur : Faible. Chapeau blanc pur, satiné - Chair ferme, blanche. Stipe robuste, blanc, taché de bleu-vert à la base.

15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Tricholoma fulvum DC. 3510 Syn. : Tricholoma flavobrunneum Nom français : Tricholome fauve Habitat : Sous feuillus, surtout sous bouleaux. Odeur : De farine rance. Chapeau brun roux, à marge cannelée - Lames jaunes. Stipe concolore, jaune au sommet - Saveur farineuse.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  TOXIQUE Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma inamoenum (Fr.) Fr. 3515 Syn. : Nom français : Tricholome à odeur désagréable Habitat : En montagne, dans les pessières à myrtilles. Odeur : Désagréable, de soufre, de gaz d'éclairage. Chapeau blanchâtre - Lames espacées, épaisses. Stipe blanc pur - Chair épaisse - Saveur écœurante.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  COMESTIBLE Comestibilité Comestible		Tricholoma orirubens Qué. 3526 Syn. : Nom français : Tricholome rougissant Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout sous hêtres. Odeur : Farineuse. Chapeau gris-noir, pelucheux - Base du pied bleutée. Arête des lames rougissantes - Saveur farineuse.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Tricholoma pessundatum (Fr.) Fr. 3529 Syn. : Nom français : Tricholome à détruire Habitat : Sous conifères, surtout sous les pins. Odeur : Forte de farine ou de pastèque. Chapeau brun-roux, souvent guttulé - Chair blanche. Lames et pied piquetés de roux - Saveur amarescente.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  COMESTIBLE Comestibilité Comestible		Tricholoma portentosum (Fr.) Fr. 3532 Syn. : Nom français : Tricholome prétentieux Habitat : Dans les pinèdes et les pessières, tard en saison. Odeur : D'huîtres, de marée. Chapeau gris ardoisé, fibrilleux radialement. Lames à reflets jaunes - Stipe fibrilleux, lavé de jaune.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  COMESTIBLE Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 3544 Syn. : Tricholoma boudieri Nom français : Tricholome à odeur de savon Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne. Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide. Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante. Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.

15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Comestible	 Tricholoma scalpturatum Charles Rougier	Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. 3548 Syn. : Nom français : Tricholome gravé Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des chemins. Odeur : De farine, au moins à la coupe. Chapeau grisâtre, feutré-laineux, squamuleux. Lames jaunissantes - Saveur farineuse - Stipe blanc.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae TOXIQUE Comestibilité Toxique	 Tricholoma sciodes Charles Rougier	Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin 3550 Syn. : Tricholoma sciodellum Tricholoma virgatum var. sciodes Nom français : Tricholome gris perfide Habitat : Surtout sous hêtres, en zone calcaire. Odeur : Faible, un peu terreuse, herbacée. Chapeau grisâtre, à reflets lilacins, fibrilleux. Saveur amère puis âcre - Lames bordées de noir.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt	 Tricholoma bufonium Charles Rougier	Tricholoma sulphureum Bull. 3558 Syn. : Tricholoma bufonium - Tricholoma subsulphureum Nom français : Tricholome soufré Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Désagréable de gaz d'éclairage. Entièrement jaune soufre (chapeau, pied et lames). Chapeau charnu - Lames jaune vif - Saveur écœurante.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt	 Tricholoma ustale Charles Rougier	Tricholoma ustale (Fr.) Fr. 3565 Syn. : Nom français : Tricholome brûlé Habitat : En montagne, sous feuillus, surtout sous hêtres. Odeur : Subnulle ou faiblement farineuse. Chapeau brun-rouge, visqueux, fibrilleux. Arête des lames ponctuée puis liserée de brun-noir.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt	 Tricholoma vaccinum Charles Rougier	Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. 3568 Syn. : Nom français : Tricholome couleur de vache Habitat : Surtout sous conifères, parfois sous feuillus (saules). Odeur : Peu agréable, herbacée, un peu farineuse. Chapeau brun fauve, squamuleux, à marge laineuse. Saveur un peu amère - Stipe blanc à fibrilleux de roux.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae TOXIQUE Comestibilité Toxique	 Tricholoma virgatum Charles Rougier	Tricholoma virgatum (Fr.) Fr. 3569 Syn. : Nom français : Tricholome vergeté Habitat : Sous conifères et feuillus. Odeur : Faible, un peu terreuse. Chapeau gris argenté, vergeté, à mamelon saillant. Lames glauques - Saveur amère puis âcre.

15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 3576 Syn. : Tricholoma rutilans Nom français : Tricholome rutilant Habitat : Sur souches de conifères. Odeur : Faible de moisi. Chapeau jaune, orné de petites écailles pourpre violet. Chair jaune vif - Saveur amarescente - Lames jaune vif.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Lyophyllaceae Comestibilité Sans intérêt		Calocybe favrei (R. Haller Aar & R. Haller) Suhrh) Bon 2361 Syn. : Lyophyllum favrei Nom français : Lyophylle de Favre Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : De farine rance ou de moisi. Chapeau gris-bleu violacé, feutré-laineux. Lames jaunes, lames et pied rosissant au toucher.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Comestible		Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow 2233 Syn. : Rhodopaxillus irinus Nom français : Lépiste à odeur d'iris Habitat : Dans les bois mêlés, surtout en montagne. Odeur : Aromatique, d'iris, de fleur d'oranger. Espèce massive à silhouette tricholomoïde. Chapeau hygrophane beige à brunâtre.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Lepista nuda Bull. 2237 Syn. : Rhodopaxillus nudus Nom français : Pied bleu Habitat : En ligne ou en rond sous conifères, plutôt tardif. Odeur : Fruitée à farino-spermatique. Chapeau largement mamelonné, lilacin, glabre. Stipe rayé-ridulé, entièrement bleuté.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotlaba 2307 Syn. : Leucopaxillus amarus Nom français : Leucopaxille amer Habitat : Sous conifères et feuillus, parmi les bruyères. Odeur : Farineuse, aromatique, de concombre. Chapeau brun rosâtre, sec - Saveur très amère. Lames très serrées, séparables - Chair blanche.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Lyophyllaceae Comestibilité Comestible		Lyophyllum decastes (Fr.) Singer 2357 Syn. : Lyophyllum aggregatum - Tricholoma aggregatum Nom français : Lyophylle aggrégé Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les endroits herbeux. Odeur : Nulle. Chapeau noisette à brun-gris - Chair élastique. Stipes blanchâtres, aggrégés - Saveur douce.

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae



Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini

2669

Syn. : **Lepista flaccida** - **Clitocybe inversa**
Lepista inversa

Nom français : **Clitocybe inversé des feuillus**

Habitat : Sous feuillus.

Odeur : Fongique.

Chapeau toujours en entonnoir, fauve vif, flasque.

Lames arquées-décurrentes, non brunissantes.

Comestibilité **Comestible**

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae



Gymnopus fusipes (Bull.) Gray

1503

Syn. : **Collybia fusipes**

Nom français : **Collybie à pied en fuseau**

Habitat : En touffes, sur souches et racines de feuillus.

Odeur : Fongique, agréable.

Chapeau brun rougeâtre, piqueté de rouille.

Stipes fusiformes, radicants, striés-sillonnés.

Comestibilité **Sans intérêt**

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Marasmiaceae



Marasmius oreades (Bolton) Fr.

2413

Syn. :

Nom français : **Marasme des oréades**

Habitat : Au printemps, dans les prés, pâturages et alpages.

Odeur : Fortement cyanique.

Chapeau brun-roux, hygrophane et lames espacées.

Dans l'herbe en ronds de sorcières.

Comestibilité **Comestible**

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae



Mycena epipterygia (Scop.) Gray

2493

Syn. : **Prunulus epipterygius**

Nom français : **Mycène des fougères**

Habitat : Sur humus et débris végétaux, feuilles ou aiguilles.

Odeur : Subnulle ou farineuse rance.

Chapeau jaune citrin - Stipe visqueux, jaune citrin vif.

Une pellicule visqueuse séparable couvre le chapeau.

Comestibilité **Sans intérêt**

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae



Mycena rosea Gramberg

2558

Syn. : **Mycena pura fo. et var. rosea**

Nom français : **Mycène rose**

Habitat : Surtout sous feuillus, sur terre nue, parmi les feuilles.

Odeur : Raphanoïde.

Chapeau de couleur vieux rose, hygrophane.

Stipe blanc à rose pâle, finement fibrilleux.

Comestibilité **Toxique**

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae



Mycena zephyrus (Fr.) P. Kumm.

2583

Syn. :

Nom français : **Mycène élégant**

Habitat : Plutôt montagnard, parmi les aiguilles de conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brunâtre, se tachant de brun roussâtre.

Stipe fragile, +/- teinté de rougeâtre, hérissé à la base.

Comestibilité **Sans intérêt**

19 - Les Lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Sans intérêt		Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk344 Syn. : Lepiota irrorata Nom français : Lépiote guttulée Habitat : Dans l'herbe, à l'orée des forêts, sur sol calcaire. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau crème ochracé - Lames sublibres, pâles. Stipe ponctué de brun sous une zone annulaire nette.
19 - Les Lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Comestible		Chlorophyllum rhacodes (Vittadin.) Vellinga356 Syn. : Lepiota rhacodes - Macrolepiota rhacodes Nom français : Lépiote déguenillée Habitat : Dans les prés-bois, les taillis, souvent sous conifères. Odeur : Faible mais agréable. Chapeau brun terne, couvert de mèches retroussées. Stipe bulbeux, rougissant au grattage - Anneau double.
19 - Les Lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Sans intérêt		Cystoderma amianthinum fo. rugosoreticulatum (F. Lorinser) A.H. Sm & Singer3689 Syn. : Cystoderma amianthinum var. rugosoreticulatum Nom français : Cystoderme à chapeau ridé Habitat : Sous conifères, sur humus ou tapis d'aiguilles. Odeur : De moisi, d'insecticide, de lindane. Diffère du type par le revêtement de son chapeau, profondément ridé radialement.
19 - Les Lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Sans intérêt		Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod1142 Syn. : Nom français : Cystoderme à dents de requin Habitat : Sous conifères, dans les mousses, sur les aiguilles. Odeur : Désagréable, de moisi ou de gaz d'éclairage. Chapeau gris rose, granuleux, à marge appendiculée. Stipe couvert d'une armille surmontée d'un anneau.
19 - Les Lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Sans intérêt		Cystoderma fallax A.H. Sm. & Singer1143 Syn. : Cystoderma carcharias var. fallax Nom français : Cystoderme trompeur Habitat : Sous conifères. Odeur : Désagréable de moisi, terreuse. Diffère du type par la couleur brun-ocre à brun rouille du carpophore et par l'anneau plus ample, bien formé.
19 - Les Lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Toxique		Echinoderma echinaceum (J.E. Lange) Bon1210 Syn. : Cystolepiota echinacea - Lepiota echinacea Nom français : Lépiote épineuse Habitat : Sur sol nu, sous feuillus et conifères. Odeur : Plutôt fruitée, un peu de Lepiota cristata. Chapeau orné de squamules hérissées brunes sur fond brun-rouge - Stipe cerclé d'une armille concolore.

19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Toxique	 <i>Lepiota felina</i> Charles Rougier	Lepiota felina (Pers.) P. Karst. 2197 Syn. : Nom français : Lépiote féline Habitat : Sous conifères. Odeur : De pélargonium, de bois de cèdre. Chapeau orné de squamules bistre-sépia sombre. Stipe annelé, guirlandé de squamules noirâtres.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible	 <i>Macrolepiota mastoidea</i> Charles Rougier	Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer 2385 Syn. : Macrolepiota gracilentata - Macrolepiota konradii Macrolepiota rickenii - Macrolepiota affinis Nom français : Lépiote mamelonnée Habitat : Dans les pâtures, les parcs, les sentiers herbeux. Odeur : Nette de beurre fondu. Chapeau à mamelon obtus, orné d'écailles brunes disposées régulièrement et concentriquement.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible	 <i>Macrolepiota procera</i> Charles Rougier	Macrolepiota procera (Scop.) Singer 2387 Syn. : Lepiota procera Nom français : Lépiote élevée (Coulemelle) Habitat : Dans les prés, les lisières ou clairières gramineuses. Odeur : Faible, fongique. Reconnaissable à sa grande taille, à son chapeau squameux, à son stipe chiné, à son anneau coulissant.
20 - Les agarics Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible	 <i>Agaricus langei</i> Charles Rougier	Agaricus langei (F.H. Møller) F.H. Møller 32 Syn. : Agaricus var. mediofuscus Nom français : Agaric de Lange Habitat : Sous conifères. Odeur : Odeur agréable mais non caractéristique. Chair fortement rougissante - Anneau juponnant. Stipe cylindrique, non bulbeux.
20 - Les agarics Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible	 <i>Agaricus sylvicola</i> Charles Rougier	Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck 50 Syn. : Nom français : Agaric sylvicole Habitat : Forêts de feuillus et de conifères. Odeur : Forte odeur anisée. Grande espèce - Chapeau blanc, jaunissant. Lames blanc rosâtre à rose - Anneau membraneux.
21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Psathyrellaceae  Comestibilité Toxique	 <i>Coprillus micaceus</i> Charles Rougier	Coprillus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson 496 Syn. : Coprinus micaceus Nom français : Coprin micacé Habitat : Sur ou autour du bois mort, parfois +/- enterré. Odeur : Nulle. Chapeau brun-roux à voile fugace micacé ou granuleux. Lames vite déliquescentes - Stipe blanc, pubescent.

21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Psathyrellaceae  Comestibilité Sans intérêt	Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 528 Syn. : Coprinus picaceus Nom français : Coprin pie Habitat : Forêts de feuillus (surtout hêtres et châtaigniers). Odeur : Plutôt désagréable, de naphtaline, de bitume. Chapeau orné de grossières écailles blanches. Stipe blanc, floconneux - Lames blanches puis noires.
21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Psathyrellaceae  Comestibilité Toxique	Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quéi. 2659 Syn. : Panaeolus sphinctrinus - Panaeolus campanulatus Nom français : Panéole à marge du chapeau dentée Habitat : Dans les pâturages, sur excréments d'herbivores. Odeur : Non caractéristique. Chapeau conique-campanulé, noir olivacé, à marge fermée par des lambeaux triangulaires du voile.
21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Psathyrellaceae  Comestibilité Sans intérêt	Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton 2918 Syn. : Psathyrella hydrophila - Psathyrella subpapillata Nom français : Psathyrelle hydrophile Habitat : En touffes sur feuillus. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau très hygrophane, brun rougeâtre à ochracé. Voile abondant - Stipe blanc à ochracé - Lames brunes.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilité A rejeter	Amanita citrina (Schaeff.) Pers. 103 Syn. : Nom français : Amanite citrine Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Raphanoïde. Chapeau jaune citrin - Stipe orné d'un bulbe globuleux. Volve membraneuse circoncise - Saveur douce.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilité Toxique	Amanita echinocephala (Vittad.) Quéi. 113 Syn. : Amanita solitaria Nom français : Amanite épineuse Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain calcaire. Odeur : Odeur non caractéristique. Espèce thermophile - Anneau ample et pendant. Chapeau couvert de verrues pyramidales aiguës.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilité Toxique	Amanita gemmata (Fr.) Bertill. 127 Syn. : Amanita jonquillea Nom français : Amanite jonquille Habitat : Surtout sous feuillus (châtaigniers), en terrain acide. Odeur : Nulle ou légèrement raphanoïde. Chapeau de jaune citrin à jaune orangé. Volve peu développée - Stipe blanc, floconneux.

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae



Comestibilité Toxique



Amanita muscaria (L.) Lam.

130

Syn. :

Nom français : **Amanite tue-mouches**

Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs.

Anneau membraneux, juponnant - Lames blanches.

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible



Amanita rubescens (Pers.) Gray

152

Syn. :

Nom français : **Amanite rougissante (Golmotte)**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Rougisement de la chair - Anneau ample et strié. Volve friable - Stipe napiforme.

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Sans intérêt



Amanita submembranacea (Bon) Gröger

160

Syn. : **Amanitopsis submembranacea**

Nom français : **Amanite à volve grise**

Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain acide.

Odeur : Non caractéristique.

Espèce robuste à chapeau brun-jaune nuancé d'olive.

Volve semi-membraneuse, de couleur grise.

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible



Amanita vaginata (Bull.) Lam.

162

Syn. :

Nom français : **Amanite vaginée**

Habitat : Ubiquiste, sans liaison avec des essences précises.

Odeur : Inodore.

Stipe sans anneau - Chapeau grisâtre, mamelonné.

Volve membraneuse, très engainante - Spores rondes.

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Entolomataceae



Comestibilité Comestible



Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kummer

450

Syn. :

Nom français : **Meunier**

Habitat : Sous feuillus et résineux, dans les clairières.

Odeur : Fortement farineuse.

Chapeau de forme variable, blanchâtre, cassant.

Lames très décurrentes, blanches puis roses.

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Pluteaceae

Comestibilité Sans intérêt



Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl.

2866

Syn. : **Pluteus lutescens - Pluteus splendidus**

Nom français : **Plutée de Romell**

Habitat : Sur souches ou débris de bois de feuillus.

Odeur : Subnulle à légèrement herbacée.

Chapeau brun de datte à brun-jaune, à marge striée.

Stipe jaune clair à citrin, fibrilleux longitudinalement.

23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Pluteaceae  Comestibilité Toxique		Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. 2868 Syn. : Nom français : Plutée du saule Habitat : Sur souches ou débris de bois de feuillus (saules). Odeur : Légèrement raphanoïde. Chapeau gris perle nuancé de verdâtre, fibrilleux. Stipe fibrilleux longitudinalement de blanc.
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Pluteaceae Comestibilité Sans intérêt		Volvopluteus gloiocephalus DC. 3628 Syn. : Volvariella gloiocephala - Volvariella speciosa Nom français : Volvaire à chapeau visqueux Habitat : Dans les prés, les pâtures, sur débris végétaux. Odeur : Raphanoïde, de moisi. Chapeau gris-brun nuancé d'olivâtre, visqueux. Lames larges, blanches puis roses - Stipe rigide.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Calonarius elegantior (Fr.) Niskanen & Liimat. 704 Syn. : Cortinarius elegantior Nom français : Cortinaire élégant Habitat : Dans les pessières, juqu'à 2 000 m d'altitude. Odeur : Faible, insignifiante. Chapeau brun-jaune uniforme - Lames jaune olivacé. Voile jaunâtre pâle - Stipe bulbeux-marginé-turbiné.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius acutovelatus Rob. Henry 3674 Syn. : Nom français : Cortinaire à chapeau aigu et voilé Habitat : En montagne, sous épicéas dans les marais. Odeur : Iodée - Saveur douce de rave. Espèce grêle - Chapeau 15-20 mm, fauve orangé orné d'un mamelon pointu - Stipe long, fibrilleux blanchâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius acutus (Pers.) Fr. 548 Syn. : Nom français : Cortinaire à mamelon pointu Habitat : En montagne, dans les pessières, les tourbières. Odeur : Iodée. Espèce grêle - Stipe long, ocre miel. Chapeau fauve orné d'un mamelon pointu typique.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius armeniacus (Schaeff.) Zawadzki 578 Syn. : Cortinarius privignorum Nom français : Cortinaire abricot Habitat : Sous conifères de montagne (pins, épicéas). Odeur : Fruitée. Chapeau très hygrophane, brun orangé à ocre pâle. Lames brun ochracé - Stipe claviforme - Voile blanc.

24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. 579 Syn. : Nom français : Cortinaire armillé Habitat : Dans les lieux humides, sous bouleaux. Odeur : Faiblement raphanoïde, herbacée. Chapeau couvert de fines mèches brun-rouge. Stipe orné de guirlandes issues du voile rouge orangé.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr. 615 Syn. : Cortinarius colus - Cortinarius pseudocolus Nom français : Cortinaire de Bulliard Habitat : Sous feuillus, surtout dans les hêtraies calcaires. Odeur : Désagréable, acerbe, subspermatique. Chapeau hygrophane, brun châtain à brun acajou. Lames brun pourpre - Base du stipe rouge cinabre vif.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité A rejeter		Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. 627 Syn. : Cortinarius amethystinus - Cortinarius hircinus Nom français : Cortinaire camphré (à odeur de bouc) Habitat : En montagne, sous conifères, sur sols plutôt acides. Odeur : Désagréable d'acétylène, de corne brûlée. Chapeau gris-bleu pâle puis envahi d'ochracé. Lames violettes - Stipe bleu lilas pâle puis jaunissant.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius chrysolitus Kauffman 642 Syn. : Cortinarius huronensis - Cortinarius palustris Nom français : Cortinaire à voile jaune olivâtre Habitat : Sous conifères (sapins, épicéas), dans les sphaignes. Odeur : Faible ou terreuse. Chapeau brun olive, finement squamuleux-écailleux. Stipe brun olive, orné des restes du voile jaune olivâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius decipiens (Pers.) Zawadzki 683 Syn. : Cortinarius sertipes Nom français : Cortinaire trompeur Habitat : Sous feuillus (bouleaux, saules ...) en zones humides. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau hygrophane brun sombre - Stipe grisâtre. Voile blanc à la marge du chapeau et sur le pied.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius delibutus Fr. 687 Syn. : Nom français : Cortinaire à lames lilas Habitat : Dans les pessières de montagne. Odeur : Insignifiante ou légèrement raphanoïde. Chapeau visqueux, jaune à jaune ochracé - Lames lilas - Stipe blanc, à sommet lilas, se tachant d'ochracé.

24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius finitimus (Weinm.) P. Karst. 719 Syn. : Cortinarius traganus var. finitimus Cortinarius traganus fo. ochraceus Nom français : Cortinaire à odeur fruitée Habitat : En montagne, sous conifères (épicéas). Odeur : Agréable de mirabelle ou de poire. Chapeau lilas pâle à ochracé pâle - Chair jaune safran. Stipe claviforme, concolore, fibrilleux-soyeux.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius largus Fr. 794 Syn. : Cortinarius lividoviolaceus Nom français : Cortinaire à voile abondant Habitat : Dans les forêts de feuillus (hêtres), sur sol calcaire. Odeur : Nulle ou faiblement iodée à un peu fruitée. Chapeau visqueux, gris bleuâtre - Lames bleu lilas. Stipe violacé au sommet - Voile blanc, abondant.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius malicorius Fr. 814 Syn. : Cortinarius croceifolius Nom français : Cortinaire à chair olive Habitat : Dans les pessières, en montagne, sur sols calcaires. Odeur : Légèrement raphanoïde ou iodée. Chapeau brun-rouge, couvert par un voile orangé vif. Chair olive foncé - Stipe jaune orangé - Saveur douce.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Mortel		Cortinarius orellanus Fr. 860 Syn. : Nom français : Cortinaire couleur de rocou Habitat : Sous chênes et châtaigniers, en terrain sec et chaud. Odeur : Subtile odeur raphanoïde. Chapeau brun orangé - Lames distantes, orangées. Stipe couleur de laiton, nu - Voile très ténu.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius privignofulvus Rob. Henry 900 Syn. : Nom français : Cortinaire aux couleurs fauves Habitat : Dans les forêts humides, sous conifères ou bouleaux. Odeur : Non caractéristique. Chapeau jaune fauve à abricot - Lames beiges à fauves. Stipe gainé, blanc puis jaunissant.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Mortel		Cortinarius semisanguineus (Fr.) Fr. 965 Syn. : Nom français : Cortinaire semi-sanguin Habitat : Forêts de conifères de montagne, rare sous feuillus. Odeur : Odeur +/- raphanoïde. Lames rouge sang - Chapeau jaune olivacé, feutré. Stipe juste un peu rougeâtre à la base.

24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius traganus (Fr.) Fr. 1020 Syn. : Nom français : Cortinaire à odeur de poire Habitat : En montagne, dans les pessières plutôt non calcaires. Odeur : Forte odeur d'acétylène, de poire (alcool). Chapeau lilas violacé puis ochracé - Lames brunes. Chair safranée ou brun-roux.- Stipe lilas puis brunâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Comestible		Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. 1040 Syn. : Nom français : Cortinaire variable Habitat : En montagne, exclusivement associé à l'épicéa. Odeur : Faible, un peu fétide à la coupe. Chapeau visqueux, jaune orangé +/- vif - Lames lilas. Stipe en massue, blanc, à voile blanchâtre peu épais.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius venetus (Fr.) Fr. 1041 Syn. : Nom français : Cortinaire vert olive Habitat : Dans les hêtraies-sapinières de montagne. Odeur : Raphanoïde. Chapeau brun olivâtre, fibrilleux, feutré à squamuleux. Stipe et voile jaune olive - Lames vert olive à brun olive.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius violaceus (L.) Gray 1050 Syn. : Nom français : Cortinaire violet Habitat : Sous feuillus, peut être sous conifères. Odeur : De cuir de Russie ou de bois de cèdre. Chapeau fortement velouté, bleu-violet - Lames violettes Stipe concolore au chapeau - Saveur douce.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Phlegmacium eucaeruleum (Rob. Henry) Niskanen & Liimat. 712 Syn. : Cortinarius eucaeruleus Nom français : Cortinaire bleu Habitat : Sous différents feuillus, sur sol calcaire. Odeur : Un peu caoutchouteuse. Chapeau visqueux, bleu violacé profond - Saveur douce. Stipe à marge nette ourlée par le voile bleu violacé.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Sans intérêt		Phlegmacium herculeum (Malençon) Niskanen & Liimat. 763 Syn. : Cortinarius herculeus Nom français : Cortinaire herculéen Habitat : Exclusivement lié aux cèdres. Odeur : De chocolat puis terreuse et désagréable. Chapeau de 5-20 cm, beige crème - Chair blanche. Voile blanc, abondant, visible sur le chapeau et le stipe.

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae



Comestibilité Sans intérêt

Phlegmacium triumphans (Fr.) A. Blytt

1024

Syn. : Cortinarius crocolitus - Cortinarius triumphans

Nom français : Cortinaire triomphant

Habitat : Sous bouleaux et autres feuillus, en terrain siliceux.

Odeur : Insignifiante ou terreuse.

Chapeau jaune ochracé - Lames blanches à crème.

Stipe chiné de bracelets jaune roussâtre.

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae



Comestibilité Toxique



Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen & Liimat.

922

Syn. : Cortinarius eumarginatus - Cortinarius purpurascens

Nom français : Cortinarius purpurescent

Habitat : Sous conifères (épicéas), sur sols acides.

Odeur : Nulle.

Chapeau visqueux, gris-bleu, orné de fibrilles brunes.

Lames se tachant de violet sombre au froissement.

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

Comestibilité Sans intérêt

Thaxterogaster vibratilis (Fr.) Niskanen & Liimat.

1049

Syn. : Cortinarius vibratilis

Nom français : Cortinaire scintillant

Habitat : Surtout sous épicéas, sur sols calcaires.

Odeur : Légère, non typique.

Chapeau jaune ochracé, à viscosité très amère.

Stipe blanc, visqueux - Lames beige café au lait.

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae



Comestibilité Toxique

Hebeloma leucosarx P.D. Orton

1560

Syn. :

Nom français : Hébélome à chair blanche

Habitat : Dans les endroits humides, dans les sphaignes.

Odeur : Raphanoïde.

Petit hébélome, visqueux, brun jaunâtre.

Lames excrétant des gouttelettes limpides.

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Inocybaceae



Comestibilité Toxique



Inocybe geophylla P. Kumm.

1887

Syn. :

Nom français : Inocybe à lames terreuses

Habitat : En terrain humide, surtout sous feuillus.

Odeur : Spermatique.

Chapeau blanc, mamelonné, soyeux.

Lames pâles à brun ochracé, plutôt serrées.

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Inocybaceae



Comestibilité Toxique

Inocybe langei R. Heim

1911

Syn. :

Nom français : Inocybe de Lange

Habitat : Sous différents feuillus.

Odeur : Spermatique.

Chapeau couvert de mèches fauves ou brun jaunâtre.

Stipe crème paille, entièrement pruineux.

25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae  Comestibilité Toxique		Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc. 1971 Syn. : Inocybe pudica Nom français : Inocybe pudique Habitat : Surtout sous conifères hygrophiles. Odeur : Spermatique. Chapeau fibrillo-soyeux, blanc puis rose brique. Stipe blanc puis rosâtre, poudré au sommet.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae Comestibilité Sans intérêt		Agrocybe rivulosa Nauta 67 Syn. : Nom français : Agrocybe rivuleux Habitat : Dans les parcs, sur tas de bois fragmenté. Odeur : Très légèrement farineuse. Chapeau brun à jaune paille, ridé-veiné. Stipe blanc jaunâtre - Présence d'un anneau évident.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae Comestibilité Sans intérêt		Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. 1104 Syn. : Nom français : Crépidote variable Habitat : Sur brindilles de feuillus, rarement sur conifères. Odeur : Insignifiante ou nulle. Espèce sessile - Chapeau blanc de lait, velouté. Spores +/- cylindriques et nettement verruqueuses.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Comestible		Cyclocybe cylindracea (DC) Vizzini & Angelini 1133 Syn. : Agrocybe aegerita - Agrocybe cylindracea Pholiota cylindracea Nom français : Pholiote du peuplier Habitat : En touffes, surtout sur troncs et racines de peupliers. Odeur : Fruitée ou de lait caillé. Chapeau ridé, brun chocolat à beige - Lames beiges. Stipe blanc, orné d'un anneau membraneux.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hymenogastraceae  Comestibilité Mortel		Galerina marginata (Batsch) Kühner 1409 Syn. : Galerina unicolor - Galerina autumnalis Nom français : Galère marginée Habitat : Sur bois mort de conifères, dans la mousse, au sol. Odeur : Farineuse. Espèce brun-ocre à chapeau hygrophane. Présence d'un anneau membraneux fugace.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Toxique		Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill 1484 Syn. : Gymnopilus stabilis - Gymnopilus hybridus Nom français : Gymnopile pénétrant Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus. Odeur : Légèrement herbacée. Chapeau feutré, jaune orangé - Cortine persistante. Lames jaunâtres et saveur amère.

26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Comestible		Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. 1794 Syn. : Geophila capnoides Nom français : Hypholome à lames enfumées Habitat : Sur souches et racines de conifères. Odeur : Plutôt agréable. En touffes, à chapeaux lisses et jaune olive. Lames lavées de lilas puis noirâtres - Saveur douce.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Toxique		Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 1800 Syn. : Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis Nom français : Hypholome en touffes Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères. Odeur : De polypore. En touffes sur les souches ou le bois mort. Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae Comestibilité Sans intérêt		Pholiota lenta (Pers.) Singer 2782 Syn. : Flammula lenta Dryophila lenta Nom français : Pholiote glutineuse Habitat : Sous feuillus et conifères, sur bois dégradé. Odeur : Faible, légèrement iodée. Chapeau beige ochracé jaunâtre, très visqueux, avec des flocons blancs noyés dans le mucus.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae Comestibilité Sans intérêt		Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. 2793 Syn. : Pholiota muelleri Nom français : Pholiote écaillée Habitat : En fascicules à la base des troncs vivants ou morts. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau hérissé d'écailles récurvées concentriques. Stipe très long, flexueux, squarreux-squamuleux.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Toxique		Stropharia aeruginosa (Curtis) Qué. 3387 Syn. : Psilocybe aeruginosa Nom français : Strophaire vert de gris Habitat : En lisière des bois, sur débris végétaux pourrissant. Odeur : Légèrement herbacée. Chapeau bleu-vert, visqueux, à marge appendiculée. Arête des lames blanche - Anneau visqueux, pendant.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula acrifolia Romagn. 3055 Syn. : Nom français : Russule à lames piquantes Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau beige brunâtre, lubrifié, largement déprimé. Stipe blanc taché de rouge - Lames de saveur âcre.

27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm. 3082 Syn. : Russula krombolzii Nom français : Russule pourpre et noire Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les sentiers humides. Odeur : Faible de pommes. Chapeau pourpre sombre - Lames blanches, friables. Saveur d'âcreté modérée - Stipe pruneux au sommet.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula cavipes Britzelm. 3099 Syn. : Nom français : Russule à pied creux Habitat : Surtout sous épicéas. Odeur : Safranée ou de pommes. Chapeau bigarré, violet nuancé d'olive - Lames crème, réagissant en rose avec NH3 - Saveur subdouce.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 3113 Syn. : Nom français : Russule charbonnière Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres. Odeur : Faible, non significative. Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce. Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Russula cyanoxantha Singer 3114 fo. peltereau Syn. : Russula cyanoxantha var. peltereau Nom français : Russule de Peltereau Habitat : Généralement sous hêtres, mais ubiquiste. Odeur : Faible, non significative. Diffère du type uniquement par la couleur de son chapeau, vert amande, vert wagon ou vert concombre.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula fragilis Fr. 3138 Syn. : Russula bataillei - Russula emetica fo. knauthii Russula fragilis var. knauthii - Russula knauthii Nom français : Russule fragile Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les hauts-marais. Odeur : Agréable, de coco ou d'acétate d'amyle. Chapeau fragile, visqueux, rouge violacé à lilas. Saveur très âcre - Lames assez espacées, blanches.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula fuscorubroides Bon 3143 Syn. : Nom français : Sosie de la Russule rouge sombre Habitat : Dans les pessières à myrtilles, en terrain siliceux. Odeur : Légèrement pélargoniée. Chapeau lie de vin à pourpre noirâtre, brillant - Lames ochracées - Saveur très âcre - Stipe rouge pourpre.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Comestible

Russula langei Bon

3172

Syn. :

Nom français : **Russule de Lange**

Habitat : Surtout sous feuillus, en terrain acide.

Odeur : Faible, non significative.

Chapeau violacé sombre - Stipe ferme, lavé de rose.
Lames lardacées, blanches - Saveur douce.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Comestible

Russula mustelina Fr.

3197

Syn. :

Nom français : **Russule couleur de belette**

Habitat : Dans les pessières à myrtilles, en montagne.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Espèce compacte - Chapeau sec, brun noisette.
Saveur douce - Lames crème - Chair épaisse.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Sans intérêt

Russula nigricans Fr.

3200

Syn. :

Nom français : **Russule noircissante**

Habitat : Sous conifères, dans les pessières de montagne.

Odeur : Faible, un peu fruitée.

Chapeau blanchâtre, marbré de bistre - Saveur douce.
Lames espacées - Chair rougissante et noircissante.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Toxique



Russula nobilis Velen.

3189

Syn. : **Russula fageticola - Russula mairei**

Nom français : **Russule de Maire**

Habitat : Sous hêtres, en terrain acide.

Odeur : De coco.

Port robuste et chapeau ferme, d'un beau rouge.
Lames blanc glauque - Saveur âcre - Stipe blanc pur.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Sans intérêt

Russula ochroleuca Pers.

3204

Syn. :

Nom français : **Russule ocre et blanche**

Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des tourbières.

Odeur : Faiblement fruitée.

Chapeau ochracé - Lames blanches à crème pâle.
Saveur âcre à presque douce - Stipe blanc, grisonnant.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Sans intérêt

Russula puellaris Fr.

3229

Syn. :

Nom français : **Russule jeune fille**

Habitat : Surtout sous conifères (épicéas), rare sous feuillus.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Petite espèce à chapeau pourpre - Lames crème.
Saveur subdouce - Jaunissement de toutes les parties.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Sans intérêt

Russula sardonia Fr.

3250

Syn. : **Russula drimeia**

Nom français : **Russule sardoine**

Habitat : Sous pins.

Odeur : Faible ou un peu fruitée.

Chapeau et stipe pourpre violacé - Saveur très âcre.

Lames à reflets citrins, réagissant en rose avec NH3.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Toxique



Russula silvestris (Singer) Reumaux

3256

Syn. : **Russula emetica var. silvestris**
Russula emetica fo. silvestris

Nom français : **Russule des forêts**

Habitat : Sous feuillus (chênes, châtaigniers et hêtres).

Odeur : Fruitée-vanillée, de coco.

Chapeau fragile, rouge vif à rouge rosé - Saveur âcre.

Lames blanches - Chair blanche - Stipe très fragile.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Sans intérêt

Russula subfoetens W.G. Smith

3263

Syn. : **Russula foetens var. subfoetens**

Nom français : **Russula fausse-fétide**

Habitat : Sous feuillus.

Odeur : Nauséuse.

Chapeau visqueux, ocre doré - Lames crème ocre.

Réaction jaune de chrome avec KOH - Saveur âcre.

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité A rejeter



Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.

3289

Syn. :

Nom français : **Russule feuille morte - Russule écrevisse**

Habitat : Sous conifères de montagne, près des hauts-marais.

Odeur : De crustacés en train de cuire.

Chapeau pourpre - Stipe rose rouge - Lames ocre.

Saveur douce - Réaction verte avec SO4Fe.

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Sans intérêt

Lactarius albocarneus Britzelm.

2010

Syn. : **Lactarius glutinopallens**

Nom français : **Lactaire glutineux**

Habitat : Sous conifères, dans les hauts-marais.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau gris-beige nuancé de lilacin, gluant.

Latex blanc puis crème verdâtre, très âcre.

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Sans intérêt

Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray

2016

Syn. : **Lactarius aurantiofulvus**

Nom français : **Lactaire fauve orangé**

Habitat : En montagne, sous épicéas.

Odeur : Faible, de hareng salé à la fin.

Chapeau orangé ou fauve orangé, non zoné.

Latex abondant, immuable, doux puis amer.

28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius badiosanguineus Kühner & Romagn. 2019 Syn. : Nom français : Lactaire rouge sombre Habitat : Dans les pessières montagneuses. Odeur : Subnulle. Chapeau rougeâtre à bai-noir, à mamelon aigu. Latex jaunissant faiblement sur le mouchoir.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius blennius Fr. 2020 Syn. : Nom français : Lactaire muqueux Habitat : Exclusivement sous hêtres. Odeur : Subnulle. Chapeau gris-brun mêlé d'olive, très visqueux. Latex abondant, âcre, tachant les lames de gris.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius chrysorrheus Fr. 2028 Syn. : Nom français : Lactaire à lait jaunissant Habitat : Sous feuillus (chênes, châtaigniers ...). Odeur : Subnulle. Chapeau sec, jaune-orange, zoné-guttulé. Latex très abondant, virant rapidement au jaune.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Lactarius deliciosus (L.) Gray 2036 Syn. : Nom français : Lactaire délicieux Habitat : Sous pins, en terrain calcaire. Odeur : Fruitée, de carotte fraîche. Chapeau ocre orangé, zoné, taché de vert. Latex orangé vif, immuable - Chair rouge carotte.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Lactarius deterrimus Gröger 2037 Syn. : Nom français : Lactaire des épicéas Habitat : Exclusivement sous épicéas. Odeur : Nulle. Chapeau orangé vif, vite verdissant, zoné. Latex peu abondant, orange, immuable, amer.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. 2046 Syn. : Nom français : Lactaire fuligineux Habitat : Sous feuillus et résineux (surtout Picea). Odeur : Subnulle. Chapeau brun-bistre, velouté, non zoné. Latex blanc, virant lentement au rose saumoné.

28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  TOXIQUE Comestibilité Sans intérêt		Lactarius necator (Bull.) Pers. 2067 Syn. : Lactarius plumbeus - Lactarius turpis Nom français : Lactaire plombé Habitat : Sous bouleaux, dans les lieux humides. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau charnu, brun-olivâtre, feutré. Latex copieux, jaune verdâtre, vite très âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Lactarius picinus Fr. 2071 Syn. : Nom français : Lactaire enfumé Habitat : En montagne, dans les pessières. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun noirâtre sombre, sec, velouté. Latex lentement rosâtre sur la chair, âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Lactarius pubescens Fr. 2075 Syn. : Nom français : Lactaire pubescent Habitat : Sous bouleaux, dans les tourbières. Odeur : Un peu fruitée. Chapeau blanchâtre nuancé de rose, feutré. Latex jaunissant sur le mouchoir, très âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius quietus (Fr.) Fr. 2079 Syn. : Nom français : Lactaire à odeur de punaise Habitat : Sous chênes, en terrain calcaire. Odeur : Forte de punaise des bois. Chapeau beige ochracé, guttulé de roussâtre. Latex copieux, blanc, laiteux, doux, immuable.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Comestible		Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair 2091 Syn. : Nom français : Lactaire couleur saumon Habitat : Sous les sapins. Odeur : Faible, légèrement savonneuse. Chapeau jaune orangé, sans traces de vert. Latex abondant, rouge carotte, subimmuable.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Lactarius torminosus (Schaeff.) Pers. 2106 Syn. : Nom français : Lactaire à toisons Habitat : Strictement sous bouleaux. Odeur : Faiblement fruitée, subpélargoniée. Chapeau briqueté orangé, à marge barbue. Latex jaunissant sur le mouchoir, très âcre.

28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt	 Lactarius uvidus Charles Roussel	Lactarius uvidus (Fr.) Fr. 2110 Syn. : Nom français : Lactaire humide Habitat : Sous bouleaux et saules, dans les mares. Odeur : Faible ou nulle. Chapeau beige lilacin, très visqueux, non zoné. Latex se teintant de violet sur les lames.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible	 Boletus edulis Charles Roussel	Boletus edulis Bull. 263 Syn. : Nom français : Cèpe de Bordeaux Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide. Odeur : Fongique, très agréable. Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre. Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Sans intérêt	 Hortiboletus rubellus Charles Roussel	Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini et al. 1650 Syn. : Xerocomus rubellus - Boletus rubellus Nom français : Bolet rougeâtre Habitat : Sous différents feuillus. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau rouge vif, +/- décoloré à partir de la marge. Pied jaune et rouge - Pores jaune olivâtre, bleuissants.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible	 Imleria badia Charles Roussel	Imleria badia (Fr.) Vizzini 1824 Syn. : Boletus badius - Xerocomus badius Nom français : Bolet bai Habitat : Sous conifères et feuillus. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau bai à marron, de couleur uniforme. Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible	 Leccinum molle Charles Roussel	Leccinum molle (Bon) Bon 2146 Syn. : Nom français : Bolet mou Habitat : Sous bouleaux, dans les lieux humides. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-gris, bosselé, mou et spongieux. Stipe élancé, vert glauque, orné d'écailles blanches.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible	 Neoboletus erythropus Charles Roussel	Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn 2601 Syn. : Boletus erythropus Nom français : Bolet à pied rouge Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne. Odeur : +/- fruitée. Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté. Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.

29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Toxique		Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.J. Gilbert2880 Syn. : Porphyrellus pseudoscaber Tylopilus porphyrosporus Nom français : Bolet porphyre Habitat : Sous feuillus et sous conifères de montagne. Odeur : Chapeau sec, brun noirâtre olivacé, finement velouté. Pores petits, arrondis, gris à pourpres.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Suillaceae Comestibilité Sans intérêt		Suillus bovinus (L.) Roussel3412 Syn. : Boletus bovinus Nom français : Bolet des bouviers Habitat : Sous pins. Odeur : Faible de scléroderme. Chapeau visqueux, fauve ou chamois - Mycélium rose. Tubes adnés-décurrents - Pores amples, composés.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara3632 Syn. : Boletus chrysenteron - Xerocomus chrysenteron Nom français : Bolet à chair jaune Habitat : Sous feuillus et résineux. Odeur : De scléroderme. Chapeau brun clair, rougeâtre dans les blessures. Pores amples, anguleux - Stipe rayé de rouge carminé.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Xerocomus pruinatus (Fr. & Hök) Sutara3635 Syn. : Xerocomus pruinatus Boletus pruinatus Nom français : Bolet pruneux Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres. Odeur : Agréable. Chapeau bai foncé, charnu, velouté, pruneux. Saveur acidulée - Pores grands et anguleux.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Xerocomus subtomentosus (L.) Quéf.3644 Syn. : Xerocomus xanthus - Boletus subtomentosus Nom français : Bolet subtamenteux Habitat : Sous feuillus et conifères, ubiquiste. Odeur : Un peu fruitée. Chapeau brun-jaune à olivâtre, velouté-feutré. Pores jaune d'or, non bleuissants - Stipe fibrilleux.
30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Gomphidiaceae Comestibilité Sans intérêt		Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis (Pilát) Kuthan & Singer362 Syn. : Nom français : Gomphide squamuleux Habitat : Sous sapins et épicéas. Odeur : Odeur agréable, un peu fruitée. Chapeau orange, hémisphérique, feutré-squamuleux. Chair jaunâtre orangé - Lames espacées et épaisses.

30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Paxillaceae  Comestibilité Mortel		Paxillus olivellus P.A. Moreau et al. 2688 Syn. : Paxillus filamentosus sensu auct. Nom français : Paxille filamenteux Habitat : Sous les aulnes (<i>glutinosa</i> et <i>incana</i>), sur sol humide. Odeur : Légèremet fruitée. Chapeau velouté, ocre roussâtre, à marge enroulée. Lames crème à jaunâtre - Stipe se tachant de roux.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Lycoperdaceae Comestibilité Sans intérêt		Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini 2456 Syn. : Lycoperdon pyriforme - Morganela pyriformis Nom français : Vesse de loup en forme de poire Habitat : En touffes sur souches ou bois mort de conifères. Odeur : Plutôt désagréable. Fructifications piriforme - Exopéridium brun-jaune. Gléba blanche puis verdâtre - Subgléba blanche.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Sans intérêt		Cyathus striatus (Huds. : Pers.) Pers. 1132 Syn. : Nom français : Cyathe strié Habitat : En groupes, sur débris végétaux. Odeur : Faible, non caractéristique. En coupe un peu évasée - Intérieur strié radialement. Extérieur brun foncé, hirsute - Péridioles lenticulaires.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Comestible		Lycoperdon perlatum Pers. 2345 Syn. : Lycoperdon gemmatum Nom français : Vesse de loup perlée Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles. Odeur : Non caractéristique. Fructifications blanches recouvertes d'aiguillons. Gléba blanche puis olive - Stipe conique.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Phallales Fam. Phallaceae  Comestibilité A rejeter		Phallus impudicus L. 2741 Syn. : Nom français : Satyre puant Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Cadavérique à maturité. D'abord en forme d'œuf puis il prend l'aspect d'une morille à long pied fragile et à chapeau verdâtre.