

09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Leotiomycetes Ord.. Helotiales Fam. Helotiaceae Comestibilité Sans intérêt		Calycina citrina (Hedw.) Gray 247 Syn. : Bisporella citrina Nom français : Bisporelle citrine Habitat : Troncs et branches décortiquées de feuillus (hêtres). Odeur : Inodore. Fructifications sessiles et cupuliformes de 1 à 3 mm. Hyménium et surface externe lisses, jaune citron.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Leotiomycetes Ord.. Helotiales Fam. Chlorociboriaceae Comestibilité Sans intérêt		Chlorociboria aeruginosa (Nyl.) Ramamurthi et al. 353 Syn. : Chlorosplenium aeruginosum Nom français : Pézize vert de gris Habitat : Sur bois mort de feuillus ou de conifères. Odeur : Inodore. En forme de disque - Hyménium jaunâtre ou vert pâle. Colore le bois de bleu-vert - Spores de 9-14 x 2-4 µ.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Pezizomycetes Ord.. Pezizales Fam. Helvellaceae  Comestibilité Toxique		Helvella crispa (Scop.) Fr. 1587 Syn. : Nom français : Helvelle crépue Habitat : Sous feuillus, dans les terrains sablonneux. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau en forme de selle, avec de 2-3 lobes. Stipe lacuneux, costé-sillonné longitudinalement.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Pezizomycetes Ord.. Pezizales Fam. Helvellaceae Comestibilité Sans intérêt		Helvella elastica Bull. 1589 Syn. : Leptopodia elastica Nom français : Helvelle élastique Habitat : Au bord des chemins, dans les mousses. Odeur : Inodore. Chapeau en forme de selle, à 2 ou 3 lobes. Stipe creux, élancé, non sillonné en long.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Pezizomycetes Ord.. Pezizales Fam. Pyrenomataceae Comestibilité Sans intérêt		Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel 1651 Syn. : Lachnea hemisphaerica - Peziza hemisphaerica Nom français : Pézize hémisphérique Habitat : A terre, parfois sur bois très pourri. Odeur : Nulle. Marge et excipulum couverts de poils bruns. Hyménium blanchâtre à grisâtre bleuté.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Sordariomycetes Ord.. Hypocreales Fam. Hypocreaceae Comestibilité Sans intérêt		Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul. 1817 Syn. : Peckiella lateritia Nom français : Hypomyces couleur de brique Habitat : Sur l'hyménium de certains lactaires. Odeur : Inodore. Subiculum blanc, puis jaune pâle à brun jaunâtre. Périthèces partiellement immergés, brun-jaune d'or.

09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Pezizomycetes Ord.. Pezizales Fam. Discinaceae  Comestibilité Mortel		Paragyromitra infula (Schaeff.) X.C. Wang & W.Y. Zhuang 1525 Syn. : Gyromitra infula - Physomitra infula Nom français : Gyromitre en turban Habitat : En montagne, sur bois dégradé, en automne. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau cannelle, mitriforme, formé de 2 à 4 lobes. Stipe très irrégulier, creux, à chair cassante.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Leotiomycetes Ord.. Rhytismatales Fam. Rhytismataceae Comestibilité Sans intérêt		Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. 3025 Syn. : Nom français : Parasite des feuilles d'érables Habitat : Sur les feuilles vivantes d'érables, au printemps. Odeur : Nulle. Stroma en forme de tache arrondie et noire - Surface ridée-cérébriforme - Spores filiformes guttulées.
09 - Les ascomycètes Div. Ascomycota Clas. Sordariomycetes Ord.. Xylariales Fam. Xylariaceae Comestibilité Sans intérêt		Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. 3659 Syn. : Nom français : Xylaire polymorphe Habitat : Sur souches de feuillus, surtout sur hêtres. Odeur : Nulle. Fructifications claviformes, brun clair à noires. Stipe nul ou indistinct - Trame compacte, blanche.
10 - Les basidiomycètes à basides remarquables Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Auriculariales Fam. Auriculariaceae Comestibilité Comestible		Auricularia auricula-judae (Bull.) Quéf. 237 Syn. : Hirneola auricula-judae Nom français : Oreille de Judas Habitat : Sur feuillus morts ou vivants, surtout sur sureau. Odeur : Nulle. En disque puis en forme d'oreille, brun-rouge. Face inférieure ridée - Chair gélatineuse, tenace.
10 - Les basidiomycètes à basides remarquables Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Auriculariales Fam. Auriculariaceae Comestibilité Sans intérêt		Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 238 Syn. : Tremella violacea Nom français : Auriculaire mésentérique Habitat : Sur bois de feuillus morts ou vivants (hêtres, érables). Odeur : Faible, agréable. Fructifications étalées-réfléchies, zonées, poilues. Chapeaux +/- formés - Consistance gélatineuse.
10 - Les basidiomycètes à basides remarquables Div. Basidiomycota Clas. Dacrymycetes Ord.. Dacrymycetales Fam. Dacrymycetaceae  Comestibilité Toxique		Calocera viscosa Pers. 301 Syn. : Nom français : Calocère visqueuse Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères. Odeur : Inodore. En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé. Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Auriculariales Fam. Exidiaceae  Guepinia helvelloidesCharles Roussel Comestibilité Sans intérêt	Guepinia helvelloides (DC.) Fr. 1469 Syn. : Tremiscus helvelloides Nom français : Guépinie en helvelle Habitat : Au bord des chemins, dans les fossés humides. Odeur : Faible, non caractéristique. Fructifications orangées, en forme de spatule. Chair gélatineuse, tremblotante.
10 - Les basidiomycètes à basides remarquables Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Auriculariales Fam. Exidiaceae  Pseudohydnum gelatinosumCharles Roussel Comestibilité Sans intérêt	Pseudohydnum gelatinosum (Scoop.) P. Karst. 2939 Syn. : Tremellodon gelatinosum Nom français : Pseudohydne gélatineux Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches. Odeur : Non caractéristique. Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Albatrellaceae  Albatrellus citrinusCharles Roussel Comestibilité Comestible	Albatrellus citrinus Ryman 70 Syn. : Nom français : Polypore citrin Habitat : Sous conifères en montagne. Odeur : Non caractéristique. Espèce à chair tendre, chapeau blanchâtre au début puis jaune citrin.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Albatrellaceae  Scutiger confluensCharles Roussel Comestibilité Sans intérêt	Albatrellus confluens (Alb. & Schwein.) Teixeira 3335 Syn. : Scutiger confluens - Polyporus confluens Nom français : Polypore confluent Habitat : Sous épicéas de montagne. Odeur : Faible, agréable. Chapeaux irréguliers, brun orangé - Pores arrondis. Stipes difformes, courts et épais - Chair cassante.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Albatrellaceae  Albatrellus ovinusCharles Roussel Comestibilité Comestible	Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kottl. & Pouzar 3337 Syn. : Scutiger ovinus - Polyporus ovinus Nom français : Polypore des brebis Habitat : Sous conifères de montagne, dans les vieilles forêts. Odeur : Fruitée. Chapeau difforme, sec, brun sale - Pores minuscules. Tubes décurrents - Stipe excentrique - Chair fragile.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Thelephorales Fam. Bankeraceae  Boletopsis leucomelaenaCharles Roussel Comestibilité Sans intérêt	Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod 259 Syn. : Boletopsis subsquamosa - Polyporus leucomelas Nom français : Polypore blanc et noir Habitat : Forêts de conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-noir - Pores fins, blancs, décurrents. Stipe brun-noir comme le chapeau.

11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Daedaleopsis confragosa (Bolt.) J. Schröt. 1166 Syn. : Trametes rubescens Nom français : Tramète rougissante Habitat : Sur bois mort de feuillus. Odeur : Inodore. Fructifications dimidiées ou flabelliformes. Hyménium constitué de pores dédaléens.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt		Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer 1167 Syn. : Daedaleopsis confragosa var. tricolor Lenzites tricolor Nom français : Tramète tricolore Habitat : Sur bois mort de feuillus (souvent merisiers). Odeur : Inodore. Carpophores plats, minces, zonés. Hyménium constitué de lames serrées.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Fistulinaceae Comestibilité Comestible		Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1372 Syn. : Nom français : Langue-de-bœuf Habitat : Sur feuillus (surtout chênes et châtaigniers). Odeur : Agréable. Linguiforme, couleur de foie et à chair molle. Hyménium constitué de petits pores ronds.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Fomitopsidaceae Comestibilité Sans intérêt		Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst. 1395 Syn. : Ungulina marginata Nom français : Polypore marginé Habitat : Saprophyte des conifères, parfois des feuillus. Odeur : Acide, forte, évoquant l'odeur des poulaillers. Fructifications dimidiées à surface brun-rouge. L'un des polypores les plus communs.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Ganodermataceae Comestibilité Sans intérêt		Ganoderma applanatum (Schaeff.) With. 1425 Syn. : Ganoderma lipsiense Nom français : Ganoderme plat Habitat : Sur bois mort de feuillus. Odeur : Fongique, agréable. Chapeau poudré de brun par les spores. Hyménium poré, souvent parsemé de galles.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Ganodermataceae Comestibilité Sans intérêt		Ganoderma carnosum Pat. 1426 Syn. : Nom français : Ganoderme charnu Habitat : En montagne, sur souches de conifères. Odeur : Agréable de polypore. Chapeau de couleur brun-rouge ou acajou. Stipe bosselé, sinueux, vernissé - Pores arrondis.

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Gloeophyllales
Fam. Gloeophyllaceae



Comestibilité Sans intérêt

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

1457

Syn. : **Trametes odorata**

Nom français : **Tramète odorante**

Habitat : Sur bois mort d'épicéas, surtout en montagne.

Odeur : Forte d'anis, de vanille ou de pain d'épices.

Chapeau jaune orangé noduleux, feutré.

Trame noircissant en présence de NH3.

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Gloeophyllales
Fam. Gloeophyllaceae



Comestibilité Sans intérêt

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.

1458

Syn. : **Gloeophyllum saepiarium**

Nom français : **Lenzite des clôtures**

Habitat : Sur bois mort de conifères exposé à l'air.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications sessiles de couleur brun-rouge.

Surface strigieuse ou feutrée, zonée.

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Hymenochaetales
Fam. Hymenochaetaceae



Comestibilité Sans intérêt

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk

1782

Syn. : **Hymenochaete mougeotii**

Nom français : **Hymenochaete rouge écarlate**

Habitat : Sur écorce des branches de sapin.

Odeur : Inodore.

Revêtement croûteux à marge relevée-réfléchie.

Hyménium rouge vif puis brun-rouge.

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Fomitopsidaceae



Comestibilité Sans intérêt

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst

1978

Syn. : **Lasiochlaena benzoina**

Nom français : **Polypore à odeur de benjoin**

Habitat : En montagne, sur souches de conifères.

Odeur : Inconstante, subanisée.

Chapeau zoné de brun-bistre et de noir brillant.

Pores étroits, dentelés, crème, tachés de brun.

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Fomitopsidaceae



Comestibilité Comestible

Laetiporus sulphureus Bull.

2129

Syn. : **Polyporus sulphureus**

Nom français : **Polypore soufré**

Habitat : Sur feuillus et arbres fruitiers.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications sessiles, entièrement jaunes.

Chapeaux multiples, imbriqués et confluent.

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae



Comestibilité Sans intérêt

Lentinus substrictus

2171

Syn. : **Polyporus ciliatus**

Nom français : **Polypore à marge ciliée**

Habitat : Sur bois mort de feuillus (frênes, tilleuls), d'avril à juin.


Odeur : Non caractéristique.

Chapeau gris-brun à jaunâtre, à marge frangée.

Pores fins, à peine visibles à l'œil nu (5-6 / mm).

11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Fomitopsidaceae Comestibilité Sans intérêt	 Osteina obducta Rongier charbon	Osteina obducta (Berk.) Donk 2640 Syn. : Polyporus obductus - Oligoporus obductus Polyporus osseus Nom français : Polypore osseux Habitat : Sur bois mort et sur les souches de mélèzes. Odeur : Non caractéristique. Chapeau spatulé ou enroulé en cornet - Pores blancs. Stipe difforme, excentrique, blanc pur - Chair coriace.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Hymenochaetales Fam. Hymenochaetaceae Comestibilité Sans intérêt	 Phellinus hartigii Rongier charbon	Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat. 2746 Syn. : Fomitiporia hartigii - Polyporus hartigii Nom français : Polypore des sapins Habitat : Parasite et saprophyte des sapins. Odeur : Non caractéristique. Fructification tuberculeuse à pulvinée puis ongluée. Pores arrondis (4-6/mm) jaune-brun à brun rougeâtre.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt	 Picipes badius Rongier charbon	Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko 2812 Syn. : Polyporus durus - Polyporus badius Polyporus picipes Nom français : Polypore bai Habitat : En touffes parfois congrescentes, sur bois mort. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau luisant et gras, brun-rouge sombre, glabre. Pores minuscules, arrondis, fermés, simples, blancs.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt	 Trametes cinnabarina Charbon Rongier	Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr. 2961 Syn. : Pycnoporus cinnabarinus - Polyporus cinnabarinus Nom français : Tramète rouge cinabre Habitat : Sur bois mort de feuillus, rarement sur conifères. Odeur : Non remarquable. Fructifications sessiles, orange à rouge orangées. Pores petits, arrondis-angleux, rouge orangé.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt	 Trametes trogii Rongier charbon	Trametes trogii Berk. 3456 Syn. : Funalia trogii - Cerrena trogii - Corioloipsis trogii Nom français : Tramète de Trog Habitat : Sur bois mort de feuillus, surtout peupliers. Odeur : Nulle. Reconnaisable à son chapeau à peine zoné, couvert de poils hirsutes et à ses pores blancs puis jaunâtes.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae Comestibilité Sans intérêt	 Trametes versicolor Rongier charbon	Trametes versicolor (L.) Lloyd 3457 Syn. : Coriolus versicolor Nom français : Tramète versicolore Habitat : Sur bois peu dégradé, surtout de feuillus. Odeur : Nulle. Trame très mince - Pores fins et étroits, arrondis. Chapeaux multiples, congrescents, zonés, veloutés.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Amylostereaceae  Comestibilité Sans intérêt		Artomyces pyxidatus (Pers., ex Fr.) Jülich 219 Syn. : Clavaria pyxidata Nom français : Clavaire en chandeliers Habitat : Sur bois pourrissant de feuillus. Odeur : Insignifiante. Sous forme de buissons ramifiés assez charnus. Rameaux terminés par une petite coupe ornée de pics.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae  Comestibilité Comestible		Cantharellus amethysteus (Quelet) Saccardo 318 Syn. : Cantharellus cibarius var. amethysteus Nom français : Girole amethyste Habitat : Feuillus (hêtres surtout) et conifères de montagne. Odeur : Agréable de mirabelle. Chapeau jaune, moucheté de petites écailles violettes. Plis décourants - Stipe jaunissant fortement au toucher.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae  Comestibilité Comestible		Cantharellus cibarius Fr. 320 Syn. : Nom français : Chanterelle ou girole Habitat : Surtout sous feuillus, en terrain non calcaire. Odeur : Forte et agréable, fruitée, d'abricot. Chapeau jaune vif uniforme - Chair blanche ou jaune. Plis décourants, fourchus, jaune orangé.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gomphales Fam. Clavariadelphaceae  Comestibilité Sans intérêt		Clavariadelphus truncatus Donk 379 Syn. : Clavaria truncata Nom français : Clavaire tronquée Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain calcaire. Odeur : Faible, non caractéristique. En forme de massue tronquée au sommet. Hyménium lisse à ridé, jaune ochracé - Saveur douce.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae  Comestibilité Comestible		Craterellus lutescens Pers. 1072 Syn. : Cantharellus lutescens - Cantharellus aurora Nom français : Chanterelle jaunissante Habitat : Dans les bois de conifères (pins), dans la mousse. Odeur : Forte, agréable et fruitée. Chapeau en entonnoir, brun-jaune - Stipe jaune. Hyménium peu plissé, jaune-orangé à grisâtre.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Hericiaceae  Comestibilité Comestible		Hericium coralloides (Scop.) Pers. 1617 Syn. : Dryodon coralloides Nom français : Hydne en forme de corail Habitat : Sur tronc mort de sapin, en montagne (non sur hêtres). Odeur : Agréable. Branches coralloïdes, molles, ramifiées. Aiguillons courts disposés en tous sens.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae  Comestibilité Comestible		Hydnum repandum L. 1672 Syn. : Nom français : Pied-de-mouton Habitat : Sous feuillus et conifères, jusqu'en montagne. Odeur : Agréable, fruitée. Chapeau de jaune pâle à couleur abricot. Aiguillons très serrés, fragiles, faciles à séparer.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Cantharellales Fam. Hydnaceae  Comestibilité Comestible		Hydnum rufescens Pers. 1674 Syn. : Hydnum repandum var. ou fo. rufescens Nom français : Pied-de-mouton roussissant Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Non caractéristique. Petite espèce à chapeau brun-orange à roux vif. Aiguillons jaune orangé, non ou peu décurrents.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Thelephorales Fam. Bankeraceae  Comestibilité Sans intérêt		Phellodon niger (Fr.) P. Karst. 2753 Syn. : Hydnellum nigrum Nom français : Hydne noir Habitat : Sous feuillus et conifères, en troupes. Odeur : Faible sur le frais, de maggi en séchant. Chapeau tomenteux, bosselé, zoné, bleu-noir à noir. Aiguillons de 3 mm, fins, subulés, blancs puis gris.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gomphales Fam. Gomphaceae  Comestibilité Sans intérêt		Ramaria flava (Schaeff.) Quéf. 2969 Syn. : Clavaria flava Nom français : Clavaire jaune Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres. Odeur : Un peu aromatique ou herbacée. Tronc court, épais, trapu, jaune en haut, blanc en bas. Rameaux jaune pâle, à extrémités jaune verdâtre.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gomphales Fam. Gomphaceae  Comestibilité Toxique		Ramaria formosa Pers. 2973 Syn. : Clavaria formosa Nom français : Clavaire aux belles couleurs Habitat : Sous feuillus (chênes, tilleuls, châtaigniers). Odeur : Légèrement herbacée. Tronc court, obconique, à base blanchâtre. Rameaux jaune-saumon - Chair vineuse à la coupe.
12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Thelephorales Fam. Bankeraceae  Comestibilité Comestible		Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. 3305 Syn. : Hydnum imbricatum Nom français : Hydne imbriqué Habitat : Sous conifères de montagne, surtout sous épicéas. Odeur : Légèrement épicée. Grande espèce à chapeau grossièrement écaillé. Hyménium constitué d'aiguillons subulés et fragiles.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et giroles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Sparassidaceae



Comestibilité Comestible



Sparassis brevipes Krombh.

3359

Syn. : Sparassis laminosa - Sparassis crispa var. laminosa

Nom français : Clavaire lamelleuse

Habitat : Surtout à la base des feuillus, rarement sur conifères.

Odeur : Agréable, fongique.

Fructification en forme d'éponge très ramifiée.

Lanières plates et peu crispées, caoutchouteuses.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Comestible



Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko

1124

Syn. : Hygrocybe virginea - Cuphophyllus niveus
Hygrophorus virgineus

Nom français : Hygrophore virginal

Habitat : Dans l'herbe des prairies et des pelouses.

Odeur : Nulle.

Chapeau hygrophane, blanc à crème ochracé.

Lames très decurrentes, blanches à crème - Stipe blanc.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae



Comestibilité Toxique



Hygrocybe acutoconica (Clém.) Singer

1714

Syn. : Hygrocybe aurantiolutescens - Hygrocybe persistens

Nom français : Hygrocybe immuable

Habitat : Dans les prés, sur les talus.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau conique-pointu, orangé vif, fibrilleux.

Lames orangé pâle et stipe fibrilleux.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae



Comestibilité Toxique



Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.

1694

Syn. : Hygrophorus conicus - Hygrocybe cinereifolia
Hygrocybe olivaceonigra - Hygrocybe nigrescens

Nom français : Hygrocybe conique

Habitat : Dans les prés maigres, les alpages.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge tomate à orangé vif ou jaune verdâtre.

Chair noircissante. Lames jaune orangé - Saveur douce

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

Comestibilité Sans intérêt



Hygrocybe obrussea (Fr.) Wünsche

1711

Syn. : Hygrophorus obrusseus - Pseudohygrocybe obrussea

Nom français : Hygrocybe jaune d'or

Habitat : Pelouses, lisières ou pré-bois.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau orange, pâissant, +/- brunâtre au disque.

Lames blanchâtres - Stipe jaune orangé.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

Comestibilité Sans intérêt



Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.

1732

Syn. :

Nom français : Hygrophore à odeur agréable

Habitat : Dans les pessières, sur sols calcaires.


Odeur : D'amandes amères.

Chapeau gris-beige, obtusément mamelonné.

Pied blanchâtre ou gris, granuleux au sommet.

13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité Comestible		Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc.1739 Syn. : Nom français : Hygrophore des chevreuils Habitat : En montagne sous conifères (Picea). Odeur : Faible. Chapeau brun rouge pourpre. Lames très espacées, brun vineux sombre.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité Sans intérêt		Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.1741 Syn. : Nom français : Hygrophore à dents jaunes Habitat : Sous feuillus, en terrain calcaire. Odeur : Faible. Chapeau blanc à ivoire, visqueux, mamelonné. Marge du chapeau ornée de flocons jaune vif.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité Sans intérêt		Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea1745 Syn. : Hygrophorus chrysaspis Nom français : Hygrophore à disque jaune Habitat : Dans les hêtraies, sur sols calcaires. Odeur : De peau de mandarine à anisée. Chapeau visqueux, lisse, blanc à crème ochracé. Brunissement roux vif à partir de la marge.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité		Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr.1746 Syn. : Nom français : Hygrophore blanc d'ivoire Habitat : Surtout sous hêtres, parfois tardif. Odeur : De jacinthe ou de mandarine. Chapeau très visqueux, blanc pur, immuable. Stipe blanc à crème, aminci à la base, visqueux.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hygrophoraceae Comestibilité Sans intérêt		Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr.1773 Syn. : Nom français : Hygrophore pudibond Habitat : Ubiquiste, sous sapins, jusqu'en zone alpine. Odeur : Résineuse, de térébenthine. Chapeau visqueux, rosé aurore ou saumon. Stipe ferme, à reflets jaune-orange, visqueux.
13 - Pleurotes et hygrophores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Gloeophyllales Fam. Gloeophyllaceae Comestibilité Sans intérêt		Neolentinus cyathiformis (Schaeff.) Della Magg. & Trassin.2611 Syn. : Lentinus cyathiformis - Lentinus degener Lentinus schaefferi - Neolentinus schaefferi Nom français : Lentin de Schaeffer Habitat : Sur souches de saules, de peupliers, ou de conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeau de 10 à 15 cm, fauve rouillé, velouté. Lames très étroites, décurrentes - Chair coriace.

14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Physalacriaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Armillaria lutea Gillet 187 Syn. : Armillaria bulbosa - Armillaria gallica Nom français : Armillaire à anneau jaune Habitat : Espèce isolée ou en groupes, sur feuillus et conifères. Odeur : Faible à +/- désagréable. Chapeau brun-ocre - Stipe bulbeux à base +/- jaune vif. Anneau bordé de jaune - Lames un peu décurrentes.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Physalacriaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 189 Syn. : Armillariella ostoyae Nom français : Armillaire d'Ostoya Habitat : Souvent sur souches et racines d'épicéas. Odeur : Faible, de polypore. Chapeau brun-roux, couvert de mèches brun noirâtre. Anneau membraneux - Lames un peu décurrentes.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Clitocybe metachroa (Fr.) Fr. 420 Syn. : Clitocybe bicolor - Clitocybe decembris Nom français : Clitocybe à chapeau bicolore Habitat : Généralement sous conifères, sur litières d'aiguilles. Odeur : Herbacée ou un peu terreuse, non farineuse. Chapeau hygrophane, brun +/- pâle, à marge striée. Lames décurrentes, grisâtres - Stipe grisonnant.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 421 Syn. : Lepista nebularis Nom français : Clitocybe nébuleux Habitat : En lisière des bois, souvent en ronds de sorcières. Odeur : Farino-spermatique, plutôt désagréable. Chapeau gris prumineux - Lames adnées-décurrentes. Stipe en massue, grisâtre pâle - Chair épaisse, grise.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Incertae sedis  TOXIQUE Comestibilité Comestible		Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 424 Syn. : Nom français : Clitocybe anisé Habitat : Feuillus et conifères, surtout en montagne. Odeur : Fortement anisée. Chapeau vert à gris-vert, parfois décoloré, mat. Lames adnées, blanches ou verdâtres - Saveur douce.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Clitocybe phyllophila Pers. 429 Syn. : Clitocybe cerussata - Clitocybe pithyophila Nom français : Clitocybe des feuilles Habitat : Souvent sur litières d'aiguilles donc mal nommé. Odeur : Faible et agréable, légèrement farineuse. Chapeau blanc, prumineux-givré - Chair plutôt élastique. Lames adnées, blanches à beiges. Sporée crème-ocre.

14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Toxique		Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. 432 Syn. : Nom français : Clitocybe du bord des routes Habitat : Dans l'herbe et sous les feuillus, surtout sur sol acide. Odeur : Agréable, subfarineuse, subspermatique. Chapeau blanc, glacé-givré, marbré d'ochracé rosâtre. Lames adnées, blanches à crème - Chair élastique.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Comestible		Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja 1834 Syn. : Clitocybe geotropa Nom français : Tête de moine Habitat : Ubiquiste, en plaine et en montagne. Odeur : Fortement cyanique. Grande espèce, largement mamelonnée. Stipe plein puis spongieux, concolore, fibrilleux.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Comestible		Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja 1835 Syn. : Clitocybe gibba Nom français : Clitocybe bossu Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Cyanique. Chapeau en entonnoir, beige à beige ochracé. Lames très décurrentes, crème - Stipe blanchâtre.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hydnangiaceae  Comestibilité Comestible		Laccaria amethystina Cooke 1987 Syn. : Laccaria amethystea Laccaria laccata var. amethystina Nom français : Laccaire améthyste Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères. Odeur : Légèrement fruitée. Chapeau hygrophane, violet foncé puis pâlisant. Lames très espacées, larges, épaisses, violettes.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hydnangiaceae  Comestibilité Comestible		Laccaria laccata (Scop.) Cooke 1989 Syn. : Nom français : Laccaire laqué Habitat : Dans les bois, au bord des chemins. Odeur : Insignifiante. Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisce. Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Hydnangiaceae  Comestibilité Comestible		Laccaria proxima (Boud.) Pat. 1992 Syn. : Laccaria laccata var. moelleri Nom français : Laccaire à chapeau méchuleux Habitat : Dans les landes, les lieux découverts. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun rosé, furfuracé à squamuleux. Lames rosâtres, espacées ou crispées.

14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Incertae sedis  Comestibilité Toxique		Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini et al. 2300 Syn. : Clitocybe connata - Lyophyllum connatum Nom français : Clitocybe en touffes Habitat : Au bord des chemins, en troupes et fasciculés. Odeur : Herbacée, de petits pois ou de haricots. Chapeau blanc pur ou glacé, soyeux, marbré de gris. Chair blanche, cartilagineuse - Pieds blancs, connés.
14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 2934 Syn. : Clitocybe cyathiformis - Omphalia cyathiformis Nom français : Clitocybe en coupe Habitat : Dans les endroits herbeux, en bordure des chemins. Odeur : Cyanique. Chapeau en entonnoir, hygrophane, marron à gris. Lames décurrentes, falciformes, pentues, brun clair.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Melanoleuca brevipes (Bull.) Pat. 2424 Syn. : Nom français : Melanoleuca à pied court Habitat : Dans les pelouses, les parcs, les endroits rudéralisés. Odeur : Non caractéristique. Chapeau mamelonné, brun-gris foncé - Chair pâle. Stipe subconcolore, fibrillo-strié, brunâtre.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité A rejeter		Tricholoma columbetta (Fr.) Fr. 3500 Syn. : Tricholoma impolitum Nom français : Tricholome columbette Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres, en terrain acide. Odeur : Faible. Chapeau blanc pur, satiné - Chair ferme, blanche. Stipe robuste, blanc, taché de bleu-vert à la base.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Mortel		Tricholoma equestre (L) P. Kumm. 3504 Syn. : Tricholoma auratum - Tricholoma flavovirens Nom français : Tricholome équestre Habitat : Sous conifères et feuillus. Odeur : Faiblement farineuse. Chapeau squamuleux, jaune orangé - Chair jaune vif. Lames jaune citrin - Stipe jaune vif, floconneux.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Toxique		Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio 3528 Syn. : Tricholoma pardinum var. filamentosum Nom français : Tricholome filamenteux Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout sous hêtres. Odeur : Un peu aromatique, à peine farineuse. Chapeau fibrillo-laineux, non nettement squamuleux. Lames glauques - Réaction violet-lilacin avec TL4.

15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma luridum (Schaeff.) P. Kumm. 3522 Syn. : Nom français : Tricholome blafard Habitat : Sous conifères (sapins, épicéas), en montagne. Odeur : Forte de farine ou de pastèque. Chapeau gris-brun olivâtre à bronze ochracé, sec. Lames gris sombre - Saveur farineuse un peu amère.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Comestible		Tricholoma orirubens Qué. 3526 Syn. : Nom français : Tricholome rougissant Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout sous hêtres. Odeur : Farineuse. Chapeau gris-noir, pelucheux - Base du pied bleutée. Arête des lames rougissantes - Saveur farineuse.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Toxique		Tricholoma pardinum (Pers.) Qué. 3527 Syn. : Tricholoma unguentatus Nom français : Tricholome tigré Habitat : Surtout sous hêtres en montagne, sur terrain calcaire. Odeur : Faible, légèrement farineuse. Chapeau orné de squames brunes sur fond argenté. Lames glauques - Stipe fibrilleux-pelucheux.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma pseudonictitans Bon 3538 Syn. : Tricholoma fulvum var. pseudonictitans Nom français : Tricholome luisant Habitat : Sous conifères, rarement sous feuillus. Odeur : Subnulle à légèrement farineuse. Chapeau brun fauve, à marge non cannelée. Lames crème - Chair du pied jaune au grattage.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 3544 Syn. : Tricholoma boudieri Nom français : Tricholome à odeur de savon Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne. Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide. Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante. Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Comestible		Tricholoma sculpturatum (Fr.) Qué. 3548 Syn. : Nom français : Tricholome gravé Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des chemins. Odeur : De farine, au moins à la coupe. Chapeau grisâtre, feutré-laineux, squamuleux. Lames jaunissantes - Saveur farineuse - Stipe blanc.

15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Toxique		Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin 3550 Syn. : Tricholoma sciodellum Tricholoma virgatum var. sciodes Nom français : Tricholome gris perfide Habitat : Surtout sous hêtres, en zone calcaire. Odeur : Faible, un peu terreuse, herbacée. Chapeau grisâtre, à reflets lilacins, fibrilleux. Saveur amère puis âcre - Lames bordées de noir.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma sulphureum Bull. 3558 Syn. : Tricholoma bufonium - Tricholoma subsulphureum Nom français : Tricholome soufré Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Désagréable de gaz d'éclairage. Entièrement jaune soufre (chapeau, pied et lames). Chapeau charnu - Lames jaune vif - Saveur écœurante.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Comestible		Tricholoma terreum (Schaeff.) P.Kumm. 3561 Syn. : Tricholoma myomyces Nom français : Petit gris Habitat : Dans les pinèdes calcaires, parfois sous épicéas. Odeur : Non farineuse, un peu herbacée. Chapeau gris souris uniforme, fibrilleux-vergeté, sec. Lames et stipe blanchâtres - Saveur douce.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Sans intérêt		Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. 3568 Syn. : Nom français : Tricholome couleur de vache Habitat : Surtout sous conifères, parfois sous feuillus (saules). Odeur : Peu agréable, herbacée, un peu farineuse. Chapeau brun fauve, squamuleux, à marge laineuse. Saveur un peu amère - Stipe blanc à fibrilleux de roux.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Sans intérêt		Tricholomopsis decora (Fr.) Singer 3573 Syn. : Tricholoma decorum Nom français : Tricholome décoré Habitat : Sur bois pourri de conifère, surtout en montagne. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau jaune d'or, orné de squamules brun olivacé. Stipe moucheté de brun bistre - Lames jaune d'or.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité Sans intérêt		Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 3576 Syn. : Tricholoma rutilans Nom français : Tricholome rutilant Habitat : Sur souches de conifères. Odeur : Faible de moisi. Chapeau jaune, orné de petites écailles pourpre violet. Chair jaune vif - Saveur amarescente - Lames jaune vif.

16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Comestible		Lepista glaucocana (Bres.) Singer 2232 Syn. : Rhodopaxillus glaucocanus Nom français : Lépiste décolorée Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent en ronds de sorcières. Odeur : Mentholée, légèrement farineuse. Chapeau blanchâtre à gris ochracé nuancé de lilas. Lames blanchâtres à lilas pâle - Saveur douce.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Comestible		Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow 2233 Syn. : Rhodopaxillus irinus Nom français : Lépiste à odeur d'iris Habitat : Dans les bois mêlés, surtout en montagne. Odeur : Aromatique, d'iris, de fleur d'oranger. Espèce massive à silhouette tricholomoïde. Chapeau hygrophane beige à brunâtre.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae Comestibilité Sans intérêt		Lepista nuda Bull. 2357 Syn. : Rhodopaxillus nudus Nom français : Pied bleu Habitat : En ligne ou en rond sous conifères, plutôt tardif. Odeur : Fruitée à farino-spermatique. Chapeau largement mamelonné, lilacin, glabre. Stipe rayé-ridulé, entièrement bleuté.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Lyophyllaceae Comestibilité Comestible		Lyophyllum decastes (Fr.) Singer 2357 Syn. : Lyophyllum aggregatum - Tricholoma aggregatum Nom français : Lyophylle aggrégé Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les endroits herbeux. Odeur : Nulle. Chapeau noisette à brun-gris - Chair élastique. Stipes blanchâtres, aggrégés - Saveur douce.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen 1495 Syn. : Collybia confluens - Marasmius confluens Gymnopus confuens Nom français : Collybie en touffe Habitat : En rond de sorcière, ubiquiste. Odeur : Légèrement cyanique. Chapeau beige mastic à brun pâle, hygrophane. Lames très serrées, étroites et pied pruneux.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae Comestibilité Sans intérêt		Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen 1516 Syn. : Collybia peronata - Marasmius peronatus Gymnopus peronatus - Marasmiellus peronatus Nom français : Collybie guêtrée Habitat : Surtout sur feuilles de hêtres qu'il agglomère. Odeur : De vinaigre à la trituration. Chapeau brun noisette, hygrophane. Lames échancrées, d'un beau jaune de buis.

17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Physalacriaceae  Comestibilité Sans intérêt		Hymenopellis radicata (Konrad & Maubl.) R.H. Petersen fo. marginata Syn. : Oudemansiella radicata var. marginata Nom français : Collybie radicante à arête brune Habitat : Sous feuillus. Odeur : Non caractéristique. Diffère du type par l'arête des lames bordée de brun-noir, les autres caractères étant identiques.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Marasmiaceae  Comestibilité Comestible		Marasmius oreades (Bolton) Fr. Syn. : Nom français : Marasme des oréades Habitat : Au printemps, dans les prés, pâturages et alpages. Odeur : Fortement cyanique. Chapeau brun-roux, hygrophane et lames espacées. Dans l'herbe en ronds de sorcières.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Marasmiaceae  Comestibilité Sans intérêt		Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar Syn. : Collybia platyphylla - Gymnopus platyphyllus Oudemansiella platyphylla Nom français : Collybie à larges lamelles Habitat : Surtout sur souches ou racines de feuillus. Odeur : Terreuse à herbacée. Chapeau rayé-vergeté - Lames larges et espacées. Présence de rhizoïdes à la base du stipe.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae  Comestibilité A rejeter		Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox Syn. : Collybia butyracea Nom français : Collybie beurrée Habitat : Sous feuillus et conifères, sur sols pauvres. Odeur : Agréable, épicée. Chapeau brun-rouge, hygrophane, gras au toucher. Stipe clavé, farci ou creux, concolore, fibrilleux, sec.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt		Mycena epipterygia (Scop.) Gray Syn. : Prunulus epipterygius Nom français : Mycène des fougères Habitat : Sur humus et débris végétaux, feuilles ou aiguilles. Odeur : Subnulle ou farineuse rance. Chapeau jaune citrin - Stipe visqueux, jaune citrin vif. Une pellicule visqueuse séparable couvre le chapeau.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt		Mycena galericulata (Scop.) Gray Syn. : Nom français : Mycène en casque Habitat : Sur souches et branches de feuillus ou de conifères. Odeur : Faible, farineuse (saveur très farineuse). Stipe tenace, souvent comprimé, hirsute à la base. Lames souvent rose pâle, fortement interveinées.

18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt		Mycena maculata P. Karst. 2519 Syn. : Nom français : Mycène tachée Habitat : Sur bois mort de feuillus et de conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-gris à brun-rouge, longuement strié. Toutes les parties se tachent de brun-rouge.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Mycena pelianthina (Fr.) Quéf. 2535 Syn. : Prunulus pelianthinus Nom français : Mycène à lames bordées de pourpre Habitat : Sous feuillus (surtout hêtres), sur litières de feuilles. Odeur : Raphanoïde. Chapeau gris violacé, à reflets lilas - Stipe concolore. Lames gris lilas, à arête pourpre - Chair brunâtre.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 2546 Syn. : Prunulus purus Nom français : Mycène pur Habitat : Sous feuillus et conifères, sur divers types de sols. Odeur : Raphanoïde. Chapeau violet lilas à violet rose, hygrophane. Pied creux, cassant, blanchâtre à gris-violet ou rose.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Mycena rosea Gramberg 2558 Syn. : Mycena pura fo. et var. rosea Nom français : Mycène rose Habitat : Surtout sous feuillus, sur terre nue, parmi les feuilles. Odeur : Raphanoïde. Chapeau de couleur vieux rose, hygrophane. Stipe blanc à rose pâle, finement fibrilleux.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae Comestibilité Sans intérêt		Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel 2569 Syn. : Mycena alcalina sensu auct. Nom français : Mycène cespiteuse Habitat : Cespiteux - sur bois de conifères. Odeur : Nitreuse. Chapeau brun noirâtre à sépia, strié, hygrophane. Stipe gris-brun, luisant, hérissé de rhizoïdes à la base.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Chlorophyllum brunneum (Farl. & Burt) Vellinga 354 Syn. : Macrolepiota rhacodes var. hortensis & var. bohemica Macrolepiota venenata Nom français : Lépiote vénéneuse Habitat : Sur des sols enrichis en azote (détritux, terreau ...). Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau couvert d'écailles beiges, parfois en étoile. Stipe blanchâtre, bulbeux - Anneau simple, coulissant.

19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Sans intérêt		Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod1140 Syn. : Nom français : Cystoderme furfuracé Habitat : Sous conifères, sur humus ou tapis d'aiguilles. Odeur : De moisi, d'insecticide, de lindane. Chapeau chamois ochracé, finement farineux-granuleux Stipe concolore, couvert d'une armille floconneuse.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Sans intérêt		Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod1142 Syn. : Nom français : Cystoderme à dents de requin Habitat : Sous conifères, dans les mousses, sur les aiguilles. Odeur : Désagréable, de moisi ou de gaz d'éclairage. Chapeau gris rose, granuleux, à marge appendiculée. Stipe couvert d'une armille surmontée d'un anneau.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Echinoderma asperum (Pers.) Bon1207 Syn. : Lepiota acutesquamosa - Cystolepiota aspera Nom français : Lépiote à lames fourchues Habitat : Dans les parcs, au bord des chemins. Odeur : Forte de caoutchouc. Chapeau couvert d'écailles dressées, brun foncé. Lames très serrées, nettement fourchues.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm.2185 Syn. : Lepiota clypeolaria var. ochraceosulfurescens Lepiota ochraceosulfurescens Nom français : Lépiote en bouclier Habitat : Sous feuillus, sur litières de feuilles mortes. Odeur : Fongique. Chapeau mamelonné, ochracé au disque, écailleux. Stipe presque entièrement floconneux de blanchâtre.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Lepiota felina (Pers.) P. Karst.2197 Syn. : Nom français : Lépiote féline Habitat : Sous conifères. Odeur : De pélargonium, de bois de cèdre. Chapeau orné de squamules bistre-sépia sombre. Stipe annelé, guirlandé de squamules noirâtres.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss.2204 Syn. : Nom français : Lépiote à pied rougissant Habitat : Dans les forêts mixtes, en terrain calcaire. Odeur : Raphanoïde, de Lepiota cristata. Chapeau à disque brun châtain, entouré de squames. Stipe à base orangée orné d'un anneau membraneux.

19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Toxique		Lepiota magnispora Murrill 2210 Syn. : Lepiota ventriosospora Lepiota ventriosospora var. fulva Nom français : Lépiote à voile jaune Habitat : Uniquement sous conifères (pins, épicéas). Odeur : Douce, non caractéristique. Chapeau couvert d'écailles fauve orangé. Stipe guirlandé par un voile floconneux jaune.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible		Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bellu & Lanzoni 2388 Syn. : Macrolepiota procera fo. fuliginosa Lepiota procera var. fuliginosa Nom français : Lépiote fuligineuse Habitat : Dans les forêts claires, lisières et prairies. Odeur : Odeur non caractéristique. Chapeau de 15-20 cm, couvert de squames sombres. Stipe chiné sous l'anneau, rougissant au froissement.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible		Macrolepiota procera (Scop.) Singer 2387 Syn. : Lepiota procera Nom français : Lépiote élevée (Coulemelle) Habitat : Dans les prés, les lisières ou clairières gramineuses. Odeur : Faible, fongique. Reconnaissable à sa grande taille, à son chapeau squameux, à son stipe chiné, à son anneau coulissant.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Toxique		Phaeolepiota aurea (Bull.) R. Maire ex Konrad & Maubl. 2733 Syn. : Cystoderma aureum - Pholiota aurea Nom français : Pholiote dorée Habitat : Dans les parcs, sur les décombres, dans les forêts. Odeur : Aromatique, acidulée. Chapeau de 8 à 12 cm, jaune d'or, finement furfuracé. Stipe plein, tenace, orné d'un anneau membraneux.
20 - Les agarics Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible		Agaricus campestris L. 17 Syn. : Psalliota campestris Nom français : Rosé des prés Habitat : Dans les prés, les prairies fumées, les pelouses. Odeur : Fongique et agréable, non caractéristique. Chapeau blanchâtre - Lames rose vif - Anneau fragile. Stipe s'amincissant vers la base.
20 - Les agarics Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible		Agaricus essettei Bon 28 Syn. : Agaricus abruptibulbus Nom français : Agaric bulbeux, Agaric à pied bulbeux Habitat : Dans les forêts de conifères, sur tapis d'aiguilles. Odeur : Anisée. Espèce jaunissante, proche de Agaricus sylvicola dont elle diffère par son pied nettement bulbeux-marginé.


21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Psathyrellaceae  Comestibilité Toxique		Coprinos atamentaria (Bulliard) Redhead, Vilgalys et al. 505 Syn. : Coprinus atramentarius Nom français : Coprin noir d'encre Habitat : En touffes, dans les parcs, sur les chemins. Odeur : Faible ou nulle. Chapeau gris argenté à sommet obtus, à aspect givré. Stipe blanc, orné d'une zone annulaire à la base.
21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Coprinaceae  Comestibilité Comestible		Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 539 Syn. : Nom français : Coprin chevelu Habitat : Dans les lieux herbeux, les jardins, les décombres. Odeur : Faible ou nulle, non caractéristique. Chapeau cylindracé, blanc, orné de mèches blanches. Stipe doté d'un anneau fragile, mobile - Chair blanche.
21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Psathyrellaceae Comestibilité Sans intérêt		Homophron spadiceum (P. Kumm.) Örstadius & E. Larss. 1647 Syn. : Psathyrella spadicea - Psathyrella sarcocephala Nom français : Psathyrelle couleur chair Habitat : Sous feuillus, à la base des arbres vivants ou morts. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau hygrophane, brun-rouge à couleur chair. Stipe coriace, blanchâtre à ochracé - Lames blanches.
21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Psathyrellaceae Comestibilité Sans intérêt		Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. 2006 Syn. : Lacrymaria velutina - Psathyrella lacrymabunda Drosophila velutina Nom français : Psathyrelle veloutée Habitat : Dans les friches, au bord des chemins. Odeur : Subnulle. Chapeau brunâtre, feutré à fibrilleux-écailleux. Lames larmoyantes au début puis noires.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae Comestibilité Comestible		Amanita battarrae (Boud.) Bon 98 Syn. : Nom français : Amanite de Battarra Habitat : Sous feuillus (chênes, châtaigniers, tilleuls ...). Odeur : Non caractéristique. Cloisons des hyphes du sommet du stipe non amyloïdes (kk négatif).
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilité A rejeter		Amanita citrina (Schaeff.) Pers. 103 Syn. : Nom français : Amanite citrine Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Raphanoïde. Chapeau jaune citrin - Stipe orné d'un bulbe globuleux. Volve membraneuse circonscise - Saveur douce.

22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae Comestibilité Comestible		Amanita coryli (Neville & Poumarat) 106 Syn. : Nom français : Amanite du noisetier Habitat : Uniquement sous noisetiers. Odeur : Nulle. Silhouette élancée - Chapeau gris-brun, mamelonné. Volve engainante - Stipe blanchâtre à gris-beige.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae Comestibilité Comestible		Amanita crocea (Qué.) Singer 108 Syn. : Amanita vaginata var. crocea - Amanitopsis crocea Nom français : Amanite safran Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain acide. Odeur : Inodore. Chapeau jaune safran - Stipe chiné, zébré à pelucheux. Volve épaisse et membraneuse - Saveur douce.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Amanita echinocephala (Vittad.) Qué. 113 Syn. : Amanita solitaria Nom français : Amanite épineuse Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain calcaire. Odeur : Odeur non caractéristique. Espèce thermophile - Anneau ample et pendant. Chapeau couvert de verrues pyramidales aiguës.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  A REJETER Comestibilité A rejeter		Amanita excelsa var. excelsa (Fr.) Bertillon 117 Syn. : Amanita excelsa Nom français : Amanite élevée Habitat : Feuillus et conifères - ubiquiste. Odeur : Sans odeur ou raphanoïde faible. Silhouette élancée - Chapeau grisâtre, gras et humide. Anneau fragile - Stipe profondément enterré.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  A REJETER Comestibilité A rejeter		Amanita excelsa var. spissa (Fr.) Neville & Poumarat 118 Syn. : Amanita spissa Nom français : Amanite épaisse Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Nette odeur raphanoïde. Port robuste - Chapeau gris à brun - Volve friable. Anneau juponnant, strié - Stipe à bulbe napiforme.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Amanita muscaria (L.) Lam. 130 Syn. : Nom français : Amanite tue-mouches Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide. Odeur : Non caractéristique. Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs. Anneau membraneux, juponnant - Lames blanches.

22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilité Sans intérêt	Amanita ovoidea (Bull.) Link 138 Syn. : Nom français : Amanite ovoïde Habitat : Prés-bois, en bordure des chemins, des routes. Odeur : Désagréable après la cueillette. Grande espèce blanche, à volve membraneuse. Marge du chapeau appendiculée - Anneau crémeux.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilitétoxique	Amanita pantherina (DC.) Krombh. 140 Syn. : Nom français : Amanite panthère Habitat : Feuillus, conifères, de l'étage collinéen à montagnard. Odeur : Légèrement raphanoïde. Chapeau brun orné de flocons blanc pur. Bulbe marginé surmonté de bourrelets hélicoidaux.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  ComestibilitéSans intérêt	Amanita porphyria Alb. & Schw. 144 Syn. : Nom français : Amanite porphyre Habitat : Surtout sous conifères de montagne, sur sols acides. Odeur : Raphanoïde. Chapeau porphyre - Bulbe hémisphérique, marginé. Anneau blanchâtre, vite violacé - Saveur douce.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  ComestibilitéComestible	Amanita rubescens (Pers.) Gray 152 Syn. : Nom français : Amanite rougissante (Golmotte) Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Non caractéristique. Rougisement de la chair - Anneau ample et strié.Volve friable - Stipe napiforme.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  ComestibilitéSans intérêt	Amanita strobiliformis (Vittad.) Bertill. 159 Syn. : Amanita solitaria sensu auct. europ. plur. Nom français : Amanite pomme de pin Habitat : Sous feuillus, dans les parcs et les jardins. Odeur : Faible, agréable. Chapeau gris blanchâtre, orné de lambeaux de voile. Anneau fragile et crémeux.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  ComestibilitéSans intérêt	Amanita submembranacea (Bon) Gröger 160 Syn. : Amanitopsis submembranacea Nom français : Amanite à volve grise Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain acide. Odeur : Non caractéristique. Espèce robuste à chapeau brun-jaune nuancé d'olive. Volve semi-membraneuse, de couleur grise.

22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae Comestibilité Comestible		Amanita vaginata (Bull.) Lam. 162 Syn. : Nom français : Amanite vaginée Habitat : Ubiquiste, sans liaison avec des essences précises. Odeur : Inodore. Stipe sans anneau - Chapeau grisâtre, mamelonné. Volve membraneuse, très engainante - Spores rondes.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae Comestibilité Sans intérêt		Limacella delicata (Fr.) Earle ex Konrad & Maubl. 2321 Syn. : Limacella glioderma - Limacella vinosorubescens Nom français : Limacelle délicate Habitat : Sous conifères ou feuillus, surtout sur des sols riches. Odeur : Un peu farineuse à la coupe. Chapeau crème à fauve rosâtre, roux au centre. Stipe orné de bracelets crème ou ochracé (voile).
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Entolomataceae Comestibilité Comestible		Clitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel. 445 Syn. : Nom français : Meunier de couleur grise Habitat : Dans les bois, en milieux herbeux. Odeur : Fortement farineuse. Chapeau gris, taché de brun - Stipe trapu - Chair fragile. Lames étroites, crème puis teintées de rose
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Entolomataceae Comestibilité Comestible		Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kummer 450 Syn. : Nom français : Meunier Habitat : Sous feuillus et résineux, dans les clairières. Odeur : Fortement farineuse. Chapeau de forme variable, blanchâtre, cassant. Lames très décurrentes, blanches puis roses.
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Entolomataceae Comestibilité Toxique		Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagn.) Kubicka 1286 Syn. : Nom français : Entolome à pied blanc Habitat : Sous feuillus, dans les clairières, en lisière des bois. Odeur : Farineuse. Chapeau très hygrophane, brun ochracé à grisâtre. Stipe blanc puis crème - Chair blanche.
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Entolomataceae Comestibilité Toxique		Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. 1325 Syn. : Entoloma nidorosum Entoloma rhodopolium var. nidorosum Nom français : Entolome rose-gris Habitat : Sous feuillus (hêtres) et conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeau hygrophane, gris brun-ocre. Lames blanc sordide - Stipe blanc grisâtre.

23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Entolomataceae  Comestibilité Toxique		Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. 1341 Syn. : Entoloma lividum Nom français : Entolome livide Habitat : Sous feuillus, surtout sur sols calcaires. Odeur : Farineuse puis subnauséuse. Grosse espèce à chapeau gris-brun, non strié. Lames jaune de beurre puis saumonées.
23 - Plutées, volvaires et entolomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Pluteaceae Comestibilité Sans intérêt		Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 2838 Syn. : Pluteus brunneoradiatus - Pluteus atricapillus Nom français : Plutée couleur de cerf Habitat : Sur souches et bois mort de feuillus et de conifères. Odeur : Nettement raphanoïde. Chapeau gris brunâtre, sans nuances olivâtres. Lames à arête concolore - Hyphes non bouclées.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Calonarius atrovirens (Kalchbr.) Niskanen & Liimat. 583 Syn. : Cortinarius atrovirens Nom français : Cortinaire vert foncé Habitat : Sous conifères de montagne, sur sols calcaires. Odeur : Forte de poivre. Grosse espèce à chapeau visqueux vert olive. Stipe bulbeux-marginé - Lames et chair jaune verdâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Calonarius dibaphus Fr. 690 Syn. : Cortinarius dibaphus Nom français : Cortinaire à deux couleurs Habitat : Sous conifères calcicoles de montagne. Odeur : Faible, de renfermé. Chapeau très visqueux, lilas brunâtre - Saveur amère. Stipe nettement bulbeux, bleu violacé - Lames bleues.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Calonarius elegantior (Fr.) Niskanen & Liimat. 704 Syn. : Cortinarius elegantior Nom français : Cortinaire élégant Habitat : Dans les pessières, jusqu'à 2 000 m d'altitude. Odeur : Faible, insignifiante. Chapeau brun-jaune uniforme - Lames jaune olivacé. Voile jaunâtre pâle - Stipe bulbeux-marginé-turbiné.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Calonarius odoratus (Joguet ex M.M. Moser) Niskanen & Liimat. 846 Syn. : Cortinarius odoratus Nom français : Cortinaire odorant Habitat : Sous feuillus (charmes et hêtres), sur sol calcaire. Odeur : Forte d'eau de fleur d'oranger. Chapeau visqueux, vert-jaune à vert olivâtre. Stipe bulbeux-marginé, violacé au sommet au début.

24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Calonarius odorifer (Britzelm.) Niskanen & Liiat. 847 Syn. : Cortinarius odorifer Nom français : Cortinaire à bonne odeur Habitat : Sous conifères, surtout en montagne, sur sol calcaire. Odeur : D'anis ou de fenouil. Chapeau de 5-10 cm, visqueux, gris-vert à brun-rouge. Lames jaune-vert - Stipe bulbeux marginé, jaune-vert.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Zawadzki 557 Syn. : Nom français : Cortinaire blanc violacé Habitat : Sous différents feuillus, surtout sous bouleaux. Odeur : Faible, insignifiante. Chapeau luisant, violet clair - Lames gris pâle. Stipe concolore au chapeau - Voile blanchâtre, laineux.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius calochrous (Persoon) Gray 625 Syn. : Nom français : Cortinaire aux belles couleurs Habitat : Dans les hêtraies pures, sur sols calcaires. Odeur : Subnulle ou faiblement raphanoïde. Chapeau brun-roux à ocre-jaune, finement ponctué. Lames lilas rosé - Cortine copieuse, ochracée.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité A rejeter		Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. 627 Syn. : Cortinarius amethystinus - Cortinarius hircinus Nom français : Cortinaire camphré (à odeur de bouc) Habitat : En montagne, sous conifères, sur sols plutôt acides. Odeur : Désagréable d'acétylène, de corne brûlée. Chapeau gris-bleu pâle puis envahi d'ochracé. Lames violettes - Stipe bleu lilas pâle puis jaunissant.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Comestible		Cortinarius caperatus Pers. 632 Syn. : Rozites caperata Nom français : Pholiote ridée Habitat : Sous conifères et feuillus, dans les myrtilliers. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau ochracé pâle, givré de blanc grisâtre. Stipe orné d'un anneau membraneux blanchâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Mortel		Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. Orton 645 Syn. : Nom français : Cortinaire jaune cannelle Habitat : Dans les endroits humides, jusqu'en zone alpine. Odeur : Insignifiante. Chapeau de 1 à 4 cm, jaune olivâtre, feutré. Lames jaunes - Stipe jaune - Chair blanchâtre.

24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  TOXIQUE Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius collinitus (Sowerby) Gray 829 Syn. : Cortinarius muscigenus Nom français : Cortinaire visqueux Habitat : Sous épicéas. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau très visqueux, brun-rouge à brun orangé. Stipe très visqueux, bleu violacé - Chair blanchâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius largus Fr. 794 Syn. : Cortinarius lividoviolaceus Nom français : Cortinaire à voile abondant Habitat : Dans les forêts de feuillus (hêtres), sur sol calcaire. Odeur : Nulle ou faiblement iodée à un peu fruitée. Chapeau visqueux, gris bleuâtre - Lames bleu lilas. Stipe violacé au sommet - Voile blanc, abondant.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Cortinarius melanotus Kalchbr. 816 Syn. : Nom français : Cortinaire à squames brunes Habitat : En montagne, sous les sapins, sur sols calcaires. Odeur : De persil. Chapeau brun olive, couvert de fines mèches brun-noir. Lames vert olive - Stipe blanchâtre guirlandé d'olivâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr. 861 Syn. : Nom français : Cortinaire cuivré Habitat : Dans les hêtraies-sapinières, en terrain calcicole. Odeur : Nulle. Chapeau rouge sang ou brun-rouge bordé de gris-vert. Lames jaune verdâtre - Pied orné d'un bulbe volviforme.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Comestible		Cortinarius praestans (Cordier) Gillet 896 Syn. : Nom français : Cortinaire remarquable Habitat : Sous feuillus (hêtres), sur sols calcaires. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun violacé, taché de blanc lilas par le voile. Marge du chapeau ridée - Stipe blanchâtre à violacé.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  MORTEL Comestibilité Mortel		Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray 953 Syn. : Cortinarius puniceus Nom français : Cortinaire sanguin Habitat : Dans les sapinières et pessières humides. Odeur : Raphanoïde ou de bois de cèdre. Coloration entièrement rouge sang - Mycélium orangé. Silhouette élancée - Chapeau finement squamuleux.

24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius traganus (Fr.) Fr. 1020 Syn. : Nom français : Cortinaire à odeur de poire Habitat : En montagne, dans les pessières plutôt non calcaires. Odeur : Forte odeur d'acétylène, de poire (alcool). Chapeau lilas violacé puis ochracé - Lames brunes. Chair safranée ou brun-roux.- Stipe lilas puis brunâtre.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius trivialis J.E. Lange 1025 Syn. : Nom français : Cortinaire trivial Habitat : Sous feuillus (hêtres et chênes), en terrain siliceux. Odeur : Nulle. Voile rompu en grossières écailles sur le stipe. Lames violettes - Chapeau visqueux, brun-rouge.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius varicolor (Pers.) Fr. 1037 Syn. : Cortinarius largiusculus - Cortinarius nemorensis Nom français : Cortinaire de couleur variable Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain siliceux. Odeur : Fortement terreuse. Chapeau fibrillo-vergeté, brun-roux, à marge violacée. Stipe bleuâtre, subbulbeux, fibrilleux.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Comestible		Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. 1040 Syn. : Nom français : Cortinaire variable Habitat : En montagne, exclusivement associé à l'épicéa. Odeur : Faible, un peu fétide à la coupe. Chapeau visqueux, jaune orangé +/- vif - Lames lilas. Stipe en massue, blanc, à voile blanchâtre peu épais.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae  Comestibilité Toxique		Cortinarius venetus (Fr.) Fr. 1041 Syn. : Nom français : Cortinaire vert olive Habitat : Dans les hêtraies-sapinières de montagne. Odeur : Raphanoïde. Chapeau brun olivâtre, fibrilleux, feutré à squamuleux. Stipe et voile jaune olive - Lames vert olive à brun olive.
24 - Les cortinaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Cortinariaceae Comestibilité Sans intérêt		Cortinarius violaceus (L.) Gray 1050 Syn. : Nom français : Cortinaire violet Habitat : Sous feuillus, peut être sous conifères. Odeur : De cuir de Russie ou de bois de cèdre. Chapeau fortement velouté, bleu-violet - Lames violettes Stipe concolore au chapeau - Saveur douce.

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae



Comestibilité Sans intérêt

Phlegmacium percome (Fr.) A. Blytt

875

Syn. : Cortinarius percomis

Nom français : Cortinaire aromatique

Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain calcaire.

Odeur : Aromatique, suave, de fleur d'oranger.

Chapeau jaune doré à fauve, à marge excédante.

Lames, stipe et chair jaune citron vif.

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae



Comestibilité Sans intérêt

Phlegmacium triumphans (Fr.) A. Blytt

1024

Syn. : Cortinarius crocolitus - Cortinarius triumphans

Nom français : Cortinaire triomphant

Habitat : Sous bouleaux et autres feuillus, en terrain siliceux.

Odeur : Insignifiante ou terreuse.

Chapeau jaune ochracé - Lames blanches à crème.

Stipe chiné de bracelets jaune roussâtre.

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae



Comestibilité Toxique



Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen & Liimat.

922

Syn. : Cortinarius eumarginatus - Cortinarius purpurascens

Nom français : Cortinarius purpurescent

Habitat : Sous conifères (épicéas), sur sols acides.

Odeur : Nulle.

Chapeau visqueux, gris-bleu, orné de fibrilles brunes.

Lames se tachant de violet sombre au froissement.

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae



Comestibilité Toxique



Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quéf.

1548

Syn. : Hebeloma longicaudum

Nom français : Hébélome croûte de pain

Habitat : Ubiquiste, mais souvent sous feuillus.

Odeur : Raphanoïde.

Espèce moyenne à chapeau visqueux et brun-ocre.

Lames à pleurs abondants - Pied bulbeux, blanc.

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae



Comestibilité Sans intérêt

Hebeloma fusicolor Gröger & Zschiesch.

1554

Syn. :

Nom français : Hébélome à spores fusiformes

Habitat : Sous feuillus, surtout saules et tilleuls.

Odeur : De fleur d'oranger, de sucre brûlé.

Chapeau blanc à beige ochracé - Lames espacées.

Stipe blanchâtre à beige pâle - Saveur un peu amère.

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae



Comestibilité Sans intérêt

Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken

1573

Syn. :

Nom français : Hébélome radicaire

Habitat : Sur bois pourri de conifères, en montagne.

Odeur : Forte d'amandes amères.

Chapeau visqueux, jaune rougeâtre, pruineux.

Stipe radicaire, orné d'une armille écailleuse annelée.

25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  Comestibilité Toxique		Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet 1576 Syn. : Nom français : Hébélome échaudé Habitat : Ubiquiste, sous conifères et feuillus. Odeur : Fortement raphanoïde. Chapeau cuir fauvâtre - Lames non pleureuses. Présence d'une mèche en haut du stipe (coupe).
25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae  Comestibilité Toxique		Inocybe corydalina Qué. 1866 Syn. : Nom français : Inocybe à odeur de corydaline Habitat : Surtout sous hêtres, sur sols calcaires. Odeur : De savonnelle parfumée, de fleurs. Chapeau mamelonné, bleu-vert sale au disque. Stipe brunissant à partir de la base.
25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae  Comestibilité Toxique		Inocybe geophylla P. Kumm. 1887 Syn. : Nom français : Inocybe à lames terreuses Habitat : En terrain humide, surtout sous feuillus. Odeur : Spermatique. Chapeau blanc, mamelonné, soyeux. Lames pâles à brun ochracé, plutôt serrées.
25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae  Comestibilité Toxique		Inocybe geophylla (Peck) Gillet 1888 var. lilacina Syn. : Nom français : Inocybe geophylla de couleur lilas Habitat : Surtout sous feuillus. Odeur : Spermatique. Chapeau violet ou lilas puis pâissant. Stipe lilacin pâle ou +/- lavé de jaune.
25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae  Comestibilité Toxique		Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc. 1971 Syn. : Inocybe pudica Nom français : Inocybe pudique Habitat : Surtout sous conifères hygrophiles. Odeur : Spermatique. Chapeau fibrillo-soyeux, blanc puis rose brique. Stipe blanc puis rosâtre, poudré au sommet.
25 - Inocybes et hébélomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Inocybaceae  Comestibilité Toxique		Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. 1875 Syn. : Inocybe rimosa - Inocybe fastigiata Nom français : Inocybe fastigié Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères. Odeur : Spermatique. Chapeau paille à jaunâtre, nettement vergeté. Lames ventruées, jaunâtre olivacé - Stipe blanchâtre.

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Strophariaceae


Comestibilité **Toxique**

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill

1484

Syn. : **Gymnopilus stabilis** - **Gymnopilus hybridus**

Nom français : **Gymnopile pénétrant**

Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus.

Odeur : Légèrement herbacée.

Chapeau feutré, jaune orangé - Cortine persistante.

Lames jaunâtres et saveur amère.

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Strophariaceae


Comestibilité **Comestible**

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.

1794

Syn. : **Geophila capnoides**

Nom français : **Hypholome à lames enfumées**

Habitat : Sur souches et racines de conifères.

Odeur : Plutôt agréable.

En touffes, à chapeaux lisses et jaune olive.

Lames lavées de lilas puis noirâtres - Saveur douce.

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Strophariaceae


Comestibilité **Toxique**

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

1800

Syn. : **Geophila fascicularis** - **Psilocybe fascicularis**

Nom français : **Hypholome en touffes**

Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.

Odeur : De polypore.

En touffes sur les souches ou le bois mort.

Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Strophariaceae


Comestibilité **Toxique**

Hypholoma marginatum J. Schröt.

1806

Syn. : **Hypholoma dispersum** - **Psilocybe marginata**

Nom français : **Hypholome marginé**

Habitat : Sur bois et débris divers de conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Marge piléique ornée des restes du voile blanc.

Stipe coriace, voilé-chiné de fibrilles blanches.

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Strophariaceae


Comestibilité **Comestible**

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.

1985

Syn. : **Pholiota mutabilis**

Nom français : **Pholiote changeante**

Habitat : Surtout sur souches de hêtres.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau très hygrophane, brun foncé à miel.

Pied orné d'une armille fibrillo-squamuleuse.

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Strophariaceae


Comestibilité **Sans intérêt**

Pholiota gummosa (Lasch) Singer

2776

Syn. : **Flammula gummosa**

Nom français : **Pholiote gommeuse**

Habitat : Dans les clairières herbeuses, sur débris ligneux.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau floconneux, beige sur fond jaune verdâtre.

Stipe moucheté sous une zone annulaire cortiniforme.

26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae Comestibilité Sans intérêt		Pholiota lenta (Pers.) Singer 2782 Syn. : Flammula lenta Dryophila lenta Nom français : Pholiote glutineuse Habitat : Sous feuillus et conifères, sur bois dégradé. Odeur : Faible, légèrement iodée. Chapeau beige ochracé jaunâtre, très visqueux, avec des flocons blancs noyés dans le mucus.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae Comestibilité Sans intérêt		Pyrrhulomyces astragalinus (Fr.) E.J. Tian & Matheny 2768 Syn. : Flammula astragalina - Pholiota astragalina Nom français : Pholiote rouge brique Habitat : Fasciculés sur bois pourrissant de conifères. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau ochracé abricot à briqueté ou rose orangé. Stipe élancé, souvent flexueux - Saveur amère.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. 3387 Syn. : Psilocybe aeruginosa Nom français : Strophaire vert de gris Habitat : En lisière des bois, sur débris végétaux pourrissant. Odeur : Légèrement herbacée. Chapeau bleu-vert, visqueux, à marge appendiculée. Arête des lames blanche - Anneau visqueux, pendant.
26 - Autres cortinariales Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Strophariaceae  TOXIQUE Comestibilité Toxique		Stropharia caerulea Kreisel 3390 Syn. : Stropharia cyanea sensu Tuomikoski Psilocybe caerulea Nom français : Strophaire bleutée Habitat : Dans les lieux rudéralisés, souvent parmi les orties. Odeur : Faible, herbacée. Chapeau bleu verdâtre puis jaunâtre, visqueux. Arête des lames concolore - Anneau fugace.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula amoena Quél. 3067 Syn. : Nom français : Russule veloutée, agréable, charmante, amène Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain siliceux. Odeur : D'artichaut ou de topinambour. Chapeau mat et velouté, violet à lilas mauve - Pied pruneux de violacé - Saveur douce - Lames crème.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula anthracina var. insipida Romagn. 3076 Syn. : Nom français : Variété douce de Russula anthracina Habitat : Sous feuillus. Odeur : Faible, un peu fruitée. Diffère du type par sa saveur douce, même dans les lames.

27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula cavipes Britzelm. 3099 Syn. : Nom français : Russule à pied creux Habitat : Surtout sous épicéas. Odeur : Safranée ou de pommes. Chapeau bigarré, violet nuancé d'olive - Lames crème, réagissant en rose avec NH3 - Saveur subdouce.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula chloroides (Krombh.) Bres. 3101 Syn. : Nom français : Russule à lames glauques Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres. Odeur : Forte, fruitée. Grande espèce à chapeau blanc, sec, déprimé. Lames étroites - Stipe parfois zoné de vert au sommet.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 3113 Syn. : Nom français : Russule charbonnière Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres. Odeur : Faible, non significative. Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce. Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Russula cyanoxantha Singer 3114 fo. peltereau Syn. : Russula cyanoxantha var. peltereau Nom français : Russule de Peltereau Habitat : Généralement sous hêtres, mais ubiquiste. Odeur : Faible, non significative. Diffère du type uniquement par la couleur de son chapeau, vert amande, vert wagon ou vert concombre.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula delica Fr. 3119 Syn. : Nom français : Russule sans lait Habitat : Plutôt calcicole, surtout sous hêtres. Odeur : Fruitée, de hareng ou de poisson. Grosse espèce charnue - Saveur douce - Stipe court. Lames blanches, espacées, épaisses.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Toxique		Russula emetica (Schaeff.) Pers. 3125 Syn. : Nom français : Russule émetique Habitat : Dans la mousse ou les sphaignes des marécages. Odeur : Subnulle ou un peu fruitée. Chapeau rouge cerise - Stipe blanc tendant à jaunir. Lames blanches - Saveur très âcre.

27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvara 3128 Syn. : Russula pulchella Nom français : Russule pâissante Habitat : Sous bouleaux, surtout sur sols calcaires. Odeur : Faible, un peu fruitée. Chapeau rose violet mêlé de verdâtre au centre. Lames ocre terne - Saveur un peu âcre.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula integra (L.) Fr. 3163 Syn. : Russula piceetorum - Russula adulterina Nom français : Russule intègre Habitat : Dans les pessières de montagne. Odeur : Très faible d'iode à la coupe. Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns. Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Russula ionochlora Romagn. 3167 Syn. : Russula grisea var. ionochlora Nom français : Russule verte et violette Habitat : Surtout sous feuillus, en particulier sous les hêtres. Odeur : Subnulle. Chapeau violet au bord et vert amande vers le centre. Lames blanches à crème - Saveur subdouce.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Russula mustelina Fr. 3197 Syn. : Nom français : Russule couleur de belette Habitat : Dans les pessières à myrtilles, en montagne. Odeur : Faible, non caractéristique. Espèce compacte - Chapeau sec, brun noisette. Saveur douce - Lames crème - Chair épaisse.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula nigricans Fr. 3200 Syn. : Nom français : Russule noircissante Habitat : Sous conifères, dans les pessières de montagne. Odeur : Faible, un peu fruitée. Chapeau blanchâtre, marbré de bistre - Saveur douce. Lames espacées - Chair rougissante et noircissante.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Toxique		Russula nobilis Velen. 3189 Syn. : Russula fageticola - Russula mairei Nom français : Russule de Maire Habitat : Sous hêtres, en terrain acide. Odeur : De coco. Port robuste et chapeau ferme, d'un beau rouge. Lames blanc glauque - Saveur âcre - Stipe blanc pur.

27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Sans intérêt		Russula ochroleuca Pers. 3204 Syn. : Nom français : Russule ocre et blanche Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des tourbières. Odeur : Faiblement fruitée. Chapeau ochracé - Lames blanches à crème pâle. Saveur âcre à presque douce - Stipe blanc, grisonnant.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Mortel		Russula olivacea (Schaeff.) Fr. 3207 Syn. : Nom français : Russule olivacée Habitat : En montagne, sous hêtres et épicéas. Odeur : Faible, un peu fruitée. Chapeau vert à brun ou jaune, sec - Saveur douce. Phénol = pourpre - Lames jaunes.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula parazurea Jul. Schäff. 3212 Syn. : Russula ochrospora Nom français : Russule bleu-vert Habitat : Sous feuillus, en terrain acide. Odeur : Faible. Chapeau bleu-vert à gris-bleuté - Saveur subdouce. Lames blanches puis crème ochracé - Chair ferme.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula puellaris Fr. 3229 Syn. : Nom français : Russule jeune fille Habitat : Surtout sous conifères (épicéas), rare sous feuillus. Odeur : Faible, non caractéristique. Petite espèce à chapeau pourpre - Lames crème. Saveur subdouce - Jaunissement de toutes les parties.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Toxique		Russula queletii Fr. 3222 Syn. : Nom français : Russule de Quélet Habitat : Sous épicéas de montagne, en terrain calcaire. Odeur : De compote de pommes. Chapeau pourpre foncé - Lames blanches à crème. Saveur âcre - Chair blanche - Stipe rose pourpre.
27 - Les russules Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Russula romellii Maire 3240 Syn. : Nom français : Russule de Romell Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres. Odeur : Faible, un peu fruitée. Chapeau violet à la marge et jaune olivacé au disque. Saveur douce - Lames très fragiles, jaune orangé.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**


Comestibilité **Toxique**

Russula sanguinaria (Schumach.) Rauschert

3248

Syn. : **Russula sanguinea**

Nom français : **Russule sanguine**

Habitat : Sous pins, dans les hauts marais, en zone subalpine.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau charnu, rouge sang - Lames crème à ocre.

Saveur âcre - Stipe plein, dur, maculé de rose rouge.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**

Russula sardonia Fr.

3250

Syn. : **Russula drimeia**

Nom français : **Russule sardoine**

Habitat : Sous pins.

Odeur : Faible ou un peu fruitée.

Chapeau et stipe pourpre violacé - Saveur très âcre.

Lames à reflets citrins, réagissant en rose avec NH3.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**
Russula sericatulula Romagn.

3255

Syn. : **Russula cupreoviolacea var. erubescens**

Nom français : **Russule soyeuse**

Habitat : Sous feuillus, surtout sous les charmes.

Odeur : Parfois légère de crustacés.

Chapeau brun acajou à brun vineux, +/- crème-ocre.

Lames crème puis jaune orangé - Saveur douce.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**

Russula subfoetens W.G. Smith

3263

Syn. : **Russula foetens var. subfoetens**

Nom français : **Russula fausse-fétide**

Habitat : Sous feuillus.

Odeur : Nauséuse.

Chapeau visqueux, ocre doré - Lames crème ocre.

Réaction jaune de chrome avec KOH - Saveur âcre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.

3289

Syn. :

Nom français : **Russule feuille morte - Russule écrevisse**

Habitat : Sous conifères de montagne, près des hauts-marais.

Odeur : De crustacés en train de cuire.

Chapeau pourpre - Stipe rose rouge - Lames ocre.

Saveur douce - Réaction verte avec SO4Fe.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Sans intérêt**

Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray

2016

Syn. : **Lactarius aurantiofulvus**

Nom français : **Lactaire fauve orangé**

Habitat : En montagne, sous épicéas.

Odeur : Faible, de hareng salé à la fin.

Chapeau orangé ou fauve orangé, non zoné.




Latex abondant, immuable, doux puis amer.

28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius blennius (Schrad.) Quél. 2022 var. viridis Syn. : Nom français : Forme olivâtre du Lactaire muqueux Habitat : Uniquement sous les hêtres. Odeur : Subnulle. Entièrement olivâtre - Souvent confondu avec Lactarius fluens, à chapeau sec et latex très abondant.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius camphoratus (Bull.) Fr. 2026 Syn. : Nom français : Lactaire camphré Habitat : Sous feuillus et conifères, sur les souches. Odeur : De chicorée en séchant. Chapeau brun-rouge, mamelonné, non zoné. Latex peu séreux, immuable, doux.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius chrysorrheus Fr. 2028 Syn. : Nom français : Lactaire à lait jaunissant Habitat : Sous feuillus (chênes, châtaigniers ...). Odeur : Subnulle. Chapeau sec, jaune-orange, zoné-guttulé. Latex très abondant, virant rapidement au jaune.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Lactarius deliciosus (L.) Gray 2036 Syn. : Nom français : Lactaire délicieux Habitat : Sous pins, en terrain calcaire. Odeur : Fruitée, de carotte fraîche. Chapeau ocre orangé, zoné, taché de vert. Latex orangé vif, immuable - Chair rouge carotte.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Lactarius deterrimus Gröger 2037 Syn. : Nom français : Lactaire des épicéas Habitat : Exclusivement sous épicéas. Odeur : Nulle. Chapeau orangé vif, vite verdissant, zoné. Latex peu abondant, orange, immuable, amer.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius fluens Boud. 2044 Syn. : Nom français : Lactaire pisse-lait Habitat : Sous feuillus (surtout hêtres). Odeur : Faiblement fruitée. Chapeau brunâtre, zoné de brun verdâtre. Latex très copieux, blanc virant au gris verdâtre.

28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Sans intérêt		Lactarius glycosmus (Fr.) Fr. 2048 Syn. : Nom français : Lactaire à odeur de noix de coco Habitat : Sous bouleaux, en terrain acide. Odeur : De noix de coco. Chapeau beige rosâtre, pruneux, feutré. Latex peu abondant, fluide, doux puis âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Toxique		Lactarius intermedius Krombh ex Berk. & Broome 2055 Syn. : Nom français : Lactaire des sapins Habitat : Dans les hêtraies-sapinières. Odeur : Subnulle ou un peu fruitée. Chapeau jaune ochracé, non ou peu zoné. Latex peu abondant, jaunissant à l'air, âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Comestible		Lactarius lignyotus Fr. 2059 Syn. : Nom français : Lactaire couleur de suie Habitat : Dans les tourbières, dans les sphaignes. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau déprimé autour d'un mamelon aigu. Lames decurrentes, longtemps blanches.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius pallidus Pers. 2070 Syn. : Nom français : Lactaire pâle Habitat : Uniquement sous hêtres, surtout sur sol calcaire. Odeur : Subnulle. Chapeau charnu, crème carné à beige pâle. Latex peu abondant, immuable, un peu âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Toxique		Lactarius pubescens Fr. 2075 Syn. : Nom français : Lactaire pubescent Habitat : Sous bouleaux, dans les tourbières. Odeur : Un peu fruitée. Chapeau blanchâtre nuancé de rose, feutré. Latex jaunissant sur le mouchoir, très âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae Comestibilité Sans intérêt		Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. 2076 Syn. : Nom français : Lactaire à lait brûlant Habitat : Sous feuillus, surtout sous noisetiers. Odeur : Faible, légèrement fruitée. Chapeau humide, ochracé livide, +/- zoné. Latex très âcre, réagissant en jaune avec KOH.

28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Comestible		Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair 2091 Syn. : Nom français : Lactaire couleur saumon Habitat : Sous les sapins. Odeur : Faible, légèrement savonneuse. Chapeau jaune orangé, sans traces de vert. Latex abondant, rouge carotte, subimmuable.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Toxique		Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr. 2094 Syn. : Nom français : Lactaire scrobiculé Habitat : En montagne, dans les pessières. Odeur : Fruitée à subpélargoniée. Chapeau ocre-jaune, à marge barbue-laineuse. Latex abondant, jaune soufre à l'air, brûlant.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Toxique		Lactarius torminosus (Schaeff.) Pers. 2106 Syn. : Nom français : Lactaire à toisons Habitat : Strictement sous bouleaux. Odeur : Faiblement fruitée, subpélargoniée. Chapeau briqueté orangé, à marge barbue. Latex jaunissant sur le mouchoir, très âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Sans intérêt		Lactarius trivialis (Fr.) Fr. 2107 Syn. : Nom français : Lactaire trivial Habitat : Dans les pessières, les tourbières. Odeur : Vaguement fruitée. Chapeau visqueux, gris-brun vineux, parfois beige. Latex très âcre, beige verdâtre en séchant.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité Sans intérêt		Lactarius uvidus (Fr.) Fr. 2110 Syn. : Nom français : Lactaire humide Habitat : Sous bouleaux et saules, dans les mares. Odeur : Faible ou nulle. Chapeau beige lilacin, très visqueux, non zoné. Latex se teintant de violet sur les lames.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Boletus edulis Bull. 263 Syn. : Nom français : Cèpe de Bordeaux Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide. Odeur : Fongique, très agréable. Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre. Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.

29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Butyriboletus appendiculatus (Fr.) Arora & Frank 286 Syn. : Boletus appendiculatus Nom français : Bolet appendiculé Habitat : Sous feuillus (hêtres, chênes ...). En terrain calcaire. Odeur : Agréable d'écale de noix. Chapeau brun-jaune - Stipe jaune, à réseau concolore. Chair crème, bleuissante - Saveur douce.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Toxique		Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini 295 Syn. : Boletus calopus Nom français : Bolet à beau pied Habitat : Sous conifères et feuillus, en montagne. Odeur : Un peu acidulée, de vinaigre. Stipe rouge, jaune en haut - Réseau blanc, très visible. Chair bleuissant légèrement à la coupe, très amère.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Paxillaceae Comestibilité Sans intérêt		Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. 1521 Syn. : Boletus lividus Nom français : Bolet livide Habitat : Uniquement sous les aulnes. Odeur : Faible, un peu acidulée. Chapeau jaune ochracé à brun fauve. Stipe jaune, fibrilleux de brun-roux - Tubes decurrents.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Imleria badia (Fr.) Vizzini 1824 Syn. : Boletus badius - Xerocomus badius Nom français : Bolet bai Habitat : Sous conifères et feuillus. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau bai à marron, de couleur uniforme. Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Leccinum scabrum (Bull.) Gray 2151 Syn. : Boletus scaber Nom français : Bolet rude Habitat : Sous bouleaux. Odeur : Agréable. Chapeau brun fauve, finement feutré. Stipe élancé, orné de fines squamules bistres.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Leccinum variicolor Watling 2152 Syn. : Boletus variicolor - Krombholziella variicolor Nom français : Bolet ramoneur Habitat : Sous bouleaux, dans les endroits humides. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-noir avec des zones décolorées. Stipe gris blanchâtre, orné de squamules brun-noir.

29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Leccinum versipelle (Fr.) Snell 2153 Syn. : Leccinum testaceoscabrum Nom français : Bolet roux Habitat : Uniquement sous les bouleaux. Odeur : Agréable. Chapeau orangé, velouté, à marge débordante. Stipe orné d'écailles brun-noir, vert-bleu à la base.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn 2601 Syn. : Boletus erythropus Nom français : Bolet à pied rouge Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne. Odeur : +/- fruitée. Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté. Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Toxique		Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.J. Gilbert 2880 Syn. : Porphyrellus pseudoscaber Tylopilus porphyrosporus Nom français : Bolet porphyre Habitat : Sous feuillus et sous conifères de montagne. Odeur : Chapeau sec, brun noirâtre olivacé, finement velouté. Pores petits, arrondis, gris à pourpres.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Suillaceae  Comestibilité Sans intérêt		Suillus bovinus (L.) Roussel 3412 Syn. : Boletus bovinus Nom français : Bolet des bouviers Habitat : Sous pins. Odeur : Faible de scléroderme. Chapeau visqueux, fauve ou chamois - Mycélium rose. Tubes adnés-décurrents - Pores amples, composés.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Suillaceae  Comestibilité Sans intérêt		Suillus cavipes (Opat.) A.H. Sm. & Thiers 3414 Syn. : Boletinus cavipes - Boletus cavipes Boletus cavipes var. aureus Nom français : Bolet à pied creux Habitat : Sous mélèzes. Odeur : Non caractéristique. Chapeau marron, sec, à mamelon saillant, feutré. Stipe creux, réticulé-alvéolé - Anneau épais, feutré.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Suillaceae  Comestibilité Toxique		Suillus granulatus (L.) Roussel 3419 Syn. : Boletus granulatus - Suillus collinitus var. velatipes Nom français : Bolet granulé Habitat : Uniquement sous les pins. Odeur : Agréable, épicée. Chapeau brun-jaune, visqueux, à cuticule séparable. Pores composés - Stipe granuleux au sommet.

29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Suillaceae Comestibilité Sans intérêt		Suillus grevillei (Klotzch) Singer3420 Syn. : Suillus elegans - Boletus elegans - Boletus grevillei Nom français : Bolet de Greville (Bolet élégant) Habitat : Sous mélèzes, de la plaine à la montagne. Odeur : Agréable, fruitée. Chapeau jaune d'or ou jaune orangé, visqueux. Voile partiel cortiniforme, visqueux - Pores étroits.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Suillaceae Comestibilité Comestible		Suillus luteus (L.) Roussel3422 Syn. : Boletus luteus Nom français : Nonnette voilée Habitat : Sous les pins à 2 aiguilles, surtout en montagne. Odeur : Agréable. Chapeau visqueux, brun chocolat - Pores jaunes. Pied ponctué, orné d'un ample anneau membraneux.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Suillaceae Comestibilité Sans intérêt		Suillus tridentinus (Bres.) Singer3428 Syn. : Boletus tridentinus Nom français : Bolet du Trentin Habitat : Sous mélèzes, en terrain calcaire. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau fibrilleux-squamuleux, brun rougeâtre. Anneau membraneux. - Pores anguleux, jaune orangé.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Sans intérêt		Tylophilus felleus Bull.3601 Syn. : Boletus felleus - Suillus felleus Nom français : Bolet amer (Chicotin) Habitat : Sous conifères et feuillus, de la plaine à la montagne. Odeur : Faible, agréable. Chapeau sec, feutré, brun noisette - Chair immuable. Pores blancs à roses - Stipe orné d'un réseau en relief.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara3632 Syn. : Boletus chrysenteron - Xerocomus chrysenteron Nom français : Bolet à chair jaune Habitat : Sous feuillus et résineux. Odeur : De scléroderme. Chapeau brun clair, rougeâtre dans les blessures. Pores amples, anguleux - Stipe rayé de rouge carminé.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Sans intérêt		Xerocomellus porosporus (Imlier ex Bon & Moreno) Sutara3634 Syn. : Xerocomus porosporus - Boletus porosporus Nom français : Bolet à chapeau fissuré Habitat : Sous feuillus, surtout sous chênes. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau brun olive à brun-gris noirâtre, vite fissuré. Pores jaune-olivâtre, bleuissants - Saveur douce.

29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible	 <i>Xerocomellus pruinatus</i> Charles Rougier	Xerocomellus pruinatus (Fr. & Hök) Sutara 3635 Syn. : Xerocomus pruinatus Boletus pruinatus Nom français : Bolet pruneux Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres. Odeur : Agréable. Chapeau bai foncé, charnu, velouté, pruneux. Saveur acidulée - Pores grands et anguleux.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon 3640 Syn. : Boletus ferrugineus - Boletus et Xerocomus lanatus Boletus et Xerocomus spadiceus Nom français : Bolet ferrugineux Habitat : Sous feuillus et sous conifères. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau brun-rouge, verdissant avec NH3. Pores jaune +/- vif - Stipe fibrillo-ridé - Chair crème.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible	 <i>Boletus subtomentosus</i> Charles Rougier	Xerocomus subtomentosus (L.) Quéf. 3644 Syn. : Xerocomus xanthus - Boletus subtomentosus Nom français : Bolet subtamenteux Habitat : Sous feuillus et conifères, ubiquiste. Odeur : Un peu fruitée. Chapeau brun-jaune à olivâtre, velouté-feutré. Pores jaune d'or, non bleuissants - Stipe fibrilleux.
30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Gomphidiaceae Comestibilité Sans intérêt	 <i>Chroogomphus helveticus</i> Charles Rougier	Chroogomphus helveticus subsp. tatrensis (Pilát) Kuthan & Singer 362 Syn. : Nom français : Gomphide squamuleux Habitat : Sous sapins et épicéas. Odeur : Odeur agréable, un peu fruitée. Chapeau orange, hémisphérique, feutré-squamuleux. Chair jaunâtre orangé - Lames espacées et épaisses.
30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Gomphidiaceae Comestibilité Comestible	 <i>Gomphidius glutinosus</i> Charles Rougier	Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. 1463 Syn. : Nom français : Gomphide glutineux Habitat : Sous conifères de montagne. Odeur : Insignifiante. Chapeau brun ochracé, recouvert d'un voile glutineux. Lames espacées, très décurrentes.
30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Hygrophoropsidaceae Comestibilité Comestible	 <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> Charles Rougier	Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire 1728 Syn. : Nom français : Fausse chanterelle Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Paxillaceae  Comestibilité Mortel		Paxillus involutus (Batsch) Fr. 2685 Syn. : Nom français : Paxille enroulé Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs. Odeur : Faible, de scléroderme. Chapeau roux ochracé, à marge involutée. Lames très serrées, étroites, facilement détachables.
30 - Les bolétales lamellés Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Paxillaceae  Comestibilité Mortel		Paxillus olivellus P.A. Moreau et al. 2688 Syn. : Paxillus filamentosus sensu auct. Nom français : Paxille filamenteux Habitat : Sous les aulnes (glutinosa et incana), sur sol humide. Odeur : Légèremet fruitée. Chapeau velouté, ocre roussâtre, à marge enroulée. Lames crème à jaunâtre - Stipe se tachant de roux.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Lycoperdaceae Comestibilité Sans intérêt		Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini 2456 Syn. : Lycoperdon pyriforme - Morganela pyriformis Nom français : Vesse de loup en forme de poire Habitat : En touffes sur souches ou bois mort de conifères. Odeur : Plutôt désagréable. Fructifications piriforme - Exopéridium brun-jaune. Gléba blanche puis verdâtre - Subgléba blanche.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Sans intérêt		Bovista plumbea Pers. 279 Syn. : Nom français : Boviste couleur de plomb Habitat : Prés, pâturages, pelouses subalpines et alpines. Odeur : Inodore. Carpophores globuleux ou aplatis, de 2 à 3 cm. Exopéridium blanc - Endopéridium gris à maturité.
31 - Les gastéromycètes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae Comestibilité Comestible		Lycoperdon perlatum Pers. 2345 Syn. : Lycoperdon gemmatum Nom français : Vesse de loup perlée Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles. Odeur : Non caractéristique. Fructifications blanches recouvertes d'aiguillons. Gléba blanche puis olive - Stipe conique.
Myxomycètes Div. Myxomycota Clas. Myxomycetes Ord.. Liceales Fam. Reticulariaceae Comestibilité Sans intérêt		Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. 2335 Syn. : Nom français : Lycogale du bois Habitat : Sur bois mort. Odeur : Nulle. Aethaliums subglobuleux ou pulvins. Plasmode rouge corail - Périidium rugueux.

Myxomycètes

Div. Amoebozoa

Clas. Myxogastrea

Ord.. Liceida

Fam. reticulariaceae

Comestibilité Sans intérêt



Tubifera ferruginosa

Remya et al. 2013

Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel.

3711

Syn. : **Tubifera cylindrica - Stemonitis ferruginosa**

Nom français :

Habitat : Sur bois mort plus ou moins enfouis, sapinière humide.

Odeur : Odeur non caractéristique.

Plasmode d'abord blanc, virant au rose, puis rouge corail et enfin rouge brique sombre.