

SORTIE SMD DU 12 septembre 2026

Freydières - Altitude 1200-1250 m



Vingt-trois membres de la Société Mycologique du Dauphiné se sont retrouvés en début de matinée, près du restaurant La Gélinothe à Freydières : Carolina Badii, El Mehdi Benhani, Gilles Bonnet-Machot, Gilbert Bonthoux, Julien Briffotiaux, Annick et Alain Bucci, Emmanuel Cellier, Suzanne Chardon, Pauline Clot, Renée et Bernard Derobert, Arnaud Fournier, Mickaël Gautron, Didier Gibier, Sylvie et Jean-François Lartigue, Joséphine Lefevre, Cécile Martinet, Olga Marolleau, François Pierre, Antoine Portejoie, Pascal Sabatier, Nathalie Szylowicz.

Cette sortie s'est déroulée sous une météo favorable malgré la relative fraîcheur matinale. Les reconnaissances effectuées les jours précédents par les deux encadrants, Nathalie Szylowicz et François Pierre, sur le site habituellement fréquenté par la SMD se sont révélées infructueuses. Il a donc été décidé de prospecter sur un site plus favorable, à une altitude supérieure, dans une zone au nord du repère à la côte 1229 m visible sur la carte. Deux groupes de recherche ont été constitués dont un pour accompagner les nombreux débutants présents.

Plus de cinquante espèces ont été trouvées en dépit des nombreux épisodes caniculaires et de la sécheresse qui sévissent depuis le mois de juin. L'ensemble du groupe s'est ensuite réuni pour le traditionnel tour de table, à l'endroit habituel du pique-nique, dans la prairie près du lieu dénommé Ferpeyret. Comme pour la recherche sur le terrain, les débutants ont été regroupés à part afin de leur délivrer des informations sur les genres les plus fréquemment récoltés dans la matinée, à savoir *Russula* et *Amanita*.

Merci à tous les participants pour leur implication, avec une mention particulière à l'adresse des débutants que l'on espère aussi nombreux et motivés pour les prochaines sorties. Merci aux mycologues pour leur aide à la détermination, qu'ils aient

été présents sur site ou pas comme Eric Michon. Merci également à Didier Gibier pour la liste illustrée tirée du fichier de la SMD et présentée dans les pages suivantes.

Liste des espèces déterminées :

- *Boletus edulis*
- *Caloboletus calopus*
- *Neoboletus erythropus*
- *Porphyrellus porphyrosporus*
- *Imleria badia*
- *Leccinum scabrum*
- *Tapinella atrotomentosa*
- *Paxillus involutus*
- *Hygrophoropsis aurantiaca*
- *Chroogomphus helveticus* subsp. *tatrensis*
- *Russula olivacea*
- *Russula chloroides*
- *Russula ochroleuca*
- *Russula cyanoxantha*
- *Russula grata*
- *Russula fellea*
- *Russula vesca*
- *Russula integra*
- *Russula violeipes* f. *citrina*
- *Ampulloclitocybe clavipes*
- *Lactarius blennius*
- *Tricholomopsis rutilans*
- *Amanita crocea*
- *Amanita excelsa*
- *Amanita muscaria*
- *Amanita rubescens*
- *Amanita umbrinolutea*
- *Amanita vaginata*
- *Infundibulicybe gibba*
- *Megacollybia platyphylla*
- *Collybiopsis peronata*
- *Collybiopsis confluens*
- *Hymenopellis radicata* f. *marginata*
- *Laccaria laccata*
- *Pluteus* sp.
- *Inocybe* sp.
- *Kuehneromyces mutabilis*
- *Hypholoma fasciculare*
- *Cantharellus cibarius*
- *Lycoperdon perlatum*
- *Pseudohydnum gelatinosum*
- *Calocera viscosa*

- *Crepidotus* sp.
- *Baeospora myosura*
- *Gloeophyllum odoratum*
- *Gloeophyllum abietinum*
- *Laetiporus sulphureus*
- *Pycnoporus cinnabarinus*
- *Ganoderma applanatum*
- *Fomitopsis pinicola*
- *Phallus impudicus*
- *Picipes badius*
- *Pholiota limonella*

12-09-2026 Sortie Freydières

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Dacrymycetes**
 Ord.. **Dacrymycetales**
 Fam. **Dacrymycetaceae**



Comestibilité **Toxique**



Calocera viscosa

Charles Rougier

Calocera viscosa Pers.

301

Syn. :

Nom français : **Calocère visqueuse**

Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères.

Odeur : Inodore.

En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé.

Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Auriculariales**
 Fam. **Exidiaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Pseudohydnum gelatinosum

Charles Rougier

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.

2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**

Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.

Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Charles Rougier

Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst.

1395

Syn. : **Ungulina marginata**

Nom français : **Polypore marginé**

Habitat : Saprophyte des conifères, parfois des feuillus.

Odeur : Acide, forte, évoquant l'odeur des poulaillers.

Fructifications dimidiées à surface brun-rouge.

L'un des polypores les plus communs.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Ganodermataceae**



Comestibilité **A rejeter**



Ganoderma applanatum

Charles Rougier

Ganoderma applanatum (Schaeff.) With.

1425

Syn. : **Ganoderma lipsiense**

Nom français : **Ganoderme plat**

Habitat : Sur bois mort de feuillus.

Odeur : Fongique, agréable.

Chapeau poudré de brun par les spores.

Hyménium poré, souvent parsemé de galles.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gloeophyllales**
 Fam. **Gloeophyllaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Gloeophyllum abietinum

Charles Rougier

Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst.

1456

Syn. : **Lenzites abietinus**

Nom français : **Lenzite du sapin**

Habitat : Saprophyte sur bois mort de conifères.

Odeur : Nulle.

Chapeaux brunâtres, peu ou non zonés.

Lames pruineuses (8 à 12 près de la marge).

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gloeophyllales**
 Fam. **Gloeophyllaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Gloeophyllum odoratum

Charles Rougier

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

1457

Syn. : **Trametes odorata**

Nom français : **Tramète odorante**

Habitat : Sur bois mort d'épicéas, surtout en montagne.

Odeur : Forte d'anis, de vanille ou de pain d'épices.

Chapeau jaune orangé noduleux, feutré.

Trame noircissant en présence de NH3.

12-09-2026 Sortie Freydières

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**



Laetiporus sulphureus Charles Rougier

Comestibilité **Comestible**

Laetiporus sulphureus Bull.

2129

Syn. : **Polyporus sulphureus**

Nom français : **Polypore soufré**

Habitat : Sur feuillus et arbres fruitiers.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications sessiles, entièrement jaunes.

Chapeaux multiples, imbriqués et confluent.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko

2812

Syn. : **Polyporus durus** - **Polyporus badius**
Polyporus picipes

Nom français : **Polypore bai**

Habitat : En touffes parfois congrescentes, sur bois mort.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau luisant et gras, brun-rouge sombre, glabre.

Pores minuscules, arrondis, fermés, simples, blancs.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Pycnoporus cinnabarinus Charles Rougier

Pycnoporus cinnabarina (Jacq.) Fr.

2961

Syn. : **Trametes cinnabarina** - **Polyporus cinnabarinus**

Nom français : **Tramète rouge cinabre**

Habitat : Sur bois mort de feuillus, rarement sur conifères.

Odeur : Non remarquable.

Fructifications sessiles, orange à rouge orangées.

Pores petits, arrondis-anguleux, rouge orangé.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Cantharellales**
 Fam. **Hydnaceae**



Comestibilité **Comestible**



Cantharellus cibarius Charles Rougier

Cantharellus cibarius Fr.

320

Syn. :

Nom français : **Chanterelle ou girolle**

Habitat : Surtout sous feuillus, en terrain non calcaire.

Odeur : Forte et agréable, fruitée, d'abricot.

Chapeau jaune vif uniforme - Chair blanche ou jaune.

Plis décourants, fourchus, jaune orangé.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Tricholomataceae**



Comestibilité **Toxique**



Ampulloclitocybe clavipes Charles Rougier

Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead et al.

171

Syn. : **Clitocybe clavipes**

Nom français : **Clitocybe à pied en massue**

Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain acide.

Odeur : De jasmin ou fruitée, de fleur de mandarinier.

Stipe à base claviforme, spongieuse - Chapeau beige. Lames décourantes, blanches puis crème jaunâtre.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Tricholomataceae**



Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja

1835

Syn. : **Clitocybe gibba**

Nom français : **Clitocybe bossu**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Cyanique.

Chapeau en entonnoir, beige à beige ochracé.

Lames très décourantes, crème - Stipe blanchâtre.

Comestibilité **Comestible**

15 - Les tricholomes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Tricholomataceae**



Comestibilité **A rejeter**



Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer

3576

Syn. : **Tricholoma rutilans**

Nom français : **Tricholome rutilant**

Habitat : Sur souches de conifères.

Odeur : Faible de moisi.

Chapeau jaune, orné de petites écailles pourpre violet.
 Chair jaune vif - Saveur amarescente - Lames jaune vif.

16 - Les autres tricholomes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Hydnangiaceae**



Comestibilité **Comestible**



Laccaria laccata (Scop.) Cooke

1989

Syn. :

Nom français : **Laccaire laqué**

Habitat : Dans les bois, au bord des chemins.

Odeur : Insignifiante.

Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisce.
 Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Marasmiaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Baeospora myosura (Fr.) Singer

240

Syn. : **Collybia conigena**

Nom français : **Collybie queue de souris**

Habitat : Sur cônes de pins et d'épicéas.

Odeur : Insignifiante.

Chapeau brun à beige - Lames très serrées, blanches.
 Stipe couvert d'une pruine blanche sur fond brunâtre.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Omphalotaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen

1495

Syn. : **Collybia confluens - Marasmius confluens**
Gymnopus confluens

Nom français : **Collybie en touffe**

Habitat : En rond de sorcière, ubiquiste.

Odeur : Légèrement cyanique.

Chapeau beige mastic à brun pâle, hygrophane.
 Lames très serrées, étroites et pied pruneux.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Omphalotaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen

1516

Syn. : **Collybia peronata - Marasmius peronatus**
Gymnopus peronatus - Marasmiellus peronatus

Nom français : **Collybie guêtrée**

Habitat : Surtout sur feuilles de hêtres qu'il agglomère.

Odeur : De vinaigre à la trituration.

Chapeau brun noisette, hygrophane.
 Lames échancrées, d'un beau jaune de buis.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Physalaciaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Hymenopellis radicata (Konrad & Maubl.) R.H. Petersen f. marginata

1788

Syn. : **Oudemansiella radicata var. marginata**

Nom français : **Collybie radicante à arête brune**

Habitat : Sous feuillus.

Odeur : Non caractéristique.

Diffère du type par l'arête des lames bordée de brun-noir, les autres caractères étant identiques.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Marasmiaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Megacollybia platyphylla Charles Rouquier

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kott. & Pouzar

2419

Syn. : **Collybia platyphylla - Gymnopus platyphyllus Oudemansiella platyphylla**

Nom français : **Collybie à larges lamelles**

Habitat : Surtout sur souches ou racines de feuillus.

Odeur : Terreuse à herbacée.

Chapeau rayé-vergeté - Lames larges et espacées.
 Présence de rhizoïdes à la base du stipe.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**

Comestibilité **Comestible**



Amanita crocea Charles Rouquier

Amanita crocea (Qué.) Singer

108

Syn. : **Amanita vaginata var. crocea - Amanitopsis crocea**

Nom français : **Amanite safran**

Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain acide.

Odeur : Inodore.

Chapeau jaune safran - Stipe chiné, zébré à pelucheux.
 Volve épaisse et membraneuse - Saveur douce.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Amanita excelsa var. excelsa Charles Rouquier

Amanita excelsa (Fr.) Bertillon var. excelsa

117

Syn. : **Amanita excelsa**

Nom français : **Amanite élevée**

Habitat : Feuillus et conifères - ubiquiste.

Odeur : Sans odeur ou raphanoïde faible.

Silhouette élancée - Chapeau grisâtre, gras et humide.
 Anneau fragile - Stipe profondément enterré.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **Toxique**



Amanita muscaria Charles Rouquier

Amanita muscaria (L.) Lam.

130

Syn. :

Nom français : **Amanite tue-mouches**

Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs.
 Anneau membraneux, juponnnant - Lames blanches.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**

Comestibilité **Comestible**



Amanita rubescens Charles Rouquier

Amanita rubescens (Pers.) Gray

152

Syn. :

Nom français : **Amanite rougissante (Golmotte)**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Rougisement de la chair - Anneau ample et strié. Volve friable - Stipe napiforme.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**

Comestibilité **Comestible**



Amanita umbrinolutea Internet

Amanita umbrinolutea (Secretan ex Gillet) Bataille

161

Syn. :

Nom français : **Amanite ombre jaune**

Habitat : Sous feuillus ou sous conifères.

Odeur : Inodore.

Robuste - Chapeau châtain, cocardé, lames surlignées de brun. Souvent confondue avec A. battarae.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **Comestible**

Amanita vaginata (Bull.) Lam.

162

Syn. :

Nom français : **Amanite vaginée**

Habitat : Ubiquiste, sans liaison avec des essences précises.

Odeur : Inodore.

Stipe sans anneau - Chapeau grisâtre, mamelonné.
 Volve membraneuse, très engainante - Spores rondes.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Mortel**



Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

1800

Syn. : **Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis**

Nom français : **Hypholome en touffes**

Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.

Odeur : De polypore.

En touffes sur les souches ou le bois mort.
 Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Comestible**

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.

1985

Syn. : **Pholiota mutabilis**

Nom français : **Pholiote changeante**

Habitat : Surtout sur souches de hêtres.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau très hygrophane, brun foncé à miel.
 Pied orné d'une armille fibrillo-squamuleuse.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Pholiota limonella (Peck) Sacc.

2783

Syn. :

Nom français : **Pholiote nuancé de jaune citron**

Habitat : Surtout sur bouleaux, aulnes, sapins mais pas seulement.

Odeur : Faible, parfois un peu de viande fumée.

Chapeau très visqueux, avec des écailles roussâtres.
 Stipe et chapeau jaune doré - Stipe couvert d'écailles.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula chloroides (Krombh.) Bres.

3101

Syn. :

Nom français : **Russule à lames glauques**

Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres.

Odeur : Forte, fruitée.

Grande espèce à chapeau blanc, sec, déprimé.
 Lames étroites - Stipe parfois zoné de vert au sommet.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Comestible**



Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

3113

Syn. : **Russula cutefracta**

Nom français : **Russule charbonnière**

Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres.

Odeur : Faible, non significative.

Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce.
 Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula fellea (Fr.) Fr.

3133

Syn. :

Nom français : **Russule de fiel**

Habitat : Généralement sous hêtres.

Odeur : De compote de pommes.

Entièrement de couleur ochracée à ocre - Saveur âcre.

Lames blanc crème nuancé d'ochracé

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula integra (L.) Fr.

3163

Syn. : **Russula piceetorum - Russula adulterina**

Nom français : **Russule intègre**

Habitat : Dans les pessières de montagne.

Odeur : Très faible d'iode à la coupe.

Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns.

Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula grata Britzelm

3174

Syn. : **Russula laurocerasi - Russula fragrans**
Russula foetens var. laurocerasi

Nom français : **Russule à odeur de laurier cerise**

Habitat : Surtout sous feuillus.

Odeur : D'amandes amères, de laurier cerise.

Chapeau ochracé roussâtre - Saveur âcre.

Lames crème blanchâtre +/- tachées de roussâtre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula ochroleuca Pers.

3204

Syn. :

Nom français : **Russule ocre et blanche**

Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des tourbières.

Odeur : Faiblement fruitée.

Chapeau ochracé - Lames blanches à crème pâle.

Saveur âcre à presque douce - Stipe blanc, grisonnant.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Mortel**



Russula olivacea (Schaeff.) Fr.

3207

Syn. :

Nom français : **Russule olivacée**

Habitat : En montagne, sous hêtres et épicéas.

Odeur : Faible, un peu fruitée.

Chapeau vert à brun ou jaune, sec - Saveur douce.

Phénol = pourpre - Lames jaunes.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Comestible**



Russula vesca Fr.

3277

Syn. :

Nom français : **Russule comestible**

Habitat : Sous feuillus, en terrain siliceux.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rose carné, rose jambon - Saveur douce.

Lames blanchâtres - Réaction orangé vif avec Fer.

12-09-2026 Sortie Freydières

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula violeipes (Quél.) Romagn.
f. citrina

3286

Syn. :

Nom français : **Forme jaune de la Russule à pied violet**

Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres.

Odeur : Subnulle ou de crustacés.

Chapeau et stipe jaunes, sans trace de violet.

Les autres caractères sont identiques à ceux du type.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Lactarius blennius (Fr.) Fr.

2020

Syn. :

Nom français : **Lactaire muqueux**

Habitat : Exclusivement sous hêtres.

Odeur : Subnulle.

Chapeau gris-brun mêlé d'olive, très visqueux.

Latex abondant, âcre, tachant les lames de gris.

29 - Les bolets

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Boletaceae**



Comestibilité **Comestible**



Boletus edulis Bull.

263

Syn. :

Nom français : **Cèpe de Bordeaux**

Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide.

Odeur : Fongique, très agréable.

Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre.

Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.

29 - Les bolets

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Boletaceae**



Comestibilité **Toxique**



Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini

295

Syn. : **Boletus calopus**

Nom français : **Bolet à beau pied**

Habitat : Sous conifères et feuillus, en montagne.

Odeur : Un peu acidulée, de vinaigre.

Stipe rouge, jaune en haut - Réseau blanc, très visible.

Chair bleuissant légèrement à la coupe, très amère.

29 - Les bolets

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Boletaceae**



Comestibilité **Comestible**



Imleria badia (Fr.) Vizzini

1824

Syn. : **Boletus badius - Xerocomus badius**

Nom français : **Bolet bai**

Habitat : Sous conifères et feuillus.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau bai à marron, de couleur uniforme.

Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.

29 - Les bolets

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Boletaceae**



Comestibilité **Comestible**



Leccinum scabrum (Bull.) Gray

2151

Syn. : **Boletus scaber**

Nom français : **Bolet rude**

Habitat : Sous bouleaux.

Odeur : Agréable.

Chapeau brun fauve, finement feutré.

Stipe élancé, orné de fines squamules bistres.

29 - Les bolets

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Boletaceae**



Comestibilité **Comestible**

Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn

2601

Syn. : **Boletus erythropus**

Nom français : **Bolet à pied rouge**

Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne.

Odeur : +/- fruitée.

Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté.
 Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.

29 - Les bolets

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Boletaceae**



Comestibilité **Toxique**



Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.J. Gilbert

2880

Syn. : **Porphyrellus pseudoscaber**
Tylopilus porphyrosporus

Nom français : **Bolet porphyre**

Habitat : Sous feuillus et sous conifères de montagne.

Odeur :

Chapeau sec, brun noirâtre olivacé, finement velouté.
 Pores petits, arrondis, gris à pourpres.

30 - Les bolétales lamellés

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Gomphidiaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Chroogomphus helveticus (Pilát) Kuthan & Singer subsp. tatensis

362

Syn. :

Nom français : **Gomphide squamuleux**

Habitat : Sous sapins et épicéas.

Odeur : Odeur agréable, un peu fruitée.

Chapeau orange, hémisphérique, feutré-squamuleux.
 Chair jaunâtre orangé - Lames espacées et épaisses.

30 - Les bolétales lamellés

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Hygrophoropsidaceae**



Comestibilité **Comestible**

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire

1728

Syn. :

Nom français : **Fausse chanterelle**

Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore
 Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

30 - Les bolétales lamellés

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Paxillaceae**



Comestibilité **Mortel**



Paxillus involutus (Batsch) Fr.

2685

Syn. :

Nom français : **Paxille enroulé**

Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs.

Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau roux ochracé, à marge involutée.
 Lames très serrées, étroites, facilement détachables.

30 - Les bolétales lamellés

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Tapinellaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Tapinella atrotomentosa (Batsch) Sutara

3432

Syn. : **Paxillus atrotomentosus - Sarcopaxillus atrotomentosus**

Nom français : **Paxille à pied noir**

Habitat : A la base des souches de conifères.

Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau dimidié, ocre à brun rouille, finement feutré.
 Stipe latéral, chaussé d'un tomentum brun-noir.

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord. Agaricales

Fam. Agaricaceae

Comestibilité **Comestible**



Lycoperdon perlatum

Charles Rougier

Lycoperdon perlatum Pers.

2345

Syn. : **Lycoperdon gemmatum**

Nom français : **Vesse de loup perlée**

Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications blanches recouvertes d'aiguillons.

Gléba blanche puis olive - Stipe conique.

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord. Phallales

Fam. Phallaceae



Comestibilité **A rejeter**



Phallus impudicus

Rougier, Charles

Phallus impudicus L.

2741

Syn. :

Nom français : **Satyre puant**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Cadavérique à maturité.

D'abord en forme d'œuf puis il prend l'aspect d'une morille à long pied fragile et à chapeau verdâtre.