27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

09 - Les ascomycètes

Div. Ascomycota
Clas. Pezizomycetes
Ord.. Pezizales
Fam. Pyronemataceae

Comestibilité Comestible

Aleuria aurantia (Per.) Fuckel

73

Syn. : **Peziza aurantia**

Nom français : **Pézize orangée**
Habitat : Sur terre nue, sur les chemins forestiers.
Odeur : Non caractéristique.

Petite "pézize" mince et cassante, d'une belle couleur orangée.

---

09 - Les ascomycètes

Div. Ascomycota
Clas. Pezizomycetes
Ord.. Pezizales
Fam. Helvellaceae

Comestibilité A rejeter

Helvella macropus (Pers.) P. Karst.

1594

Syn. : **Aleuria macropus - Macropodia macropus**
Macroscyphus macropus

Nom français : **Helvelle à long pied**
Habitat : Sous conifères et feuillus, sur terre, dans la mousse.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau cupuliforme - Hyménum lisse, gris-brun.
Face externe feutrée - Stipe de 2-5 cm de long, feutré.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Dacrymycetes
Ord.. Dacrymycetales
Fam. Dacrymycetaceae

Comestibilité Toxique

Calocera viscosa Pers.

301

Syn. :

Nom français : **Calocère visqueuse**
Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères.
Odeur : Inodore.

En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé.
Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Auriculariales
Fam. Exidiaceae

Comestibilité A rejeter

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.

2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**
Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.
Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Albatrellaceae

Comestibilité Comestible

Albatrellus citrinus Ryman

70

Syn. :

Nom français : **Polypore citrin**
Habitat : Sous conifères en montagne.
Odeur : Non caractéristique.

Espèce à chair tendre, chapeau blanchâtre au début puis jaune citrin.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Fomitopsidaceae

Comestibilité A rejeter

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar

395

Syn. : **Spongipellis borealis**

Nom français : **Polypore boréal**
Habitat : Souches d'épicéas ou de sapins.
Odeur : Agréable, suave.

Chapeau épais, dimidié, spongieux, blanc puis ocre.
Pores dédaléens - Trame à 2 couches - Pas de stipe.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Fomes fomentarius (L.) Fr. 1389

Syn. : **Ungulina fomentaria**

Nom français : **Amadouvier**
Habitat : Sur troncs pourrissants de feuillus.
Odeur : Agréable, parfois de banane.

Parasite de faiblesse ou de blessure.
Chapeau en forme de sabot de cheval.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Gloeophyllales
Fam. Gloeophyllaceae

Comestibilité A rejeter

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki 1457

Syn. : **Trametes odorata**

Nom français : **Tramète odorante**
Habitat : Sur bois mort d'épicéas, surtout en montagne.
Odeur : Forte d'anis, de vanille ou de pain d'épices.

Chapeau jaune orangé noduleux, feutré.
Trame noircissant en présence de NH3.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Fomitopsidaceae

Comestibilité A rejeter

Postia ptychogaster (Kytov) Redhead 2886

Syn. : **Oligoporus ptychogaster - Tyromyces ptychogaster**
Polyporus ptychogaster - Ptychogaster albus

Nom français : **Polypore fuligineux**
Habitat : Sur bois mort de conifères.
Odeur : Nulle.

Fructification d'abord velue (forme imparfaite), puis formant des petits chapeaux porés (forme fertile).

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden 3453

Syn. : **Trametes multicolor - Coriolus ochraceus**

Nom français : **Tramète à chapeau zoné**
Habitat : Sur bois mort de feuillus.
Odeur : Nulle.

Chapeau gris-ocre, hispide, zoné de brun-jaune.
Pores arrondis-anguleux - Trame subéreuse.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Trametes pubescens (Schumach.) Pilát 3454

Syn. : **Coriolus pubescens - Trametes velutina**

Nom français : **Tramète pubescente**
Habitat : Sur bois mort de feuillus (hêtres, bouleaux ...).
Odeur : Nulle.

Chapeau velouté, délicatement zoné, ocre-jaune.
Pores arrondis, jaune ochracé - Trame aérifère.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Trametes versicolor (L.) Lloyd 3457

Syn. : **Coriolus versicolor**

Nom français : **Tramète versicolore**
Habitat : Sur bois peu dégradé, surtout de feuillus.
Odeur : Nulle.

Trame très mince - Pores fins et étroits, arrondis.
Chapeaux multiples, concrescents, zonés, veloutés.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité Comestible

Cantharellus pallens Pilát

323

Syn. : **Cantharellus subpruinosus**

Nom français : **Chanterelle pruineuse**
Habitat : Espèce précoce, sous feuillus et conifères.
Odeur : Fruitée, très agréable.

Au printemps - Chapeau finement pruineux de blanc.
Stipe et chair blanchâtre à jaune pâle, jaunissants.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité Comestible

Hydnum repandum L.

1672

Syn. :

Nom français : **Pied-de-mouton**
Habitat : Sous feuillus et conifères, jusqu'en montagne.
Odeur : Agréable, fruitée.

Chapeau de jaune pâle à couleur abricot.
Aiguillons très serrés, fragiles, faciles à séparer.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Thelephorales
Fam. Bankeraceae

Comestibilité Comestible

Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.

3305

Syn. : **Hydnum imbricatum**

Nom français : **Hydne imbriqué**
Habitat : Sous conifères de montagne, surtout sous épicéas.
Odeur : Légèrement épicée.

Grande espèce à chapeau grossièrement écailleux.
Hyménium constitué d'aiguillons subulés et fragiles.

---

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Fr.

364

Syn. : **Chrysobostrychodes chrysophyllus**
Gerronema chrysophyllum - Omphalina chrysophylla

Nom français : **Omphale à lames jaunes**
Habitat : En montagne, sur bois pourrissant de conifères.
Odeur : Odeur non caractéristique.

Chapeau brun-beige, finement méchuleux, ombiliqué.
Lames espacées, jaune orangé - Stipe concolore.

---

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea

1745

Syn. : **Hygrophorus chrysaspis**

Nom français : **Hygrophore à disque jaune**
Habitat : Dans les hêtraies, sur sols calcaires.
Odeur : De peau de mandarine à anisée.

Chapeau visqueux, lisse, blanc à crème ochracé.
Brunissement roux vif à partir de la marge.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead et al.

171

Syn. : **Clitocybe clavipes**

Nom français : **Clitocybe à pied en massue**
Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain acide.
Odeur : De jasmin ou fruitée, de fleur de mandarinier.

Stipe à base claviforme, spongieuse - Chapeau beige. Lames décurrentes, blanches puis crème jaunâtre.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

Comestibilité Toxique

Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. 412

Syn. : **Clitocybe suaveolens - Clitocybe deceptiva**

Nom français : **Clitocybe anisé strié**
Habitat : Feuillus et conifères, parmi les aiguilles et les feuilles.
Odeur : Anisée.

Chapeau longuement strié, ocellé, beige rosé.
Stipe concolore - Lames crème, adnées - Chair ocre.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholoma pseudonictitans Bon 3538

Syn. : **Tricholoma fulvum var. pseudonictitans**

Nom français : **Tricholome luisant**
Habitat : Sous conifères, rarement sous feuillus.
Odeur : Subnulle à légèrement farineuse.

Chapeau brun fauve, à marge non cannelée.
Lames crème - Chair du pied jaune au grattage.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 3544

Syn. : **Tricholoma boudieri**

Nom français : **Tricholome à odeur de savon**
Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne.
Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide.

Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante.
Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 3576

Syn. : **Tricholoma rutilans**

Nom français : **Tricholome rutilant**
Habitat : Sur souches de conifères.
Odeur : Faible de moisi.

Chapeau jaune, orné de petites écailles pourpre violet.
Chair jaune vif - Saveur amarescente - Lames jaune vif.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae



Comestibilité Comestible

Laccaria amethystina Cooke 1987

Syn. : **Laccaria amethystea**
Laccaria laccata var. amethystina
Nom français : **Laccaire améthyste**
Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères.
Odeur : Légèrement fruitée.

Chapeau hygrophane, violet foncé puis pâlissant.
Lames très espacées, larges, épaisses, violettes.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae



Comestibilité Comestible

Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton 1988

Syn. : **Laccaria laccata var. bicolor**

Nom français : **Laccaire à deux couleurs**
Habitat : Sur sols acides, au bord des chemins.
Odeur : Douce, herbacée.

Chapeau brun cannelle à rose carné, fibrilleux.
Stipe tenace, orné à la base d'un feutre violet.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae

Comestibilité Comestible

Laccaria laccata (Scop.) Cooke 1989

Syn. :

Nom français : **Laccaire laqué**
Habitat : Dans les bois, au bord des chemins.
Odeur : Insignifiante.
Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisse.
Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Hymenopellis radicata (Rehlan) R.H. Petersen 1787

Syn. : **Collybia radicata - Mucidula radicata**
Oudemansiella radicata - Xerula radicata
Nom français : **Collybie radicante**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres, parfois sur racines.
Odeur : Faible, non caractéristique.
Chapeau visqueux, veiné-ridé, brun foncé à beige.
Lames blanches - Pied prolongé par une longue racine.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Marasmiaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar 2419

Syn. : **Collybia platyphylla - Gymnopus platyphyllus**
Oudemansiella platyphyllla
Nom français : **Collybie à larges lamelles**
Habitat : Surtout sur souches ou racines de feuillus.
Odeur : Terreuse à herbacée.
Chapeau rayé-vergeté - Lames larges et espacées.
Présence de rhizoïdes à la base du stipe.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Mucidula mucida (Schrad.) Pat. 2458

Syn. : **Oudemansiella mucida - Collybia mucida**

Nom français : **Collybie visqueuse**
Habitat : Sur bois mort de hêtres.
Odeur : Faible, un peu herbacée.
Chapeau couvert d'une pellicule gélatineuse séparable. Lames espacées, blanches - Présence d'un anneau.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Mycena inclinata (Fr.) Quél. 2511

Syn. :

Nom français : **Mycène incliné**
Habitat : En touffes, sur souches et troncs pourris de feuillus.
Odeur : Désagréable de rance, de bougie.
Chapeau brun-gris à brun-beige, hygrophane.
Stipe brun-rouge en bas, jaune-ambré au-dessus.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Mycena maculata P. Karst. 2519

Syn. :

Nom français : **Mycène tachée**
Habitat : Sur bois mort de feuillus et de conifères.
Odeur : Non caractéristique.
Chapeau brun-gris à brun-rouge, longuement strié.
Toutes les parties se tachent de brun-rouge.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité Toxique

Mycena rosea Gramberg — 2558

Syn. : **Mycena pura f. et var. rosea**

Nom français : **Mycène rose**
Habitat : Surtout sous feuillus, sur terre nue, parmi les feuilles.
Odeur : Raphanoïde.

Chapeau de couleur vieux rose, hygrophane.
Stipe blanc à rose pâle, finement fibrilleux.

---

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Mortel

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. — 2189

Syn. :

Nom français : **Lépiote crêtée**
Habitat : Dans les chemins, les jardins, parmi les graminées.
Odeur : De baudruche, de scléroderme.

Chapeau brun pourpre au disque entouré d'écailles.
Stipe blanchâtre, lisse, nuancé de rose à la base.

---

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Macrolepiota procera (Scop.) Singer — 2387

Syn. : **Lepiota procera**

Nom français : **Lépiote élevée (Coulemelle)**
Habitat : Dans les prés, les lisières ou clairières gramineuses.
Odeur : Faible, fongique.

Reconnaissable à sa grande taille, à son chapeau squameux, à son stipe chiné, à son anneau coulissant.

---

21 - Coprins et psathyrelles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Coprinaceae

Comestibilité Comestible

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. — 539

Syn. :

Nom français : **Coprin chevelu**
Habitat : Dans les lieux herbeux, les jardins, les décombres.
Odeur : Faible ou nulle, non caractéristique.

Chapeau cylindracé, blanc, orné de mèches blanches.
Stipe doté d'un anneau fragile, mobile - Chair blanche.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible

Amanita crocea (Quél.) Singer — 108

Syn. : **Amanita vaginata var. crocea - Amanitopsis crocea**

Nom français : **Amanite safran**
Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain acide.
Odeur : Inodore.

Chapeau jaune safran - Stipe chiné, zébré à pelucheux.
Volve épaisse et membraneuse - Saveur douce.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Toxique

Amanita muscaria (L.) Lam. — 130

Syn. :

Nom français : **Amanite tue-mouches**
Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs.
Anneau membraneux, juponnnant - Lames blanches.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Mortel

Amanita phalloides (Fr.) Link

142

Syn. :

Nom français : **Amanite phalloïde**
Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.
Odeur : Rose fanée en vieillissant.

Chapeau typiquement vert olive orné de fibrilles innées.
Anneau membraneux - Volve en forme de sac.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible

Amanita umbrinolutea (Secretan ex Gillet) Bataille

161

Syn. : **Amanitopsis umbrinolutea**

Nom français : **Amanite ombre jaune**
Habitat : Sous feuillus ou sous conifères.
Odeur : Inodore.

Robuste - Chapeau châtain, cocardé, lames surlignées de brun. Souvent confondue avec A. battarae.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible

Amanita vaginata (Bull.) Lam.

162

Syn. :

Nom français : **Amanite vaginée**
Habitat : Ubiquiste, sans liaison avec des essences précises.
Odeur : Inodore.

Stipe sans anneau - Chapeau grisâtre, mamelonné.
Volve membraneuse, très engainante - Spores rondes.

---

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Entolomataceae

Comestibilité Comestible

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kummer

450

Syn. :

Nom français : **Meunier**
Habitat : Sous feuillus et résineux, dans les clairières.
Odeur : Fortement farineuse.

Chapeau de forme variable, blanchâtre, cassant.
Lames très décurrentes, blanches puis roses.

---

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Pluteaceae

Comestibilité A rejeter

Pluteus pouzarianus Singer

2863

Syn. :

Nom français : **Plutée de Pouzar**
Habitat : Sur souches ou débris de bois de conifères.
Odeur : Légèrement raphanoïde.

Chapeau brun-noir, gris métallisé en séchant, lisse.
Stipe crème, fibrilleux de gris-noir ou de brun, plein.

---

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Pluteaceae

Comestibilité A rejeter

Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl.

2866

Syn. : **Pluteus lutescens - Pluteus splendidus**

Nom français : **Plutée de Romell**
Habitat : Sur souches ou débris de bois de feuillus.
Odeur : Subnulle à légèrement herbacée.

Chapeau brun de datte à brun-jaune, à marge striée.
Stipe jaune clair à citrin, fibrilleux longitudinalement.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

Comestibilité Toxique

Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen & Liimat. 922

Syn. : **Cortinarius eumarginatus - Cortinarius purpurascens**

Nom français : **Cortinarius purpurescent**
Habitat : Sous conifères (épicéas), sur sols acides.
Odeur : Nulle.

Chapeau visqueux, gris-bleu, orné de fibrilles brunes.
Lames se tachant de violet sombre au froissement.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité Mortel

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 1800

Syn. : **Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis**

Nom français : **Hypholome en touffes**
Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.
Odeur : De polypore.

En touffes sur les souches ou le bois mort.
Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité Toxique

Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. 1804

Syn. : **Hypholoma sublateritium**

Nom français : **Hypholome couleur de brique**
Habitat : Sur bois mort et souches de feuillus.
Odeur : Plutôt agréable.

Chapeau lisse, rouge brique au centre.
Stipe brun ochracé et cortine abondante.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité A rejeter

Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. 2769

Syn. : **Pholiota cerifera**

Nom français : **Pholiote cireuse**
Habitat : En touffes sur les arbres vivants ou sur les souches.
Odeur : Indistincte ou faiblement aromatique.

Chapeau gélatineux, jaune et envahi de fauve rouillé.
Stipe sec, fibrilleux-squameux, pruineux au sommet.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité A rejeter

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. 2773

Syn. :

Nom français : **Pholiote jaune feu**
Habitat : Fasciculé sur bois mort de conifères.
Odeur : Faiblement aromatique.

Chapeau jaune citrin à fauve orangé, squamuleux.
Stipe jaune sulfurin, revêtu de squames retroussées.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité A rejeter

Pholiota lenta (Pers.) Singer 2782

Syn. : **Flammula lenta**
Dryophila lenta

Nom français : **Pholiote glutineuse**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sur bois dégradé.
Odeur : Faible, légèrement iodée.

Chapeau beige ochracé jaunâtre, très visqueux, avec des flocons blancs noyés dans le mucus.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula acrifolia Romagn. 3055

Syn. :

Nom français : **Russule à lames piquantes**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau beige brunâtre, lubrifié, largement déprimé.
Stipe blanc taché de rouge - Lames de saveur âcre.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula amethystina Quél. 3066

Syn. :

Nom français : **Russule améthyste**
Habitat : Sous conifères de montagne (sapins, épicéas).
Odeur : Un peu iodée ou fruitée, de pomme.

Chapeau améthyste, pruineux, se tachant de jaune.
Chair douce - Lames jaunes - Spores à verrues isolées.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula badia Quél. 3090

Syn. : **Russula friesii**

Nom français : **Russule perfide**
Habitat : Sous conifères, surtout en montagne.
Odeur : De bois de cèdre ou de vieux bouchons.

Chapeau rouge carminé à brun-rouge-pourpre.
Lames ocre foncé à jaune clair - Saveur très âcre.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula cavipes Britzelm. 3099

Syn. :

Nom français : **Russule à pied creux**
Habitat : Surtout sous épicéas.
Odeur : Safranée ou de pommes.

Chapeau bigarré, violet nuancé d'olive - Lames crème, réagissant en rose avec NH3 - Saveur subdouce.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula chloroides (Krombh.) Bres. 3101

Syn. :

Nom français : **Russule à lames glauques**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres.
Odeur : Forte, fruitée.

Grande espèce à chapeau blanc, sec, déprimé.
Lames étroites - Stipe parfois zoné de vert au sommet.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 3113

Syn. : **Russula cutefracta**

Nom français : **Russule charbonnière**
Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres.
Odeur : Faible, non significative.

Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce.
Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Russula cyanoxantha Singer f. peltereaui

3114

Syn. : **Russula cyanoxantha var. peltereaui**

Nom français : **Russule de Peltereau**
Habitat : Généralement sous hêtres, mais ubiquiste.
Odeur : Faible, non significative.

Diffère du type uniquement par la couleur de son chapeau, vert amande, vert wagon ou vert concombre.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula grata Britzelm

3174

Syn. : **Russula laurocerasi - Russula fragrans**
Russula foetens var. laurocerasi

Nom français : **Russule à odeur de laurier cerise**
Habitat : Surtout sous feuillus.
Odeur : D'amandes amères, de laurier cerise.

Chapeau ochracé roussâtre - Saveur âcre.
Lames crème blanchâtre +/- tachées de roussâtre.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula integra (L.) Fr.

3163

Syn. : **Russula piceetorum - Russula adulterina**

Nom français : **Russule intègre**
Habitat : Dans les pessières de montagne.
Odeur : Très faible d'iode à la coupe.

Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns.
Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Russula langei Bon

3172

Syn. :

Nom français : **Russule de Lange**
Habitat : Surtout sous feuillus, en terrain acide.
Odeur : Faible, non significtaive.

Chapeau violacé sombre - Stipe ferme, lavé de rose.
Lames lardacées, blanches - Saveur douce.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

MORTEL

Comestibilité Mortel

Russula olivacea (Schaeff.) Fr.

3207

Syn. :

Nom français : **Russule olivacée**
Habitat : En montagne, sous hêtres et épicéas.
Odeur : Faible, un peu fruitée.

Chapeau vert à brun ou jaune, sec - Saveur douce.
Phénol = pourpre - Lames jaunes.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula rosea Pers.

3175

Syn. : **Russula lepida - Russula linnaei**

Nom français : **Russule jolie**
Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout sous hêtres.
Odeur : Fruitée ou mentholée.

Chapeau rouge saturé, très mat, sec - Lames crème.
Saveur douce, mentholée - Stipe très dur, lavé de rose.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula subfoetens W.G. Smith 3263

Syn. : **Russula foetens var. subfoetens**

Nom français : **Russula fausse-fétide**
Habitat : Sous feuillus.
Odeur : Nauséeuse.

Chapeau visqueux, ocre doré - Lames crème ocre.
Réaction jaune de chrome avec KOH - Saveur âcre.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Russula vesca Fr. 3277

Syn. :

Nom français : **Russule comestible**
Habitat : Sous feuillus, en terrain siliceux.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rose carné, rose jambon - Saveur douce.
Lames blanchâtres - Réaction orangé vif avec Fer.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula violeipes (Quél.) Romagn. 3286
f. citrina

Syn. :

Nom français : **Forme jaune de la Russule à pied violet**
Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres.
Odeur : Subnulle ou de crustacés.

Chapeau et stipe jaunes, sans trace de violet.
Les autres caractères sont identiques à ceux du type.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray 2016

Syn. : **Lactarius aurantiofulvus**

Nom français : **Lactaire fauve orangé**
Habitat : En montagne, sous épicéas.
Odeur : Faible, de hareng salé à la fin.

Chapeau orangé ou fauve orangé, non zoné.
Latex abondant, immuable, doux puis amer.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair 2091

Syn. :

Nom français : **Lactaire couleur saumon**
Habitat : Sous les sapins.
Odeur : Faible, légèrement savonneuse.

Chapeau jaune orangé, sans traces de vert.
Latex abondant, rouge carotte, subimmuable.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius uvidus (Fr.) Fr. 2110

Syn. :

Nom français : **Lactaire humide**
Habitat : Sous bouleaux et saules, dans les mares.
Odeur : Faible ou nulle.

Chapeau beige lilacin, très visqueux, non zoné.
Latex se teintant de violet sur les lames.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius vietus (Fr.) Fr. 2112

Syn. :

Nom français : **Lactaire fané**
Habitat : Sous bouleaux, dans les tourbières.
Odeur : Insignifiante.
Chapeau beige rosé, papillé, non zoné.
Latex séchant en gris-vert sur les lames, âcre.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Boletus edulis Bull. 263

Syn. :

Nom français : **Cèpe de Bordeaux**
Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide.
Odeur : Fongique, très agréable.
Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre.
Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité A rejeter

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 342

Syn. : **Boletus piperatus - Chalciporus amarellus**

Nom français : **Bolet poivré**
Habitat : Sous conifères de montagne, rarement sous feuillus.
Odeur : Non caractéristique.
Chapeau brun-rouge à brun-jaune - Saveur poivrée.
Pores amples, anguleux, cuivrés - Base du stipe jaune.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Leccinum scabrum (Bull.) Gray 2151

Syn. : **Boletus scaber**

Nom français : **Bolet rude**
Habitat : Sous bouleaux.
Odeur : Agréable.
Chapeau brun fauve, finement feutré.
Stipe élancé, orné de fines squamules bistres.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn 2601

Syn. : **Boletus erythropus**

Nom français : **Bolet à pied rouge**
Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne.
Odeur : +/- fruitée.
Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté.
Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Toxique

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. 3383

Syn. : **Strobilomyces floccopus - Boletus strobilaceus**

Nom français : **Bolet pomme de pin**
Habitat : Sous conifères et feuillus, souvent sur les talus.
Odeur : Un peu terreuse.
Chapeau gris noirâtre, orné d'écailles pyramidales.
Pores amples, rougissant - Anneau épais et laineux.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara

3632

Syn. : **Boletus chrysenteron - Xerocomus chrysenteron**

Nom français : **Bolet à chair jaune**
Habitat : Sous feuillus et résineux.
Odeur : De scléroderme.

Chapeau brun clair, rougeâtre dans les blessures.
Pores amples, anguleux - Stipe rayé de rouge carminé.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Xerocomellus porosporus (Imler ex Bon & Moreno) Šutara

3634

Syn. : **Xerocomus porosporus - Boletus porosporus**

Nom français : **Bolet à chapeau fissuré**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous chênes.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau brun olive à brun-gris noirâtre, vite fissuré.
Pores jaune-olivâtre, bleuissants - Saveur douce.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Xerocomellus pruinatus (Fr.) Šutara

3635

Syn. : **Xerocomus pruinatus**
Boletus pruinatus

Nom français : **Bolet pruineux**
Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres.
Odeur : Agréable.

Chapeau bai foncé, charnu, velouté, pruineux.
Saveur acidulée - Pores grands et anguleux.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Hygrophoropsidaceae

Comestibilité Comestible

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire

1728

Syn. :

Nom français : **Fausse chanterelle**
Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore
Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Paxillaceae

MORTEL

Comestibilité Mortel

Paxillus involutus (Batsch) Fr.

2685

Syn. :

Nom français : **Paxille enroulé**
Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs.
Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau roux ochracé, à marge involutée.
Lames très serrées, étroites, facilement détachables.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél

2810

Syn. : **Phylloporus rhodoxanthus - Xerocomus pelletieri**
Xerocomus rhodoxanthus

Nom français : **Phyllopore de Pelletier**
Habitat : Sous feuillus ou dans les bois mêlés.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau sec et feutré, brun-bai à brun-rouge.
Lames espacées, anastomosées, jaune olivâtre.

27 septembre 2026 - Seiglières - Marais Chauds

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Lycoperdaceae

Comestibilité A rejeter

Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini

2456

Syn. : **Lycoperdon pyriforme - Morganella pyriformis**

Nom français : **Vesse de loup en forme de poire**
Habitat : En touffes sur souches ou bois mort de conifères.
Odeur : Plutôt désagréable.

Fructifications piriforme - Exopéridium brun-jaune.
Gléba blanche puis verdâtre - Subgléba blanche.

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Lycoperdon perlatum Pers.

2345

Syn. : **Lycoperdon gemmatum**

Nom français : **Vesse de loup perlée**
Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles.
Odeur : Non caractéristique.

Frucifications blanches recouvertes d'aiguillons.
Gléba blanche puis olive - Stipe conique.

Myxomycètes

Div. Myxomycota
Clas. Myxomycetes
Ord.. Physariales
Fam. Physariaceae

Comestibilité A rejeter

Fuligo septica (Pers.) Morgan var. flava

1397

Syn. : **Fuligo septica f. flava**

Nom français : **Fleur de Tan**
Habitat : Sur bois pourrissant et sur litières.
Odeur : Inodore.

Fructifications en aéthalium.
Plasmode généralement jaune.