Sortie du 09/10/2026 à Prémol (1100 m)

La sortie s'est déroulée dans le froid et l'humidité, auxquels nous n'étions plus habitués. Heureusement à la pause de midi, nous avons pu nous réfugier dans la salle hors sac de l'Arselle pour nous réchauffer et partager le repas. L'identification des champignons s'est faite avant et après la pause de midi. Les étiquettes pour préparer l'exposition de l'ADHEC (Association de Défense des Habitants et de l'Environnement de Chamrousse) ont été renseignées au fur et à mesure, ce qui a facilité la mise en place de l'exposition et permis aux participants de la SMD de retrouver le nom des différents champignons identifiés.

L'encadrement a été assuré par Cécile Martinet, Charles Rougier et Didier Borgarino. Nous remercions, tout particulièrement, Didier Borgarino, mycologue chevronné et membre de la société de Aix-en-Provence. Ses explications sur les différentes espèces rencontrées et sur l'évolution de la mycologie ont été très appréciées par tous (débutants et confirmés).

Les membres suivants de la Société Mycologique du Dauphiné ont participé à cette sortie d'étude : Clara Blain, Isabelle Anselmet, Julien Briffotaux, Simon Chanal, Sébastien Perrier, Valérie Stambouli, Pascal Sabatier, Chloé Tournier, Estelle Brill, Marie-Eve Stussi, Bruno Vérit, Marie-José Vérit, William Quartini, Suzanne Chardon, Gilles Bonnet-Machot, Alana Sousa, Françoise Serra-Tosio, Jean-Paul Serra-Tosio, Jean-François Lartigue, Martin Rudkiewicz, Laura Durand, Jean Debroux.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé !

2026-10-09 Prémol

09 - Les ascomycètes

Div. Ascomycota
Clas. Sordariomycetes
Ord.. Xylariales
Fam. Diatrypaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. 1195

Syn. :

Nom français : **Diatrype en forme de disque**
Habitat : Sur branches mortes et cortiquées de hêtres.
Odeur : Inodore.

Fructifications arrondies, en coussins irréguliers.
Stromas émergeant de dessous l'écorce.

---

09 - Les ascomycètes

Div. Ascomycota
Clas. Sordariomycetes
Ord.. Hypocreales
Fam. Hypocreaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. 1816

Syn. : **Apiocrea chrysosperma - Sepedonium chrysospermum**

Nom français : **Hypomyces jaune**
Habitat : Surtout sur Boletales (Xerocomus et Leccinum).
Odeur : Nulle.

Fructification ocre jaunâtre, étalée sur le champignon parasité.

---

09 - Les ascomycètes

Div. Ascomycota
Clas. Sordariomycetes
Ord.. Hypocreales
Fam. Hypocreaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul. 1817

Syn. : **Peckiella lateritia**

Nom français : **Hypomyces couleur de brique**
Habitat : Sur l'hyménium de certains lactaires.
Odeur : Inodore.

Subiculum blanc, puis jaune pâle à brun jaunâtre.
Périthèces partiellement immergés, brun-jaune d'or.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Dacrymycetes
Ord.. Dacrymycetales
Fam. Dacrymycetaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Calocera furcata (Fr.) Fr. 299

Syn. : **Calocera viscosa var. furcata**

Nom français : **Calocère fourchue**
Habitat : Sur bois mort de conifères.
Odeur : Inodore.

Fructifications fourchues aux extrémités.
Proche de Calocera cornea mais spores différentes.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Dacrymycetes
Ord.. Dacrymycetales
Fam. Dacrymycetaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Calocera viscosa Pers. 301

Syn. :

Nom français : **Calocère visqueuse**
Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères.
Odeur : Inodore.

En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé.
Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Dacrymycetes
Ord.. Dacrymycetales
Fam. Dacrymycetaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid 1205

Syn. : **Ditiola pezizaeformis - Femsjonia peziziformis**
Femsjonia pezizaeformis

Nom français : **Ditiole en forme de pézize**
Habitat : En troupe sur branches mortes cortiquées.
Odeur : Inodore.

Fructification gélatineuse à l'aspect d'un discomycète.
Hyménium lisse à plissé, jaune orangé.

2026-10-09 Prémol

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Auriculariales
Fam. Exidiaceae

Comestibilité A rejeter

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. 2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**
Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.
Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Bondarzewiaceae

Comestibilité A rejeter

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 1621

Syn. : **Ungulina annosa - Polyporus annosus**

Nom français : **Polypore du rond des pins**
Habitat : A la base des troncs et sur racines, surtout de pins.
Odeur : Forte, fongique.

De taille réduite - Face piléïque brun rougeâtre, feutrée.
Hyménium crème orangé, à grands pores (2-3 / mm).

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Stereaceae

Comestibilité A rejeter

Stereum hirsutum (Wild.) Gray 3376

Syn. :

Nom français : **Stérée hirsute**
Habitat : En colonies, sur bois mort de feuillus.
Odeur : Nulle.

Fructifications résupinées à étalées-réfléchies.
Surface fertile hirsute - Hyménium lisse, brun-orange.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Trametes versicolor (L.) Lloyd 3457

Syn. : **Coriolus versicolor**

Nom français : **Tramète versicolore**
Habitat : Sur bois peu dégradé, surtout de feuillus.
Odeur : Nulle.

Trame très mince - Pores fins et étroits, arrondis.
Chapeaux multiples, concrescents, zonés, veloutés.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité A rejeter

Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. 388

Syn. : **Clavaria rugosa**

Nom français : **Clavaire rugueuse**
Habitat : Dans les forêts de conifères, en bordure des chemins.
Odeur : Insignifiante.

Fructifications simples, à extrémités obtuses, digitées.
Hyménium rugueux, sillonné ou plissé, blanc à crème.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae



Comestibilité Comestible

Hydnum repandum L. 1672

Syn. :

Nom français : **Pied-de-mouton**
Habitat : Sous feuillus et conifères, jusqu'en montagne.
Odeur : Agréable, fruitée.

Chapeau de jaune pâle à couleur abricot.
Aiguillons très serrés, fragiles, faciles à séparer.

2026-10-09 Prémol

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

Comestibilité A rejeter

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.

1732

Syn. :

Nom français : **Hygrophore à odeur agréable**
Habitat : Dans les pessières, sur sols calcaires.
Odeur : D'amandes amères.

Chapeau gris-beige, obtusément mamelonné.
Pied blanchâtre ou gris, granuleux au sommet.

---

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

Comestibilité A rejeter

Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr.

1773

Syn. :

Nom français : **Hygrophore pudibond**
Habitat : Ubiquiste, sous sapins, jusqu'en zone alpine.
Odeur : Résineuse, de térébenthine.

Chapeau visqueux, rosé aurore ou saumon.
Stipe ferme, à reflets jaune-orange, visqueux.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

Comestibilité Toxique

Armillaria lutea Gillet

187

Syn. : **Armillaria bulbosa - Armillaria gallica**

Nom français : **Armillaire à anneau jaune**
Habitat : Espèce isolée ou en groupes, sur feuillus et conifères.
Odeur : Faible à +/- désagréable.

Chapeau brun-ocre - Stipe bulbeux à base +/- jaune vif.
Anneau bordé de jaune - Lames un peu décurrentes.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

Comestibilité Toxique

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink

189

Syn. : **Armillariella ostoyae**

Nom français : **Armillaire d'Ostoya**
Habitat : Souvent sur souches et racines d'épicéas.
Odeur : Faible, de polypore.

Chapeau brun-roux, couvert de mèches brun noirâtre.
Anneau membraneux - Lames un peu décurrentes.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

Comestibilité Toxique

Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm.

412

Syn. : **Clitocybe suaveolens - Clitocybe deceptiva**

Nom français : **Clitocybe anisé strié**
Habitat : Feuillus et conifères, parmi les aiguilles et les feuilles.
Odeur : Anisée.

Chapeau longuement strié, ocellé, beige rosé.
Stipe concolore - Lames crème, adnées - Chair ocre.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Toxique

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.

421

Syn. : **Lepista nebularis**

Nom français : **Clitocybe nébuleux**
Habitat : En lisière des bois, souvent en ronds de sorcières.
Odeur : Farino-spermatique, plutôt désagréable.

Chapeau gris pruineux - Lames adnées-décurrentes.
Stipe en massue, grisâtre pâle - Chair épaisse, grise.

2026-10-09 Prémol

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

Comestibilité Comestible

Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 424

Syn. :

Nom français : **Clitocybe anisé**
Habitat : Feuillus et conifères, surtout en montagne.
Odeur : Fortement anisée.
Chapeau vert à gris-vert, parfois décoloré, mat.
Lames adnées, blanches ou verdâtres - Saveur douce.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Comestible

Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja 1835

Syn. : **Clitocybe gibba**

Nom français : **Clitocybe bossu**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Cyanique.
Chapeau en entonnoir, beige à beige ochracé.
Lames très décurrentes, crème - Stipe blanchâtre.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini et al. 2300

Syn. : **Clitocybe connata - Lyophyllum connatum**

Nom français : **Clitocybe en touffes**
Habitat : Au bord des chemins, en troupes et fasciculés.
Odeur : Herbacée, de petits pois ou de haricots.
Chapeau blanc pur ou glacé, soyeux, marbré de gris.
Chair blanche, cartilagineuse - Pieds blancs, connés.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Hymenochaetales
Fam. Rickenellaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. 3027

Syn. : **Mycena fibula - Omphalia fibula**

Nom français : **Omphale en forme d'épingle**
Habitat : Dans les mousses, les marécages, les sphaignes.
Odeur : Nulle.
Espèce gracile à chapeau ombiliqué, orange vif.
Lames arquées-décurrentes à reflets orangés.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 3544

Syn. : **Tricholoma boudieri**

Nom français : **Tricholome à odeur de savon**
Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne.
Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide.
Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante.
Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Tricholoma ustale (Fr.) Fr. 3565

Syn. :

Nom français : **Tricholome brûlé**
Habitat : En montagne, sous feuillus, surtout sous hêtres.
Odeur : Subnulle ou faiblement farineuse.
Chapeau brun-rouge, visqueux, fibrilleux.
Arête des lames ponctuée puis liserée de brun-noir.

2026-10-09 Prémol

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. 3568

Syn. :

Nom français : **Tricholome couleur de vache**
Habitat : Surtout sous conifères, parfois sous feuillus (saules).
Odeur : Peu agréable, herbacée, un peu farineuse.
Chapeau brun fauve, squamuleux, à marge laineuse.
Saveur un peu amère - Stipe blanc à fibrilleux de roux.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae

Comestibilité Comestible

Laccaria affinis (Singer) Bon 1986

Syn. : **Laccaria laccata var. pallidifolia**

Nom français : **Laccaire à lames pâles**
Habitat : Dans les tourbières, dans les mousses.
Odeur : Subnulle ou herbacée.
Chapeau rose à brun rose, hygrophane, strié.
Lames larges, rose carné pâle.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae

Comestibilité Comestible

Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton 1988

Syn. : **Laccaria laccata var. bicolor**

Nom français : **Laccaire à deux couleurs**
Habitat : Sur sols acides, au bord des chemins.
Odeur : Douce, herbacée.
Chapeau brun cannelle à rose carné, fibrilleux.
Stipe tenace, orné à la base d'un feutre violet.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Comestible

Lepista glaucocana (Bres.) Singer 2232

Syn. : **Rhodopaxillus glaucocanus**

Nom français : **Lépiste décolorée**
Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent en ronds de sorcières.
Odeur : Mentholée, légèrement farineuse.
Chapeau blanchâtre à gris ochracé nuancé de lilas.
Lames blanchâtres à lilas pâle - Saveur douce.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Marasmiaceae

Comestibilité A rejeter

Baeospora myosura (Fr.) Singer 240

Syn. : **Collybia conigena**

Nom français : **Collybie queue de souris**
Habitat : Sur cônes de pins et d'épicéas.
Odeur : Insignifiante.
Chapeau brun à beige - Lames très serrées, blanches.
Stipe couvert d'une pruine blanche sur fond brunâtre.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Collybia cirrhata (Pers.) Quél. 457

Syn. : **Microcollybia cirrhata**

Nom français : **Collybie filiforme**
Habitat : Saprophyte sur vieux champignons pourrissants.
Odeur : Imperceptible.
Pas de sclérote - Chapeau de 1-2 cm, blanc, mince.
Stipe grêle, feutré, blanchâtre à ochracé pâle.

2026-10-09 Prémol

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae

Comestibilité A rejeter

Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen

1495

Syn. : **Collybia confluens - Marasmius confluens**
Gymnopus confuens

Nom français : **Collybie en touffe**
Habitat : En rond de sorcière, ubiquiste.
Odeur : Légèrement cyanique.

Chapeau beige mastic à brun pâle, hygrophane.
Lames très serrées, étroites et pied pruineux.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Marasmiaceae

Comestibilité Comestible

Marasmius oreades (Bolton) Fr.

2413

Syn. :

Nom français : **Marasme des oréades**
Habitat : Au printemps, dans les prés, pâturages et alpages.
Odeur : Fortemant cyanique.

Chapeau brun-roux, hygrophane et lames espacées.
Dans l'herbe en ronds de sorcières.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae

Comestibilité A rejeter

Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle

2587

Syn. : **Marasmius alliaceus**

Nom français : **Marasme à odeur d'ail**
Habitat : Sur branches tombées ou débris ligneux de hêtres.
Odeur : Pénétrante d'ail.

Chapeau ocre-beige ou crème blanchâtre.
Stipe élancé, rigide, noirâtre, pruineux au sommet.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae

Comestibilité A rejeter

Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira

1515

Syn. : **Micromphale perforans - Marasmiellus perforans**
Gymnopus perforans

Nom français : **Marasme perforant**
Habitat : Sur des aiguilles de conifères, surtout d'épicéas.
Odeur : De chou pourri ou d'eau croupie.

Chapeau de 0,5 -1,5 cm, beige rosâtre, strié-ridé.
Lames crème, espacées - Stipe velouté, vite noirâtre.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm.

2487

Syn. :

Nom français : **Mycène à latex safran**
Habitat : Sur rameaux et branches mortes de hêtres.
Odeur : Subnulle.

Chapeau gris olive, souvent taché d'orangé.
Chair mince, libérant un latex orange à la cassure.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena epipterygia (Scop.) Gray

2493

Syn. : **Prunulus epipterygius**

Nom français : **Mycène des fougères**
Habitat : Sur humus et débris végétaux, feuilles ou aiguilles.
Odeur : Subnulle ou farineuse rance.

Chapeau jaune citrin - Stipe visqueux, jaune citrin vif.
Une pellicule visqueuse séparable couvre le chapeau.

2026-10-09 Prémol

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena galericulata (Scop.) Gray

2505

Syn. :

Nom français : **Mycène en casque**
Habitat : Sur souches et branches de feuillus ou de conifères.
Odeur : Faible, farineuse (saveur très farineuse).

Stipe tenace, souvent comprimé, hirsute à la base.
Lames souvent rose pâle, fortement interveinées.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena maculata P. Karst.

2519

Syn. :

Nom français : **Mycène tachée**
Habitat : Sur bois mort de feuillus et de conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brun-gris à brun-rouge, longuement strié.
Toutes les parties se tachent de brun-rouge.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité Toxique

Mycena pelianthina (Fr.) Quél.

2535

Syn. : **Prunulus pelianthinus**

Nom français : **Mycène à lames bordées de pourpre**
Habitat : Sous feuillus (surtout hêtres), sur litières de feuilles.
Odeur : Raphanoïde.

Chapeau gris violacé, à reflets lilas - Stipe concolore.
Lames gris lilas, à arête pourpre - Chair brunâtre.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena polygramma (Bull.) Gray

2538

Syn. :

Nom français : **Mycène à pied strié**
Habitat : Sur tapis de feuilles ou d'aiguilles.
Odeur : Subnulle ou légèrement raphanoïde.

Chapeau gris-brun à brun-gris, mamelonné, strié.
Stipe rigide, cassant, strié-sillonné longitudinalement.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité Toxique

Mycena pura (Pers.) P. Kumm.

2546

Syn. : **Prunulus purus**

Nom français : **Mycène pur**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sur divers types de sols.
Odeur : Raphanoïde.

Chapeau violet lilas à violet rose, hygrophane.
Pied creux, cassant, blanchâtre à gris-violet ou rose.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel

2569

Syn. : **Mycena alcalina sensu auct.**

Nom français : **Mycène cespiteuse**
Habitat : Cespiteux - sur bois de conifères.
Odeur : Nitreuse.

Chapeau brun noirâtre à sépia, strié, hygrophane.
Stipe gris-brun, luisant, hérissé de rhizoïdes à la base.

2026-10-09 Prémol

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Toxique

Phaeolepiota aurea (Bull.) R. Maire ex Konrad & Maubl. 2733

Syn. : **Cystoderma aureum - Pholiota aurea**

Nom français : **Pholiote dorée**
Habitat : Dans les parcs, sur les décombres, dans les forêts.
Odeur : Aromatique, acidulée.

Chapeau de 8 à 12 cm, jaune d'or, finement furfuracé.
Stipe plein, tenace, orné d'un anneau membraneux.

---

20 - Les agarics

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Agaricus campestris L. 17

Syn. : **Psalliota campestris**

Nom français : **Rosé des prés**
Habitat : Dans les prés, les prairies fumées, les pelouses.
Odeur : Fongique et agréable, non caractéristique.

Chapeau blanchâtre - Lames rose vif - Anneau fragile.
Stipe s'amincissant vers la base.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité A rejeter

Amanita excelsa (Fr.) Neville & Poumarat var. spissa 118

Syn. : **Amanita spissa**

Nom français : **Amanite épaisse**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Nette odeur raphanoïde.

Port robuste - Chapeau gris à brun - Volve friable.
Anneau juponnant, strié - Stipe à bulbe napiforme.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Toxique

Amanita muscaria (L.) Lam. 130

Syn. :

Nom français : **Amanite tue-mouches**
Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs.
Anneau membraneux, juponnnant - Lames blanches.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Toxique

Amanita muscaria (Singer) Neville & Poumarat f. flavivolvata 131

Syn. :

Nom français : **Forme à voile jaune de Amanita muscaria**
Habitat : Sous conifères et feuillus.
Odeur : Faible.

Voile général jaune.
Autres caractères identiques à ceux du type.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible

Amanita rubescens (Pers.) Gray 152

Syn. :

Nom français : **Amanite rougissante (Golmotte)**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Rougissement de la chair - Anneau ample et strié.Volve friable - Stipe napiforme.

2026-10-09 Prémol

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Mortel

Amanita virosa (Fr.) Bertill. 167

Syn. :

Nom français : **Amanite vireuse**
Habitat : Terrain siliceux montagnard, sous feuillus et conifères.
Odeur : Vireuse chez les vieux exemplaires.

Entièrement blanche - Chapeau conique et déjeté.
Stipe grêle, pelucheux - Anneau fragile +/- lacéré.

---

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Entolomataceae

Comestibilité Comestible

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kummer 450

Syn. :

Nom français : **Meunier**
Habitat : Sous feuillus et résineux, dans les clairières.
Odeur : Fortement farineuse.

Chapeau de forme variable, blanchâtre, cassant.
Lames très décurrentes, blanches puis roses.

---

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité A rejeter

Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken 1573

Syn. :

Nom français : **Hébélome radicant**
Habitat : Sur bois pourri de conifères, en montagne.
Odeur : Forte d'amandes amères.

Chapeau visqueux, jaune rougeâtre, pruineux.
Stipe radicant, orné d'une armille écailleuse annelée.

---

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Inocybaceae

Comestibilité Toxique

Inocybe geophylla P. Kumm. 1887

Syn. :

Nom français : **Inocybe à lames terreuses**
Habitat : En terrain humide, surtout sous feuillus.
Odeur : Spermatique.

Chapeau blanc, mamelonné, soyeux.
Lames pâles à brun ochracé, plutôt serrées.

---

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Inocybaceae

Comestibilité Toxique

Inosperma cervicolor (Pers.) Matheny & Esteve-Rav. 1861

Syn. : **Inocybe cervicolor**

Nom français : **Inocybe couleur de cerf**
Habitat : Conifères et feuillus (épicéas, hêtres).
Odeur : De tonneau moisi, terreuse.

Chapeau ochracé, orné de fines écailles lilas.
Chair rougissant à la coupe.

---

25 - Inocybes et hébélomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Inocybaceae

Comestibilité Toxique

Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. 1875

Syn. : **Inocybe rimosa - Inocybe fastigiata**

Nom français : **Inocybe fastigié**
Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères.
Odeur : Spermatique.

Chapeau paille à jaunâtre, nettement vergeté.
Lames ventrues, jaunâtre olivacé - Stipe blanchâtre.

2026-10-09 Prémol

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Cyclocybe erebia (DC) Vizzini & Angelini

1134

Syn. : **Agrocybe erebia - Pholiota erebia**

Nom français : **Agrocybe brunâtre**
Habitat : Souvent en touffes, sous feuillus, dans les parcs.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau brun chocolat noirâtre à beige ochracé.
Pied grisâtre à brunâtre - Anneau ample, membraneux.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Gymnopilaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill

1484

Syn. :

Nom français : **Gymnopile pénétrant**
Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus.
Odeur : Légèrement herbacée.

Chapeau lisse à faiblement velouté, jaune orangé - Cortine persistante - Lames jaunâtres et saveur amère.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité Comestible

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.

1794

Syn. : **Geophila capnoides**

Nom français : **Hypholome à lames enfumées**
Habitat : Sur souches et racines de conifères.
Odeur : Plutôt agréable.

En touffes, à chapeaux lisses et jaune olive.
Lames lavées de lilas puis noirâtres - Saveur douce.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

MORTEL

Comestibilité Mortel

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

1800

Syn. : **Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis**

Nom français : **Hypholome en touffes**
Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.
Odeur : De polypore.

En touffes sur les souches ou le bois mort.
Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Pholiota gummosa (Lasch) Singer

2776

Syn. : **Flammula gummosa**

Nom français : **Pholiote gommeuse**
Habitat : Dans les clairières herbeuses, sur débris ligneux.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau floconneux, beige sur fond jaune verdâtre.
Stipe moucheté sous une zone annulaire cortiniforme.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Pholiota lenta (Pers.) Singer

2782

Syn. : **Flammula lenta**
Dryophila lenta

Nom français : **Pholiote glutineuse**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sur bois dégradé.
Odeur : Faible, légèrement iodée.

Chapeau beige ochracé jaunâtre, très visqueux, avec des flocons blancs noyés dans le mucus.

2026-10-09 Prémol

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula albonigra (Krombh.) Fr. 3059

Syn. : **Russula nigricans var. albonigra**
Russula adusta var. albonigra
Nom français : **Russule blanche et noire**
Habitat : Sous feuillus et conifères, en plaine et en montagne.
Odeur : Faible, non caractéristique.
Chapeau sec, blanc puis brun noirâtre.
Lames blanches - Stipe court, trapu - Saveur douce.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula cavipes Britzelm. 3099

Syn. :

Nom français : **Russule à pied creux**
Habitat : Surtout sous épicéas.
Odeur : Safranée ou de pommes.
Chapeau bigarré, violet nuancé d'olive - Lames crème, réagissant en rose avec NH3 - Saveur subdouce.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula chloroides (Krombh.) Bres. 3101

Syn. :

Nom français : **Russule à lames glauques**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres.
Odeur : Forte, fruitée.
Grande espèce à chapeau blanc, sec, déprimé.
Lames étroites - Stipe parfois zoné de vert au sommet.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. 3113

Syn. : **Russula cutefracta**

Nom français : **Russule charbonnière**
Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres.
Odeur : Faible, non significative.
Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce.
Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula fellea (Fr.) Fr. 3133

Syn. :

Nom français : **Russule de fiel**
Habitat : Généralement sous hêtres.
Odeur : De compote de pommes.
Entièrement de couleur ochracée à ocre - Saveur âcre.
Lames blanc crème nuancé d'ochracé

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula fragilis Fr. 3138

Syn. : **Russula bataillei - Russula emetica f. knauthii**
Russula fragilis var. knauthii - Russula knauthii
Nom français : **Russule fragile**
Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les hauts-marais.
Odeur : Agréable, de coco ou d'acétate d'amyle.
Chapeau fragile, visqueux, rouge violacé à lilas.
Saveur très âcre - Lames assez espacées, blanches.

2026-10-09 Prémol

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula grata Britzelm 3174

Syn. : **Russula laurocerasi - Russula fragrans**
Russula foetens var. laurocerasi

Nom français : **Russule à odeur de laurier cerise**
Habitat : Surtout sous feuillus.
Odeur : D'amandes amères, de laurier cerise.

Chapeau ochracé roussâtre - Saveur âcre.
Lames crème blanchâtre +/- tachées de roussâtre.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula integra (L.) Fr. 3163

Syn. : **Russula piceetorum - Russula adulterina**

Nom français : **Russule intègre**
Habitat : Dans les pessières de montagne.
Odeur : Très faible d'iode à la coupe.

Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns.
Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Russula mustelina Fr. 3197

Syn. :

Nom français : **Russule couleur de belette**
Habitat : Dans les pessières à myrtilles, en montagne.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Espèce compacte - Chapeau sec, brun noisette.
Saveur douce - Lames crème - Chair épaisse.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Toxique

Russula nobilis Velen. 3189

Syn. : **Russula fageticola - Russula mairei**

Nom français : **Russule de Maire**
Habitat : Sous hêtres, en terrain acide.
Odeur : De coco.

Port robuste et chapeau ferme, d'un beau rouge.
Lames blanc glauque - Saveur âcre - Stipe blanc pur.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula ochroleuca Pers. 3204

Syn. :

Nom français : **Russule ocre et blanche**
Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des tourbières.
Odeur : Faiblement fruitée.

Chapeau ochracé - Lames blanches à crème pâle.
Saveur âcre à presque douce - Stipe blanc, grisonnant.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Mortel

Russula olivacea (Schaeff.) Fr. 3207

Syn. :

Nom français : **Russule olivacée**
Habitat : En montagne, sous hêtres et épicéas.
Odeur : Faible, un peu fruitée.

Chapeau vert à brun ou jaune, sec - Saveur douce.
Phénol = pourpre - Lames jaunes.

2026-10-09 Prémol

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. 3289

Syn. :

Nom français : **Russule feuille morte - Russule écrevisse**
Habitat : Sous conifères de montagne, près des hauts-marais.
Odeur : De crustacés en train de cuire.
Chapeau pourpre - Stipe rose rouge - Lames ocre.
Saveur douce - Réaction verte avec SO4Fe.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius blennius (Fr.) Fr. 2020

Syn. :

Nom français : **Lactaire muqueux**
Habitat : Exclusivement sous hêtres.
Odeur : Subnulle.
Chapeau gris-brun mêlé d'olive, très visqueux.
Latex abondant, âcre, tachant les lames de gris.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Toxique

Lactarius intermedius Krombh ex Berk. & Broome 2055

Syn. :

Nom français : **Lactaire des sapins**
Habitat : Dans les hêtraies-sapinières.
Odeur : Subnulle ou un peu fruitée.
Chapeau jaune ochracé, non ou peu zoné.
Latex peu abondant, jaunissant à l'air, âcre.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. 2076

Syn. :

Nom français : **Lactaire à lait brûlant**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous noisetiers.
Odeur : Faible, légèrement fruitée.
Chapeau humide, ochracé livide, +/- zoné.
Latex très âcre, réagissant en jaune avec KOH.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Comestible

Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair 2091

Syn. :

Nom français : **Lactaire couleur saumon**
Habitat : Sous les sapins.
Odeur : Faible, légèrement savonneuse.
Chapeau jaune orangé, sans traces de vert.
Latex abondant, rouge carotte, subimmuable.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius subdulcis (Pers.) Gray 2100

Syn. :

Nom français : **Lactaire presque doux**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres.
Odeur : De punaise, de baudruche.
Chapeau beige chamois, non zoné, feutré.
Latex vite tari, blanc, immuable, douceâtre.

2026-10-09 Prémol

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Boletus edulis Bull. 263

Syn. :

Nom français : **Cèpe de Bordeaux**
Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide.
Odeur : Fongique, très agréable.
Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre.
Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité A rejeter

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 342

Syn. : **Boletus piperatus - Chalciporus amarellus**

Nom français : **Bolet poivré**
Habitat : Sous conifères de montagne, rarement sous feuillus.
Odeur : Non caractéristique.
Chapeau brun-rouge à brun-jaune - Saveur poivrée.
Pores amples, anguleux, cuivrés - Base du stipe jaune.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Imleria badia (Fr.) Vizzini 1824

Syn. : **Boletus badius - Xerocomus badius**

Nom français : **Bolet bai**
Habitat : Sous conifères et feuillus.
Odeur : Faible, non caractéristique.
Chapeau bai à marron, de couleur uniforme.
Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Leccinum albostipitatum Den Bakker & Noordel. 2133

Syn. : **Leccinum aurantiacum sensu auct.**
Leccinum rufum
Nom français : **Bolet à pied orné de mèches blanches**
Habitat : Surtout sous les trembles, parfois sous peupliers.
Odeur : Faible, non caractéristique.
Chapeau orangé vif, la cuticule débordant de la marge.
Stipe couvert de mèches blanches puis roussissantes.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Leccinum scabrum (Bull.) Gray 2151

Syn. : **Boletus scaber**

Nom français : **Bolet rude**
Habitat : Sous bouleaux.
Odeur : Agréable.
Chapeau brun fauve, finement feutré.
Stipe élancé, orné de fines squamules bistres.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn 2601

Syn. : **Boletus erythropus**

Nom français : **Bolet à pied rouge**
Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne.
Odeur : +/- fruitée.
Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté.
Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.

2026-10-09 Prémol

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Toxique

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.J. Gilbert — 2880

Syn. : **Porphyrellus pseudoscaber**
Tylopilus porphyrosporus
Nom français : **Bolet porphyre**
Habitat : Sous feuillus et sous conifères de montagne.
Odeur :
Chapeau sec, brun noirâtre olivacé, finement velouté.
Pores petits, arrondis, gris à pourpres.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Xerocomellus pruinatus (Fr.) Šutara — 3635

Syn. : **Xerocomus pruinatus**
Boletus pruinatus
Nom français : **Bolet pruineux**
Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres.
Odeur : Agréable.
Chapeau bai foncé, charnu, velouté, pruineux.
Saveur acidulée - Pores grands et anguleux.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio — 3640

Syn. : **Boletus ferrugineus - Boletus et Xerocomus lanatus**
Boletus et Xerocomus spadiceus
Nom français : **Bolet ferrugineux**
Habitat : Sous feuillus et sous conifères.
Odeur : Faible, non caractéristique.
Chapeau brun-rouge, verdissant avec NH3.
Pores jaune +/- vif - Stipe fibrillo-ridé - Chair crème.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Gomphidiaceae

Comestibilité Comestible

Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. — 1463

Syn. :

Nom français : **Gomphide glutineux**
Habitat : Sous conifères de montagne.
Odeur : Insignifiante.
Chapeau brun ochracé, recouvert d'un voile glutineux.
Lames espacées, très décurrentes.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Hygrophoropsidaceae

Comestibilité Comestible

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire — 1728

Syn. :

Nom français : **Fausse chanterelle**
Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries.
Odeur : Faible, non caractéristique.
Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore
Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Hygrophoropsidaceae

Comestibilité A rejeter

Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen — 1170

Syn. :

Nom français :
Habitat : Sur le bois enterré de conifères, (épicéas et pins). Rare.
Odeur : Odeur pénétrante semblable à l'ozone.
Chapeau brun-orangé, mat, velouté - Stipe orange.
Lames décurrentes, serrées, fourchues, orange.

2026-10-09 Prémol

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Paxillaceae

Comestibilité Mortel

Paxillus involutus (Batsch) Fr. 2685

Syn. :

Nom français : **Paxille enroulé**
Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs.
Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau roux ochracé, à marge involutée.
Lames très serrées, étroites, facilement détachables.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Lycoperdaceae

Comestibilité A rejeter

Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini 2456

Syn. : **Lycoperdon pyriforme - Morganella pyriformis**

Nom français : **Vesse de loup en forme de poire**
Habitat : En touffes sur souches ou bois mort de conifères.
Odeur : Plutôt désagréable.

Fructifications piriforme - Exopéridium brun-jaune.
Gléba blanche puis verdâtre - Subgléba blanche.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité A rejeter

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly 1110

Syn. :

Nom français : **Crucibulum lisse**
Habitat : Sur bois pourrrissant et débris végétaux.
Odeur : Non caractéristique.

Espèce formée de petits gobelets contigus.
Surface externe lisse - Opercule jaune ochracé.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité A rejeter

Lycoperdon echinatum Pers. 2339

Syn. : **Lycoperdon gemmatum var. echinatum**

Nom français : **Vesse de loup hérisson**
Habitat : Surtout sous hêtres en terrain calcaire.
Odeur : Non caractéristique.

Fructifications globuleuses fortement échinulées.
Gléba blanche puis brun pourpre à maturité.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Phallales
Fam. Phallaceae

Comestibilité A rejeter

Phallus impudicus L. 2741

Syn. :

Nom français : **Satyre puant**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Cadavérique à maturité.

D'abord en forme d'œuf puis il prend l'aspect d'une morille à long pied fragile et à chapeau verdâtre.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Sclerodermataceae

Comestibilité Toxique

Scleroderma citrinum Pers. 3327

Syn. : **Scleroderma vulgare**
Scleroderma aurantium sensu auct.

Nom français : **Scléroderme commun**
Habitat : Sur terre sablonneuse.
Odeur : Nulle.

Fructifications tuberculeuses, comprimées, sessiles.
Péridium épais, jaune ochracé, verruqueux.

2026-10-09 Prémol

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Sclerodermataceae

Comestibilité Toxique

Scleroderma verrucosum Bull.

3330

Syn. :

Nom français : **Scléroderme verruqueux**
Habitat : En troupe sur sols sablonneux, au bord des chemins.
Odeur : Forte et désagréable.

Carpophores subglobuleux - Pseudostipe lacuneux.
Péridium jaune ochracé, écailleux - Gléba grise à noire.