SORTIE SMD DU 21 octobre 2026

CHARTREUSE DE PREMOL - MASSIF DE BELLEDONNE

Cette sortie encadrée par Antoine Portejoie et Isabelle Anselmet s'est déroulée dans une ambiance conviviale mais quelque peu humide.
Nous avons eu le plaisir de partager les identifications avec Cécile, Jean et Charles.

Quinze personnes dont beaucoup de jeunes ont participé à la sortie.
Un journaliste local s'est joint à nous et a pu enregistrer les commentaires et faire des photos.

Synthèse de sortie : Une petite centaine d'espèces déterminée.

Lieu de départ : Ancienne chartreuse de Prémol,

Voir tableau imagé ci-après

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

09 - Les ascomycètes

Div. Ascomycota
Clas. Leotiomycetes
Ord.. Helotiales
Fam. Leotiaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Leotia lubrica (Scop.) Pers. 2176

Syn. : **Leotia viscosa**

Nom français : **Leotie lubrique**
Habitat : Sur terre, en groupes, dans les mousses.
Odeur : Insignifiante.

Fructifications gélatineuses avec une tête et un stipe.
Chapeau visqueux, arrondi, bosselé, lobé, vert-jaune.

---

09 - Les ascomycètes

Div. Ascomycota
Clas. Pezizomycetes
Ord.. Pezizales
Fam. Discinaceae

MORTEL

Comestibilité Mortel

Paragyromitra infula (Schaeff.) X.C. Wang & W.Y. Zhuang 1525

Syn. : **Gyromitra infula - Physomitra infula**

Nom français : **Gyromitre en turban**
Habitat : En montagne, sur bois dégradé, en automne.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau cannelle, mitriforme, formé de 2 à 4 lobes.
Stipe très irrégulier, creux, à chair cassante.

---

09 - Les ascomycètes

Div. Ascomycota
Clas. Sordariomycetes
Ord.. Xylariales
Fam. Xylariaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Xylaria hypoxylon (L.) Grev. 3656

Syn. :

Nom français : **Xylaire du bois**
Habitat : Sur bois mort, surtout de feuillus, toute l'année.
Odeur : Nulle.

Fructifications aplaties, en forme de cornes de cerf.
Pédoncule noir et poilu - Périthèces verruqueux.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Dacrymycetes
Ord.. Dacrymycetales
Fam. Dacrymycetaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Calocera furcata (Fr.) Fr. 299

Syn. : **Calocera viscosa var. furcata**

Nom français : **Calocère fourchue**
Habitat : Sur bois mort de conifères.
Odeur : Inodore.

Fructifications fourchues aux extrémités.
Proche de Calocera cornea mais spores différentes.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Dacrymycetes
Ord.. Dacrymycetales
Fam. Dacrymycetaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Calocera viscosa Pers. 301

Syn. :

Nom français : **Calocère visqueuse**
Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères.
Odeur : Inodore.

En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé.
Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Auriculariales
Fam. Exidiaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. 2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**
Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.
Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cyphellaceae

Comestibilité A rejeter

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar

358

Syn. : **Stereum purpureum**

Nom français : **Stérée pourpre**
Habitat : Sur souches et branches de feuillus.
Odeur : Non caractéristique.

Petits chapeaux imbriqués lilacin pâle, pruineux, velus.
Hyménium lilacin puis chocolat - Chair cartilagineuse.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Ganodermataceae

Comestibilité A rejeter

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

1427

Syn. :

Nom français : **Ganoderme luisant**
Habitat : Sur racines +/- enterrées de feuillus (chênes).
Odeur : Agréable de polypore.

Chapeau brun-rouge, à revêtement laqué.
Stipe latéral ou excentrique, vernissé.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.

2170

Syn. : **Leucoporus brumalis - Polyporus brumalis**

Nom français : **Polypore hivernal**
Habitat : En période hivernale, sur bois mort de feuillus.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brun fauve, feutré, à marge lisse ou ciliée.
Pores petits et fins, arrondis, concolores aux tubes.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Stereaceae

Comestibilité A rejeter

Stereum hirsutum (Wild.) Gray

3376

Syn. :

Nom français : **Stérée hirsute**
Habitat : En colonies, sur bois mort de feuillus.
Odeur : Nulle.

Fructifications résupinées à étalées-réfléchies.
Surface fertile hirsute - Hyménium lisse, brun-orange.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Trametes pubescens (Schumach.) Pilát

3454

Syn. : **Coriolus pubescens - Trametes velutina**

Nom français : **Tramète pubescente**
Habitat : Sur bois mort de feuillus (hêtres, bouleaux ...).
Odeur : Nulle.

Chapeau velouté, délicatement zoné, ocre-jaune.
Pores arrondis, jaune ochracé - Trame aérifère.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité A rejeter

Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt.

388

Syn. : **Clavaria rugosa**

Nom français : **Clavaire rugueuse**
Habitat : Dans les forêts de conifères, en bordure des chemins.
Odeur : Insignifiante.

Fructifications simples, à extrémités obtuses, digitées.
Hyménium rugueux, sillonné ou plissé, blanc à crème.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité Comestible

Craterellus tubaeformis Bull. 1080

Syn. : **Cantharellus tubaeformis**

Nom français : **Chanterelle en tube**
Habitat : Surtout sous conifères, dans les mousses humides.
Odeur : Agréable, fruitée.
Chapeau en entonnoir, brun gris à brun ochracé.
Plis bien formés, fourchus, gris-brun - Stipe brun-jaune.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité Comestible

Hydnum rufescens Pers. 1674

Syn. : **Hydnum repandum var. ou f. rufescens**

Nom français : **Pied-de-mouton roussissant**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Non caractéristique.
Petite espèce à chapeau brun-orange à roux vif.
Aiguillons jaune orangé, non ou peu décurrents.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Thelephorales
Fam. Bankeraceae

Comestibilité Comestible

Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. 3305

Syn. : **Hydnum imbricatum**

Nom français : **Hydne imbriqué**
Habitat : Sous conifères de montagne, surtout sous épicéas.
Odeur : Légèrement épicée.
Grande espèce à chapeau grossièrement écailleux.
Hyménium constitué d'aiguillons subulés et fragiles.

---

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

Comestibilité A rejeter

Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. 1732

Syn. :

Nom français : **Hygrophore à odeur agréable**
Habitat : Dans les pessières, sur sols calcaires.
Odeur : D'amandes amères.
Chapeau gris-beige, obtusément mamelonné.
Pied blanchâtre ou gris, granuleux au sommet.

---

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

Comestibilité A rejeter

Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea 1745

Syn. : **Hygrophorus chrysaspis**

Nom français : **Hygrophore à disque jaune**
Habitat : Dans les hêtraies, sur sols calcaires.
Odeur : De peau de mandarine à anisée.
Chapeau visqueux, lisse, blanc à crème ochracé.
Brunissement roux vif à partir de la marge.

---

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

Comestibilité A rejeter

Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. 1773

Syn. :

Nom français : **Hygrophore pudibond**
Habitat : Ubiquiste, sous sapins, jusqu'en zone alpine.
Odeur : Résineuse, de térébenthine.
Chapeau visqueux, rosé aurore ou saumon.
Stipe ferme, à reflets jaune-orange, visqueux.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hygrophoraceae

Comestibilité A rejeter

Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr. 1775

Syn. : **Hygrophorus tephroleucus**

Nom français : **Hygrophore pustuleux**
Habitat : Sous conifères (épicéas).
Odeur : Subnulle.

Chapeau moucheté de brun-gris sur fond pâle.
Stipe presque entièrement ponctué de gris.

---

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Marasmiaceae

Comestibilité Toxique

Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer 2818

Syn. : **Nothopanus porrigens - Pleurotus porrigens**
Phyllotus porrigens

Nom français : **Pleurote en éventail**
Habitat : Sur bois pourri de conifères, surtout en montagne.
Odeur : Herbacée.

Espèce spatulée, fixée latéralement, sessile, blanche.
Lames confluentes au point d'attache, blanches.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Toxique

Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead et al. 171

Syn. : **Clitocybe clavipes**

Nom français : **Clitocybe à pied en massue**
Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain acide.
Odeur : De jasmin ou fruitée, de fleur de mandarinier.

Stipe à base claviforme, spongieuse - Chapeau beige. Lames décurrentes, blanches puis crème jaunâtre.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

Comestibilité Toxique

Armillaria lutea Gillet 187

Syn. : **Armillaria bulbosa - Armillaria gallica**

Nom français : **Armillaire à anneau jaune**
Habitat : Espèce isolée ou en groupes, sur feuillus et conifères.
Odeur : Faible à +/- désagréable.

Chapeau brun-ocre - Stipe bulbeux à base +/- jaune vif.
Anneau bordé de jaune - Lames un peu décurrentes.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

Comestibilité Toxique

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 189

Syn. : **Armillariella ostoyae**

Nom français : **Armillaire d'Ostoya**
Habitat : Souvent sur souches et racines d'épicéas.
Odeur : Faible, de polypore.

Chapeau brun-roux, couvert de mèches brun noirâtre.
Anneau membraneux - Lames un peu décurrentes.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Comestible

Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja 1835

Syn. : **Clitocybe gibba**

Nom français : **Clitocybe bossu**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Cyanique.

Chapeau en entonnoir, beige à beige ochracé.
Lames très décurrentes, crème - Stipe blanchâtre.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

Comestibilité Toxique

Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini et al. 2300

Syn. : **Clitocybe connata - Lyophyllum connatum**

Nom français : **Clitocybe en touffes**
Habitat : Au bord des chemins, en troupes et fasciculés.
Odeur : Herbacée, de petits pois ou de haricots.

Chapeau blanc pur ou glacé, soyeux, marbré de gris.
Chair blanche, cartilagineuse - Pieds blancs, connés.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Hymenochaetales
Fam. Rickenellaceae

Comestibilité Toxique

Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. 3027

Syn. : **Mycena fibula - Omphalia fibula**

Nom français : **Omphale en forme d'épingle**
Habitat : Dans les mousses, les marécages, les sphaignes.
Odeur : Nulle.

Espèce gracile à chapeau ombiliqué, orange vif.
Lames arquées-décurrentes à reflets orangés.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Toxique

Tricholoma fulvum DC. 3510

Syn. : **Tricholoma flavobrunneum**

Nom français : **Tricholome fauve**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous bouleaux.
Odeur : De farine rance.

Chapeau brun roux, à marge cannelée - Lames jaunes.
Stipe concolore, jaune au sommet - Saveur farineuse.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 3544

Syn. : **Tricholoma boudieri**

Nom français : **Tricholome à odeur de savon**
Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne.
Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide.

Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante.
Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Toxique

Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin 3550

Syn. : **Tricholoma sciodellum**
Tricholoma virgatum var. sciodes

Nom français : **Tricholome gris perfide**
Habitat : Surtout sous hêtres, en zone calcaire.
Odeur : Faible, un peu terreuse, herbacée.

Chapeau grisâtre, à reflets lilacins, fibrilleux.
Saveur amère puis âcre - Lames bordées de noir.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. 3558

Syn. : **Tricholoma bufonium - Tricholoma subsulphureum**

Nom français : **Tricholome soufré**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Désagréable de gaz d'éclairage.

Entièrement jaune soufre (chapeau, pied et lames).
Chapeau charnu - Lames jaune vif - Saveur écœurante.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholoma ustale (Fr.) Fr. 3565

Syn. :

Nom français : **Tricholome brûlé**
Habitat : En montagne, sous feuillus, surtout sous hêtres.
Odeur : Subnulle ou faiblement farineuse.

Chapeau brun-rouge, visqueux, fibrilleux.
Arête des lames ponctuée puis liserée de brun-noir.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. 3568

Syn. :

Nom français : **Tricholome couleur de vache**
Habitat : Surtout sous conifères, parfois sous feuillus (saules).
Odeur : Peu agréable, herbacée, un peu farineuse.

Chapeau brun fauve, squamuleux, à marge laineuse.
Saveur un peu amère - Stipe blanc à fibrilleux de roux.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

Comestibilité A rejeter

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer 3573

Syn. : **Tricholoma decorum**

Nom français : **Tricholome décoré**
Habitat : Sur bois pourri de conifère, surtout en montagne.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau jaune d'or, orné de squamules brun olivacé.
Stipe moucheté de brun bistre - Lames jaune d'or.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité A rejeter

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 3576

Syn. : **Tricholoma rutilans**

Nom français : **Tricholome rutilant**
Habitat : Sur souches de conifères.
Odeur : Faible de moisi.

Chapeau jaune, orné de petites écailles pourpre violet.
Chair jaune vif - Saveur amarescente - Lames jaune vif.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae

Comestibilité Comestible

Laccaria amethystina Cooke 1987

Syn. : **Laccaria amethystea**
Laccaria laccata var. amethystina
Nom français : **Laccaire améthyste**
Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères.
Odeur : Légèrement fruitée.

Chapeau hygrophane, violet foncé puis pâlissant.
Lames très espacées, larges, épaisses, violettes.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae

Comestibilité Comestible

Laccaria laccata (Scop.) Cooke 1989

Syn. :

Nom français : **Laccaire laqué**
Habitat : Dans les bois, au bord des chemins.
Odeur : Insignifiante.

Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisse.
Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Lyophyllaceae

Comestibilité A rejeter

Tephrocybe rancida (Fr.) Donk

2372

Syn. : **Lyophyllum rancidum**

Nom français : **Lyophyllle rance**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Forte de farine rance.

Chapeau brun-gris, fibrilleux - Saveur peu farineuse.
Stipe élancé, profondément radicant.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae

Comestibilité A rejeter

Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen

1495

Syn. : **Collybia confluens - Marasmius confluens**
Gymnopus confuens
Nom français : **Collybie en touffe**
Habitat : En rond de sorcière, ubiquiste.
Odeur : Légèrement cyanique.

Chapeau beige mastic à brun pâle, hygrophane.
Lames très serrées, étroites et pied pruineux.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

Comestibilité A rejeter

Hymenopellis radicata (Rehlan) R.H. Petersen

1787

Syn. : **Collybia radicata - Mucidula radicata**
Oudemansiella radicata - Xerula radicata
Nom français : **Collybie radicante**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres, parfois sur racines.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau visqueux, veiné-ridé, brun foncé à beige.
Lames blanches - Pied prolongé par une longue racine.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Marasmiaceae

Comestibilité Comestible

Marasmius oreades (Bolton) Fr.

2413

Syn. :

Nom français : **Marasme des oréades**
Habitat : Au printemps, dans les prés, pâturages et alpages.
Odeur : Fortement cyanique.

Chapeau brun-roux, hygrophane et lames espacées.
Dans l'herbe en ronds de sorcières.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

Comestibilité A rejeter

Mucidula mucida (Schrad.) Pat.

2458

Syn. : **Oudemansiella mucida - Collybia mucida**

Nom français : **Collybie visqueuse**
Habitat : Sur bois mort de hêtres.
Odeur : Faible, un peu herbacée.

Chapeau couvert d'une pellicule gélatineuse séparable. Lames espacées, blanches - Présence d'un anneau.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae

Comestibilité A rejeter

Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle

2587

Syn. : **Marasmius alliaceus**

Nom français : **Marasme à odeur d'ail**
Habitat : Sur branches tombées ou débris ligneux de hêtres.
Odeur : Pénétrante d'ail.

Chapeau ocre-beige ou crème blanchâtre.
Stipe élancé, rigide, noirâtre, pruineux au sommet.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae

Comestibilité A rejeter

Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira

1515

Syn. : **Micromphale perforans - Marasmiellus perforans**
Gymnopus perforans

Nom français : **Marasme perforant**
Habitat : Sur des aiguilles de conifères, surtout d'épicéas.
Odeur : De chou pourri ou d'eau croupie.

Chapeau de 0,5 -1,5 cm, beige rosâtre, strié-ridé.
Lames crème, espacées - Stipe velouté, vite noirâtre.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae

Comestibilité A rejeter

Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox

3001

Syn. : **Collybia butyracea**

Nom français : **Collybie beurrée**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sur sols pauvres.
Odeur : Agréable, épicée.

Chapeau brun-rouge, hygrophane, gras au toucher.
Stipe clavé, farci ou creux, concolore, fibrilleux, sec.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél.

2472

Syn. : **Mycena elegans sensu auct.**

Nom français : **Mycène à arête des lames orange**
Habitat : Dans les forêts de conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brun-gris à marge jaune ou jaune oangé.
Arête des lames orange vif.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm.

2487

Syn. :

Nom français : **Mycène à latex safran**
Habitat : Sur rameaux et branches mortes de hêtres.
Odeur : Subnulle.

Chapeau gris olive, souvent taché d'orangé.
Chair mince, libérant un latex orange à la cassure.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena epipterygia (Scop.) Gray

2493

Syn. : **Prunulus epipterygius**

Nom français : **Mycène des fougères**
Habitat : Sur humus et débris végétaux, feuilles ou aiguilles.
Odeur : Subnulle ou farineuse rance.

Chapeau jaune citrin - Stipe visqueux, jaune citrin vif.
Une pellicule visqueuse séparable couvre le chapeau.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena galericulata (Scop.) Gray

2505

Syn. :

Nom français : **Mycène en casque**
Habitat : Sur souches et branches de feuillus ou de conifères.
Odeur : Faible, farineuse (saveur très farineuse).

Stipe tenace, souvent comprimé, hirsute à la base.
Lames souvent rose pâle, fortement interveinées.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Mycena maculata P. Karst. 2519

Syn. :

Nom français : **Mycène tachée**
Habitat : Sur bois mort de feuillus et de conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brun-gris à brun-rouge, longuement strié.
Toutes les parties se tachent de brun-rouge.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Mycena pelianthina (Fr.) Quél. 2535

Syn. : **Prunulus pelianthinus**

Nom français : **Mycène à lames bordées de pourpre**
Habitat : Sous feuillus (surtout hêtres), sur litières de feuilles.
Odeur : Raphanoïde.

Chapeau gris violacé, à reflets lilas - Stipe concolore.
Lames gris lilas, à arête pourpre - Chair brunâtre.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 2546

Syn. : **Prunulus purus**

Nom français : **Mycène pur**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sur divers types de sols.
Odeur : Raphanoïde.

Chapeau violet lilas à violet rose, hygrophane.
Pied creux, cassant, blanchâtre à gris-violet ou rose.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. 2560

Syn. : **Mycena roseola**

Nom français : **Mycène rosâtre**
Habitat : En troupe, sur tapis d'aiguilles, sous pins et épicéas.
Odeur : Insignifiante.

Chapeau fragile, strié-cannelé, rose tendre.
Stipe blanc à reflets roses, orné de rhizoïdes.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel 2569

Syn. : **Mycena alcalina sensu auct.**

Nom français : **Mycène cespiteuse**
Habitat : Cespiteux - sur bois de conifères.
Odeur : Nitreuse.

Chapeau brun noirâtre à sépia, strié, hygrophane.
Stipe gris-brun, luisant, hérissé de rhizoïdes à la base.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm. 2583

Syn. :

Nom français : **Mycène élégant**
Habitat : Plutôt montagnard, parmi les aiguilles de conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brunâtre, se tachant de brun roussâtre.
Stipe fragile, +/- teinté de rougeâtre, hérissé à la base.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser

2383

Syn. : **Lepiota excoriata**

Nom français : **Lépiote excoriée**
Habitat : Dans les prairies sèches, les pâturages maigres.
Odeur : Faible mais agréable.

Chapeau brun noisette, à marge excoriée, orné d'écailles disposées en bandes radiales +/- étoilées.

---

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer

2385

Syn. : **Macrolepiota gracilenta - Macrolepiota konradii**
Macrolepiota rickenii - Macrolepiota affinis

Nom français : **Lépiote mamelonnée**
Habitat : Dans les pâtures, les parcs, les sentiers herbeux.
Odeur : Nette de beurre fondu.

Chapeau à mamelon obtus, orné d'écailles brunes disposées régulièrement et concentriquement.

---

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Macrolepiota procera (Scop.) Singer

2387

Syn. : **Lepiota procera**

Nom français : **Lépiote élevée (Coulemelle)**
Habitat : Dans les prés, les lisières ou clairières gramineuses.
Odeur : Faible, fongique.

Reconnaissable à sa grande taille, à son chapeau squameux, à son stipe chiné, à son anneau coulissant.

---

20 - Les agarics

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Agaricus campestris L.

17

Syn. : **Psalliota campestris**

Nom français : **Rosé des prés**
Habitat : Dans les prés, les prairies fumées, les pelouses.
Odeur : Fongique et agréable, non caractéristique.

Chapeau blanchâtre - Lames rose vif - Anneau fragile.
Stipe s'amincissant vers la base.

---

20 - Les agarics

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Agaricus sylvaticus Schaeff.

49

Syn. : **Agaricus haemorrhoidarius**

Nom français : **Agaric des forêts**
Habitat : Sous conifères (litières d'aiguilles).
Odeur : Agréable mais non caractéristique.

Chapeau écailleux, brun jaunâtre sur fond pâle.
Chair très fortement rougissante.

---

21 - Coprins et psathyrelles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Psathyrellaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson

496

Syn. : **Coprinus micaceus**

Nom français : **Coprin micacé**
Habitat : Sur ou autour du bois mort, parfois +/- enterré.
Odeur : Nulle.

Chapeau brun-roux à voile fugace micacé ou granuleux.
Lames vite déliquescentes - Stipe blanc, pubescent.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Toxique

Amanita muscaria (L.) Lam. 130

Syn. :

Nom français : **Amanite tue-mouches**
Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs.
Anneau membraneux, juponnnant - Lames blanches.

---

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible

Amanita rubescens (Pers.) Gray 152

Syn. :

Nom français : **Amanite rougissante (Golmotte)**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Rougissement de la chair - Anneau ample et strié.Volve friable - Stipe napiforme.

---

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Entolomataceae

Comestibilité Comestible

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kummer 450

Syn. :

Nom français : **Meunier**
Habitat : Sous feuillus et résineux, dans les clairières.
Odeur : Fortement farineuse.

Chapeau de forme variable, blanchâtre, cassant.
Lames très décurrentes, blanches puis roses.

---

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

Comestibilité Toxique

Cortinarius infractus (Pers.) Fr. 781

Syn. : **Cortinarius obscurocyaneus**
Cortinarius infractus var. obscurocyaneus
Nom français : **Cortinaire à marge brisée**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sous hêtres et bouleaux.
Odeur : Faible ou un peu raphanoïde.

Chapeau visqueux, gris-brun terne, à marge infractée.
Lames gris-brun - Stipe brun olivacé - Saveur amère.

---

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

Comestibilité Mortel

Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray 953

Syn. : **Cortinarius puniceus**

Nom français : **Cortinaire sanguin**
Habitat : Dans les sapinières et pessières humides.
Odeur : Raphanoïde ou de bois de cèdre.

Coloration entièrement rouge sang - Mycélium orangé.
Silhouette élancée - Chapeau finement squamuleux.

---

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

Comestibilité A rejeter

Phlegmacium triumphans (Fr.) A. Blytt 1024

Syn. : **Cortinarius crocolitus - Cortinarius triumphans**

Nom français : **Cortinaire triomphant**
Habitat : Sous bouleaux et autres feuillus, en terrain siliceux.
Odeur : Insignifiante ou terreuse.

Chapeau jaune ochracé - Lames blanches à crème.
Stipe chiné de bracelets jaune roussâtre.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen & Liimat. 922

Syn. : **Cortinarius eumarginatus - Cortinarius purpurascens**

Nom français : **Cortinarius purpurescent**
Habitat : Sous conifères (épicéas), sur sols acides.
Odeur : Nulle.

Chapeau visqueux, gris-bleu, orné de fibrilles brunes.
Lames se tachant de violet sombre au froissement.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Gymnopilaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill 1484

Syn. :

Nom français : **Gymnopile pénétrant**
Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus.
Odeur : Légèrement herbacée.

Chapeau lisse à faiblement velouté, jaune orangé - Cortine persistante -
Lames jaunâtres et saveur amère.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité Comestible

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. 1794

Syn. : **Geophila capnoides**

Nom français : **Hypholome à lames enfumées**
Habitat : Sur souches et racines de conifères.
Odeur : Plutôt agréable.

En touffes, à chapeaux lisses et jaune olive.
Lames lavées de lilas puis noirâtres - Saveur douce.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

MORTEL

Comestibilité Mortel

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 1800

Syn. : **Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis**

Nom français : **Hypholome en touffes**
Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.
Odeur : De polypore.

En touffes sur les souches ou le bois mort.
Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Hypholoma marginatum J. Schröt. 1806

Syn. : **Hypholoma dispersum - Psilocybe marginata**

Nom français : **Hypholome marginé**
Habitat : Sur bois et débris divers de conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Marge piléique ornée des restes du voile blanc.
Stipe coriace, voilé-chiné de fibrilles blanches.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Pholiota lenta (Pers.) Singer 2782

Syn. : **Flammula lenta**
Dryophila lenta

Nom français : **Pholiote glutineuse**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sur bois dégradé.
Odeur : Faible, légèrement iodée.

Chapeau beige ochracé jaunâtre, très visqueux, avec des flocons blancs noyés dans le mucus.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula cavipes Britzelm. 3099

Syn. :

Nom français : **Russule à pied creux**
Habitat : Surtout sous épicéas.
Odeur : Safranée ou de pommes.

Chapeau bigarré, violet nuancé d'olive - Lames crème, réagissant en rose avec NH3 - Saveur subdouce.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula chloroides (Krombh.) Bres. 3101

Syn. :

Nom français : **Russule à lames glauques**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres.
Odeur : Forte, fruitée.

Grande espèce à chapeau blanc, sec, déprimé.
Lames étroites - Stipe parfois zoné de vert au sommet.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula fellea (Fr.) Fr. 3133

Syn. :

Nom français : **Russule de fiel**
Habitat : Généralement sous hêtres.
Odeur : De compote de pommes.

Entièrement de couleur ochracée à ocre - Saveur âcre.
Lames blanc crème nuancé d'ochracé

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula integra (L.) Fr. 3163

Syn. : **Russula piceetorum - Russula adulterina**

Nom français : **Russule intègre**
Habitat : Dans les pessières de montagne.
Odeur : Très faible d'iode à la coupe.

Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns.
Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Russula nobilis Velen. 3189

Syn. : **Russula fageticola - Russula mairei**

Nom français : **Russule de Maire**
Habitat : Sous hêtres, en terrain acide.
Odeur : De coco.

Port robuste et chapeau ferme, d'un beau rouge.
Lames blanc glauque - Saveur âcre - Stipe blanc pur.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula ochroleuca Pers. 3204

Syn. :

Nom français : **Russule ocre et blanche**
Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des tourbières.
Odeur : Faiblement fruitée.

Chapeau ochracé - Lames blanches à crème pâle.
Saveur âcre à presque douce - Stipe blanc, grisonnant.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius albocarneus Britzelm. 2010

Syn. : **Lactarius glutinopallens**

Nom français : **Lactaire glutineux**
Habitat : Sous conifères, dans les hauts-marais.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau gris-beige nuancé de lilacin, gluant.
Latex blanc puis crème verdâtre, très âcre.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius blennius (Fr.) Fr. 2020

Syn. :

Nom français : **Lactaire muqueux**
Habitat : Exclusivement sous hêtres.
Odeur : Subnulle.

Chapeau gris-brun mêlé d'olive, très visqueux.
Latex abondant, âcre, tachant les lames de gris.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Lactarius deterrimus Gröger 2037

Syn. :

Nom français : **Lactaire des épicéas**
Habitat : Exclusivement sous épicéas.
Odeur : Nulle.

Chapeau orangé vif, vite verdissant, zoné.
Latex peu abondant, orange, immuable, amer.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius pyrogalus (Bull.) Fr. 2076

Syn. :

Nom français : **Lactaire à lait brûlant**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous noisetiers.
Odeur : Faible, légèrement fruitée.

Chapeau humide, ochracé livide, +/- zoné.
Latex très âcre, réagissant en jaune avec KOH.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair 2091

Syn. :

Nom français : **Lactaire couleur saumon**
Habitat : Sous les sapins.
Odeur : Faible, légèrement savonneuse.

Chapeau jaune orangé, sans traces de vert.
Latex abondant, rouge carotte, subimmuable.

---

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius subdulcis (Pers.) Gray 2100

Syn. :

Nom français : **Lactaire presque doux**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres.
Odeur : De punaise, de baudruche.

Chapeau beige chamois, non zoné, feutré.
Latex vite tari, blanc, immuable, douceâtre.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Boletus edulis Bull. 263

Syn. :

Nom français : **Cèpe de Bordeaux**
Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide.
Odeur : Fongique, très agréable.

Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre.
Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 342

Syn. : **Boletus piperatus - Chalciporus amarellus**

Nom français : **Bolet poivré**
Habitat : Sous conifères de montagne, rarement sous feuillus.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brun-rouge à brun-jaune - Saveur poivrée.
Pores amples, anguleux, cuivrés - Base du stipe jaune.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Imleria badia (Fr.) Vizzini 1824

Syn. : **Boletus badius - Xerocomus badius**

Nom français : **Bolet bai**
Habitat : Sous conifères et feuillus.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau bai à marron, de couleur uniforme.
Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Leccinum scabrum (Bull.) Gray 2151

Syn. : **Boletus scaber**

Nom français : **Bolet rude**
Habitat : Sous bouleaux.
Odeur : Agréable.

Chapeau brun fauve, finement feutré.
Stipe élancé, orné de fines squamules bistres.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn 2601

Syn. : **Boletus erythropus**

Nom français : **Bolet à pied rouge**
Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne.
Odeur : +/- fruitée.

Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté.
Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Suillaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Suillus grevillei (Klotzch) Singer 3420

Syn. : **Suillus elegans - Boletus elegans - Boletus grevillei**

Nom français : **Bolet de Greville (Bolet élégant)**
Habitat : Sous mélèzes, de la plaine à la montagne.
Odeur : Agréable, fruitée.

Chapeau jaune d'or ou jaune orangé, visqueux.
Voile partiel cortiniforme, visqueux - Pores étroits.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara

3632

Syn. : **Boletus chrysenteron - Xerocomus chrysenteron**

Nom français : **Bolet à chair jaune**
Habitat : Sous feuillus et résineux.
Odeur : De scléroderme.

Chapeau brun clair, rougeâtre dans les blessures.
Pores amples, anguleux - Stipe rayé de rouge carminé.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Xerocomellus pruinatus (Fr.) Šutara

3635

Syn. : **Xerocomus pruinatus**
Boletus pruinatus

Nom français : **Bolet pruineux**
Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres.
Odeur : Agréable.

Chapeau bai foncé, charnu, velouté, pruineux.
Saveur acidulée - Pores grands et anguleux.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Hygrophoropsidaceae

Comestibilité Comestible

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire

1728

Syn. :

Nom français : **Fausse chanterelle**
Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore
Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Hygrophoropsidaceae

Comestibilité A rejeter

Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen

1170

Syn. :

Nom français :
Habitat : Sur le bois enterré de conifères, (épicéas et pins). Rare.
Odeur : Odeur pénétrante semblable à l'ozone.

Chapeau brun-orangé, mat, velouté - Stipe orange.
Lames décurrentes, serrées, fourchues, orange.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Paxillaceae

Comestibilité Mortel

Paxillus involutus (Batsch) Fr.

2685

Syn. :

Nom français : **Paxille enroulé**
Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs.
Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau roux ochracé, à marge involutée.
Lames très serrées, étroites, facilement détachables.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité A rejeter

Lycoperdon molle Pers.

2342

Syn. :

Nom français : **Vesse de loup molle**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Fructifications globuleuses à piriformes, café au lait. Aiguillons courts, mous - Gléba brun chocolat.

21 octobre 2026 - Chartreuse de Prémol

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Lycoperdon perlatum Pers.

2345

Syn. : **Lycoperdon gemmatum**

Nom français : **Vesse de loup perlée**
Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles.
Odeur : Non caractéristique.

Frucifications blanches recouvertes d'aiguillons.
Gléba blanche puis olive - Stipe conique.