

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
 Clas. **Leotiomycetes**
 Ord.. **Helotiales**
 Fam. **Chlorociboriaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Ramamurthi et al.

352

Syn. : **Chlorosplenium aeruginascens**

Nom français : **Pézize turquoise**

Habitat : Sur bois décortiqué de feuillus.

Odeur : Non caractéristique.

En forme de disque de 2-7 mm, entièrement bleu-vert.

Stipe court - Chair mince - Spores de 5-7 x 1-2 µ.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
 Clas. **Sordariomycetes**
 Ord.. **Hypocreales**
 Fam. **Hypocreaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul.

1816

Syn. : **Apiocrea chrysosperma - Sepedonium chrysospermum**

Nom français : **Hypomyces jaune**

Habitat : Surtout sur Boletales (Xerocomus et Leccinum).

Odeur : Nulle.

Fructification ocre jaunâtre, étalée sur le champignon parasité.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
 Clas. **Pezizomycetes**
 Ord.. **Pezizales**
 Fam. **Discinaceae**



Comestibilité **Mortel**


Paragyromitra infula (Schaeff.) X.C. Wang & W.Y. Zhuang

1525

Syn. : **Gyromitra infula - Physomitra infula**

Nom français : **Gyromitre en turban**

Habitat : En montagne, sur bois dégradé, en automne.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau cannelle, mitriforme, formé de 2 à 4 lobes.

Stipe très irrégulier, creux, à chair cassante.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
 Clas. **Incertae sedis**
 Ord.. **Incertae sedis**
 Fam. **Incertae sedis**



Comestibilité **A rejeter**


Phragmotrichum chailletii Kunze

3706

Syn. : **Gymnosporangium chailletii**

Nom français : **Phragmotrichum de Chaillet**

Habitat : Sur cônes d'épicéas.

Odeur : Odeur non détectable.

Minuscule champignon brun foncé, inféodé aux cônes d'épicéas -

Erumpant - Fréquent toute l'année.

09 - Les ascomycètes

Div. **Ascomycota**
 Clas. **Leotiomycetes**
 Ord.. **Rhytismatales**
 Fam. **Rhytismataceae**



Comestibilité **A rejeter**


Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

3025

Syn. :

Nom français : **Parasite des feuilles d'érables**

Habitat : Sur les feuilles vivantes d'érables, au printemps.

Odeur : Nulle.

Stroma en forme de tache arrondie et noire - Surface ridée-cérébriforme

- Spores filiformes guttulées.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Dacrymycetes**
 Ord.. **Dacrymycetales**
 Fam. **Dacrymycetaceae**



Comestibilité **Toxique**


Calocera viscosa Pers.

301

Syn. :

Nom français : **Calocère visqueuse**

Habitat : Sur souches pourrissantes de conifères.

Odeur : Inodore.

En forme de buisson, visqueux, jaune à jaune orangé.

Chair jaune, coriace et élastique - Saveur douce.

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Auriculariales**
 Fam. **Exidiaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.

2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**

Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.

Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Albatrellaceae**

Comestibilité **Comestible**



Albatrellus citrinus Ryman

70

Syn. :

Nom français : **Polypore citrin**

Habitat : Sous conifères en montagne.

Odeur : Non caractéristique.

Espèce à chair tendre, chapeau blanchâtre au début puis jaune citrin.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Meruliaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.

249

Syn. : **Leptoporus adustus**

Nom français : **Tramète brûlée**

Habitat : Sur bois morts de feuillus, surtout de Fagus (hêtre).

Odeur : Odeur fongique, acidulée.

Chapeaux en éventail, brunâtres - Pores gris cendré.
 Tubes séparés de la chair blanche par une ligne noire.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva

2174

Syn. : **Lenzites warnieri - Trametes warnieri**

Nom français : **Lenzite baleine**

Habitat : Sous feuillus (surtout peupliers et trembles).

Odeur : Inodore.

Fructifications sessiles à dimidiées.
 Lames safranées, épaisses, jaune safran.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Cerioporus leptocephalus (Jacq.) Zmitr. & Kovalenko

332

Syn. : **Melanopus varius - Polyporus leptocephalus**
Polyporus varius - Cerioporus varius

Nom français : **Polypore variable**

Habitat : Sur bois mort de feuillus (surtout sur hêtres).

Odeur : Nulle.

Chapeau +/- réniforme, lisse, ocre-jaune, mince.
 Pores petits, arrondis - Stipe excentré, à base noirâtre.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar

395

Syn. : **Spongipellis borealis**

Nom français : **Polypore boréal**

Habitat : Souches d'épicéas ou de sapins.

Odeur : Agréable, suave.

Chapeau épais, dimidié, spongieux, blanc puis ocre.
 Pores dédaléens - Trame à 2 couches - Pas de stipe.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden

544

Syn. : **Funalia gallica - Trametes gallica**

Nom français : **Tramète des Gaules**

Habitat : Bois mort ou vivant de feuillus (frênes, peupliers ...).

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau dimidié, hispide, strigieux-feutré.

Trame subéreuse, noircissant avec KOH - Pores bruns

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Daedalea quercina (L.) Pers.

1165

Syn. : **Lenzites quercinus**

Nom français : **Lenzite du chêne**

Habitat : Sur bois mort de chênes et de châtaigniers.

Odeur : Agréable.

Fructifications lamellées, en forme de console.

Lamelles labyrinthées, de couleur beige.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Daedaleopsis confragosa (Bolt.) J. Schröt.

1166

Syn. : **Trametes rubescens**

Nom français : **Tramète rougissante**

Habitat : Sur bois mort de feuillus.

Odeur : Inodore.

Fructifications dimidiées ou flabelliformes.

Hyménium constitué de pores dédaléens.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer

1167

Syn. : **Daedaleopsis confragosa var. tricolor**
Lenzites tricolor

Nom français : **Tramète tricolore**

Habitat : Sur bois mort de feuillus (souvent merisiers).

Odeur : Inodore.

Carpophores plats, minces, zonés.

Hyménium constitué de lames serrées.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. et al.

2814

Syn. : **Piptoporus betulinus - Polyporus betulinus**

Nom français : **Polypore du bouleau**

Habitat : Sur bois mort de bouleau.

Odeur : Agréable, acidulée.

Chapeau arrondi, pulviné, gris-beige alutacé.

Hyménium finement poré, blanchâtre - Stipe absent.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst.

1395

Syn. : **Ungulina marginata**

Nom français : **Polypore marginé**

Habitat : Saprophyte des conifères, parfois des feuillus.

Odeur : Acide, forte, évoquant l'odeur des poulaillers.

Fructifications dimidiées à surface brun-rouge.

L'un des polypores les plus communs.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Ganodermataceae**


Comestibilité **A rejeter**

Ganoderma applanatum (Schaeff.) With.

1425

Syn. : **Ganoderma lipsiense**

Nom français : **Ganoderme plat**

Habitat : Sur bois mort de feuillus.

Odeur : Fongique, agréable.

Chapeau poudré de brun par les spores.

Hyménium poré, souvent parsemé de galles.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Ganodermataceae**


Comestibilité **A rejeter**

Ganoderma carnosum Pat.

1426

Syn. :

Nom français : **Ganoderme charnu**

Habitat : En montagne, sur souches de conifères.

Odeur : Agréable de polypore.

Chapeau de couleur brun-rouge ou acajou.

Stipe bosselé, sinueux, vernissé - Pores arrondis.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gloeophyllales**
 Fam. **Gloeophyllaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

1457

Syn. : **Trametes odorata**

Nom français : **Tramète odorante**

Habitat : Sur bois mort d'épicéas, surtout en montagne.

Odeur : Forte d'anis, de vanille ou de pain d'épices.

Chapeau jaune orangé noduleux, feutré.

Trame noircissant en présence de NH3.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gloeophyllales**
 Fam. **Gloeophyllaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.

1458

Syn. : **Gloeophyllum saepiarium**

Nom français : **Lenzite des clôtures**

Habitat : Sur bois mort de conifères exposé à l'air.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications sessiles de couleur brun-rouge.

Surface strigieuse ou feutrée, zonée.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Fomitopsidaceae**


Comestibilité **Comestible**

Laetiporus sulphureus Bull.

2129

Syn. : **Polyporus sulphureus**

Nom français : **Polypore soufré**

Habitat : Sur feuillus et arbres fruitiers.

Odeur : Non caractéristique.

Fructifications sessiles, entièrement jaunes.

Chapeaux multiples, imbriqués et confluent.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Lenzites betulina (L.) Fr.

2173

Syn. : **Trametes betulina**

Nom français : **Lenzite du bouleau**

Habitat : Sur bois mort de feuillus (surtout bouleaux).

Odeur : Inodore.

Fructifications sessiles - Chapeau tomenteux, zoné.

Hyménium lamellé, à lames peu serrées, fourchues.

11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Meripilaceae  Comestibilité Comestible		Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst 2446 Syn. : Polyporus giganteus Nom français : Polypore géant Habitat : Saprophyte et parasite des feuillus (surtout hêtres). Odeur : Forte. Houblon, purée de pommes de terre. Grande espèce à chapeaux imbriqués et étagés. Pores petits, arrondis, noircissants au froissement.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Laetiporaceae  Comestibilité A rejeter		Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 2734 Syn. : Polyporus Schweinitzii - Hapalopilus schweinitzii Nom français : Polypore des teinturiers Habitat : Saprophyte sur souches et racines de conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeaux souvent concrescents et stipe subnul. Pores alvéolés, composés ou lacérés, jaune olivâtre.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae  Comestibilité A rejeter		Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko 2812 Syn. : Polyporus durus - Polyporus badius Polyporus picipes Nom français : Polypore bai Habitat : En touffes parfois concrescentes, sur bois mort. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau luisant et gras, brun-rouge sombre, glabre. Pores minuscules, arrondis, fermés, simples, blancs.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Polyporales Fam. Polyporaceae  Comestibilité A rejeter		Pycnoporus cinnabarina (Jacq.) Fr. 2961 Syn. : Trametes cinnabarina - Polyporus cinnabarinus Nom français : Tramète rouge cinabre Habitat : Sur bois mort de feuillus, rarement sur conifères. Odeur : Non remarquable. Fructifications sessiles, orange à rouge orangées. Pores petits, arrondis-anguleux, rouge orangé.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Schizophyllaceae  Comestibilité Toxique		Schizophyllum commune Fr. 3322 Syn. : Nom français : Schizophylle commun Habitat : En colonies sur bois mort de feuillus et de conifères. Odeur : Douce, un peu acidulée. Chapeau conchoïde, sillonné, gris blanchâtre, feutré. Lames fixées à partir d'un point d'insertion, fissiles.
11 - Croûtes et polypores Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Stereaceae  Comestibilité A rejeter		Stereum gausapatum (Fr.) Fr. 3375 Syn. : Haematostereum gausapatum Nom français : Stérée à chapeau pelucheux Habitat : Surtout sur bois mort de chênes, cortiqué ou non. Odeur : Non caractéristique. Fructifications résupinées à étalées-réfléchies. Hyménium gris-brun, rougissant à la blessure.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Stereaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Stereum hirsutum (Wild.) Gray

3376

Syn. :

Nom français : **Stérée hirsute**

Habitat : En colonies, sur bois mort de feuillus.

Odeur : Nulle.

Fructifications résupinées à étalées-réfléchies.

Surface fertile hirsute - Hyménium lisse, brun-orange.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Trametes pubescens (Schumach.) Pilát

3454

Syn. : **Coriolus pubescens - Trametes velutina**

Nom français : **Tramète pubescente**

Habitat : Sur bois mort de feuillus (hêtres, bouleaux ...).

Odeur : Nulle.

Chapeau velouté, délicatement zoné, ocre-jaune.

Pores arrondis, jaune ochracé - Trame aérifère.

11 - Croûtes et polypores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Trametes versicolor (L.) Lloyd

3457

Syn. : **Coriolus versicolor**

Nom français : **Tramète versicolore**

Habitat : Sur bois peu dégradé, surtout de feuillus.

Odeur : Nulle.

Trame très mince - Pores fins et étroits, arrondis.

Chapeaux multiples, concrescents, zonés, veloutés.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Amylostereaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Artomyces pyxidatus (Pers. ex Fr.) Jülich

219

Syn. : **Clavaria pyxidata**

Nom français : **Clavaire en chandeliers**

Habitat : Sur bois pourrissant de feuillus.

Odeur : Insignifiante.

Sous forme de buissons ramifiés assez charnus.

Rameaux terminés par une petite coupe ornée de pics.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Cantharellales**
 Fam. **Hydnaceae**



Comestibilité **Comestible**


Cantharellus cibarius Fr.

320

Syn. :

Nom français : **Chanterelle ou girolle**

Habitat : Surtout sous feuillus, en terrain non calcaire.

Odeur : Forte et agréable, fruitée, d'abricot.

Chapeau jaune vif uniforme - Chair blanche ou jaune.

Plis décurrents, fourchus, jaune orangé.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Cantharellales**
 Fam. **Hydnaceae**



Comestibilité **Comestible**


Craterellus tubaeformis Bull.

1080

Syn. : **Cantharellus tubaeformis**

Nom français : **Chanterelle en tube**

Habitat : Surtout sous conifères, dans les mousses humides.

Odeur : Agréable, fruitée.

Chapeau en entonnoir, brun gris à brun ochracé.

Plis bien formés, fourchus, gris-brun - Stipe brun-jaune.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Gomphales**
 Fam. **Gomphaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Ramaria stricta (Pers.) Quél.

2980

Syn. : **Clavaria stricta - Ramaria condensata**

Nom français : **Clavaire droite**

Habitat : Sur bois mort de feuillus, surtout sur hêtres.

Odeur : Acidulée, légèrement anisée.

Espèce lignicole, à rameaux étroitement parallèles.
 Couleur cannelle - Présence de longs rhizomorphes.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Thelephorales**
 Fam. **Bankeraceae**



Comestibilité **Comestible**



Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.

3305

Syn. : **Hydnum imbricatum**

Nom français : **Hydne imbriqué**

Habitat : Sous conifères de montagne, surtout sous épicéas.

Odeur : Légèrement épicée.

Grande espèce à chapeau grossièrement écailleux.
 Hyménium constitué d'aiguillons subulés et fragiles.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Hygrophoraceae**



Comestibilité **A rejeter**



Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.

1732

Syn. :

Nom français : **Hygrophore à odeur agréable**

Habitat : Dans les pessières, sur sols calcaires.

Odeur : D'amandes amères.

Chapeau gris-beige, obtusément mamelonné.
 Pied blanchâtre ou gris, granuleux au sommet.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Hygrophoraceae**



Comestibilité **A rejeter**



Hygrophorus discoideus (Pers.) Fr.

1744

Syn. :

Nom français : **Hygrophore à disque brun**

Habitat : Dans les pessières, sur sols calcaires.

Odeur : Faible, un peu herbacée.

Chapeau beige ocre, à centre châtain rougeâtre.
 Stipe fusiforme-atténué, brunâtre pâle.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Auriscalpiaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Lentinellus micheneri (Berk. & M.A. Curtis) Pegler

2164

Syn. : **Lentinellus bisus - Lentinus micheneri**
Lentinus bisus

Nom français : **Lentin en forme d'omphale**

Habitat : Sur bois mort ou souches de feuillus ou de conifères.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau creusé au centre, hygrophane, beige à brun.
 Lames décurrentes, à arête dentelée - Chair coriace.

13 - Pleurotes et hygrophores

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Polyporales**
 Fam. **Polyporaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Panus conchatus (Bull.) Fr.

2666

Syn. : **Lentinus conchatus - Lentinus torulosus**

Nom français : **Panus en éventail**

Habitat : Sur souches de divers feuillus, souvent en touffes.

Odeur : Faible puis désagréable.

Chapeau mauve à lilas puis décoloré en beige ochracé.
 Stipe velouté, crème ochracé - Chair blanche, coriace.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Physalaciaceae**



Comestibilité **Toxique**


Armillaria lutea Gillet

187

Syn. : **Armillaria bulbosa - Armillaria gallica**

Nom français : **Armillaire à anneau jaune**

Habitat : Espèce isolée ou en groupes, sur feuillus et conifères.

Odeur : Faible à +/- désagréable.

Chapeau brun-ocre - Stipe bulbeux à base +/- jaune vif.

Anneau bordé de jaune - Lames un peu décurrentes.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Physalaciaceae**



Comestibilité **Toxique**


Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink

189

Syn. : **Armillariella ostoyae**

Nom français : **Armillaire d'Ostoya**

Habitat : Souvent sur souches et racines d'épicéas.

Odeur : Faible, de polypore.

Chapeau brun-roux, couvert de mèches brun noirâtre.

Anneau membraneux - Lames un peu décurrentes.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Tricholomataceae**



Comestibilité **Toxique**


Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.

421

Syn. : **Lepista nebularis**

Nom français : **Clitocybe nébuleux**

Habitat : En lisière des bois, souvent en ronds de sorcières.

Odeur : Farino-spermatique, plutôt désagréable.

Chapeau gris pruneux - Lames adnées-décurrentes.

Stipe en massue, grisâtre pâle - Chair épaisse, grise.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Tricholomataceae**



Comestibilité **Comestible**


Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja

1835

Syn. : **Clitocybe gibba**

Nom français : **Clitocybe bossu**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Cyanique.

Chapeau en entonnoir, beige à beige ochracé.

Lames très décurrentes, crème - Stipe blanchâtre.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Incertae sedis**



Comestibilité **Toxique**


Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini et al.

2300

Syn. : **Clitocybe connata - Lyophyllum connatum**

Nom français : **Clitocybe en touffes**

Habitat : Au bord des chemins, en troupes et fasciculés.

Odeur : Herbacée, de petits pois ou de haricots.

Chapeau blanc pur ou glacé, soyeux, marbré de gris.

Chair blanche, cartilagineuse - Pieds blancs, connés.

14 - Les clitocybes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Tricholomataceae**



Comestibilité **A rejeter**


Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer

2934

Syn. : **Clitocybe cyathiformis - Omphalia cyathiformis**

Nom français : **Clitocybe en coupe**

Habitat : Dans les endroits herbeux, en bordure des chemins.

Odeur : Cyanique.

Chapeau en entonnoir, hygrophane, marron à gris.

Lames décurrentes, falciformes, pentues, brun clair.

14 - Les clitocybes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité A rejeter		Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer 2943 Syn. : Pseudoomphalina compressipes sensu auct. Omphalia kalchbrenneri - Clitocybe kalchbrenneri Nom français : Clitocybe à pied comprimé Habitat : Sous conifères et dans les prairies, sur sol calcaire. Odeur : Fortement farineuse. Chapeau de 1-3 cm, givré au début puis brun-roux. Stipe concolore, givré, souvent comprimé latéralement.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité A rejeter		Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. 3500 Syn. : Tricholoma impolitum Nom français : Tricholome columbette Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres, en terrain acide. Odeur : Faible. Chapeau blanc pur, satiné - Chair ferme, blanche. Stipe robuste, blanc, taché de bleu-vert à la base.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité A rejeter		Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 3544 Syn. : Tricholoma boudieri Nom français : Tricholome à odeur de savon Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne. Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide. Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante. Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité A rejeter		Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. 3568 Syn. : Nom français : Tricholome couleur de vache Habitat : Surtout sous conifères, parfois sous feuillus (saules). Odeur : Peu agréable, herbacée, un peu farineuse. Chapeau brun fauve, squamuleux, à marge laineuse. Saveur un peu amère - Stipe blanc à fibrilleux de roux.
15 - Les tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Incertae sedis  Comestibilité A rejeter		Tricholomopsis decora (Fr.) Singer 3573 Syn. : Tricholoma decorum Nom français : Tricholome décoré Habitat : Sur bois pourri de conifère, surtout en montagne. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau jaune d'or, orné de squamules brun olivacé. Stipe moucheté de brun bistre - Lames jaune d'or.
16 - Les autres tricholomes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Tricholomataceae  Comestibilité A rejeter		Dermoloma cuneifolium (Fr.) Fr. 1190 Syn. : Dermoloma atrocinerum - Tricholoma cuneifolium Nom français : Tricholome à lames triangulaires Habitat : Dans l'herbe des pelouses et des prairies. Odeur : Farineuse. Chapeau gris-brun, vite craquelé - Saveur farineuse. Lames très échancrées - Stipe pruneux, blanchâtre.

16 - Les autres tricholomes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Tricholomataceae**



Comestibilité **A rejeter**



Paralepista gilva (Pers.) Raithelh.

2670

Syn. : **Lepista gilva - Clitocybe gilva**

Nom français : **Clitocybe jaunâtre**

Habitat : Sous feuillus, dans les buissons, les taillis.

Odeur : Faible, plutôt agréable.

Chapeau jaunâtre, taché de brun rougeâtre ou guttulé.

Lames serrées, séparables, crème ochracé, arquées.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Marasmiaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Baeospora myosura (Fr.) Singer

240

Syn. : **Collybia conigena**

Nom français : **Collybie queue de souris**

Habitat : Sur cônes de pins et d'épicéas.

Odeur : Insignifiante.

Chapeau brun à beige - Lames très serrées, blanches.

Stipe couvert d'une pruine blanche sur fond brunâtre.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Omphalotaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen

1495

Syn. : **Collybia confluens - Marasmius confluens**
Gymnopus confuens

Nom français : **Collybie en touffe**

Habitat : En rond de sorcière, ubiquiste.

Odeur : Légèrement cyanique.

Chapeau beige mastic à brun pâle, hygrophane.

Lames très serrées, étroites et pied pruneux.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Omphalotaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Collybiopsis quercophila (Pouzar) R.H. Petersen

1519

Syn. : **Setulipes quercophilus - Marasmius splachnoides**
Marasmius quercophilus - Gymnopus quercophilus

Nom français : **Collybie des feuilles de chênes**

Habitat : Surtout sur feuilles de chênes.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau de 0,2 à 1 cm, irrégulier, crème roussâtre.

Stipe en forme de crin, brun roussâtre, velouté.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Omphalotaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Gymnopus androsaceus (L.) della Magg. & Trassin.

1492

Syn. : **Marasmius androsaceus - Setulipes androsaceus**

Nom français : **Marasme androsace**

Habitat : Sous conifères, sur litières d'aiguilles.

Odeur : Inodore.

Espèces minuscules à chapeau brun carné.

Stipe filiforme, noirâtre, en crin de cheval.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Omphalotaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill

1496

Syn. : **Collybia dryophila - Marasmius dryophilus**

Nom français : **Collybie des chênes**

Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères.

Odeur : Faible ou légèrement herbacée.

Chapeau lisse, glabre, brun-jaune, pâissant.

Stipe ochracé pâle, orné de rhizoïdes à la base.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Omphalotaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk

1501

Syn. : **Micromphale foetidum - Marasmius foetidus**

Nom français : **Marasme fétide**

Habitat : Sur branche ou tronc mort de feuillus.

Odeur : Forte de chou pourri ou d'eau croupie.

Chapeau de 2-4 cm, entièrement strié, brun roussâtre.

Stipe greffé sur le bois, brun rougeâtre à noirâtre.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Physalaciaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Hymenopellis radicata (Rehlan) R.H. Petersen

1787

Syn. : **Collybia radicata - Mucidula radicata**
Oudemansiella radicata - Xerula radicata

Nom français : **Collybie radicante**

Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres, parfois sur racines.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau visqueux, veiné-ridé, brun foncé à beige.

Lames blanches - Pied prolongé par une longue racine.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Marasmiaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke & Qué.

2404

Syn. :

Nom français : **Marasme à pied corné**

Habitat : Sur feuilles ou branches tombées.

Odeur : Nulle.

Stipe luisant, brun-rouge foncé à la base, corné, dur.

Lames ornées de spinules pointues (microscope).

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Marasmiaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Marasmius rotula Fr.

2414

Syn. :

Nom français : **Marasme petite roue**

Habitat : Greffé sur rameaux et branchettes de feuillus au sol.

Odeur : Insignifiante.

Chapeau blanchâtre, cannelé en forme de parachute.

Lames espacées, rattachées au stipe à un collarium.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Physalaciaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Mucidula mucida (Schrad.) Pat.

2458

Syn. : **Oudemansiella mucida - Collybia mucida**

Nom français : **Collybie visqueuse**

Habitat : Sur bois mort de hêtres.

Odeur : Faible, un peu herbacée.

Chapeau couvert d'une pellicule gélatineuse séparable. Lames espacées, blanches - Présence d'un anneau.

17 - Collybies et marasmes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Omphalotaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle

2587

Syn. : **Marasmius alliaceus**

Nom français : **Marasme à odeur d'ail**

Habitat : Sur branches tombées ou débris ligneux de hêtres.

Odeur : Pénétrente d'ail.

Chapeau ocre-beige ou crème blanchâtre.

Stipe élancé, rigide, noirâtre, pruneux au sommet.

17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae  Comestibilité A rejeter		Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira 1515 Syn. : Micromphale perforans - Marasmiellus perforans Gymnopus perforans Nom français : Marasme perforant Habitat : Sur des aiguilles de conifères, surtout d'épicéas. Odeur : De chou pourri ou d'eau croupie. Chapeau de 0,5 -1,5 cm, beige rosâtre, strié-ridé. Lames crème, espacées - Stipe velouté, vite noirâtre.
17 - Collybies et marasmes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Omphalotaceae  Comestibilité A rejeter		Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox 3001 Syn. : Collybia butyracea Nom français : Collybie beurrée Habitat : Sous feuillus et conifères, sur sols pauvres. Odeur : Agréable, épicée. Chapeau brun-rouge, hygrophane, gras au toucher. Stipe clavé, farci ou creux, concolore, fibrilleux, sec.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  Comestibilité A rejeter		Mycena diosma Krieglsteiner et Schwöbel 2490 Syn. : Prunulus diosmus Nom français : Mycène à deux odeurs Habitat : Dans les forêts de hêtres sur sol calcaire. Odeur : De radis mêlée à celle du tabac froid. Chapeau hygrophane, violet à brun-violet par l'humidité puis beige en séchant - Lames lilas pâle.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  Comestibilité A rejeter		Mycena galericulata (Scop.) Gray 2505 Syn. : Nom français : Mycène en casque Habitat : Sur souches et branches de feuillus ou de conifères. Odeur : Faible, farineuse (saveur très farineuse). Stipe tenace, souvent comprimé, hirsute à la base. Lames souvent rose pâle, fortement interveinées.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  Comestibilité Toxique		Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 2546 Syn. : Prunulus purus Nom français : Mycène pur Habitat : Sous feuillus et conifères, sur divers types de sols. Odeur : Raphanoïde. Chapeau violet lilas à violet rose, hygrophane. Pied creux, cassant, blanchâtre à gris-violet ou rose.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  Comestibilité A rejeter		Mycena romagnesiana Maas Geest. 2557 Syn. : Mycena rugulosiceps sensu Romagnesi Mycena orophila Nom français : Mycène de Romagnesi Habitat : En montagne, sur bois de hêtres en décomposition. Odeur : Nulle, non farineuse. Chapeau brun-gris à gris ochracé, hygrophane. Lames grisâtres à reflets roses - Stipe concolore.

18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  Comestibilité A rejeter		Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. 2560 Syn. : Mycena roseola Nom français : Mycène rosâtre Habitat : En troupe, sur tapis d'aiguilles, sous pins et épicéas. Odeur : Insignifiante. Chapeau fragile, strié-cannelé, rose tendre. Stipe blanc à reflets roses, orné de rhizoïdes.
18 - Les mycènes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Mycenaceae  Comestibilité A rejeter		Mycena zephirus (Fr.) P. Kumm. 2583 Syn. : Nom français : Mycène élégant Habitat : Plutôt montagnard, parmi les aiguilles de conifères. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brunâtre, se tachant de brun roussâtre. Stipe fragile, +/- teinté de rougeâtre, hérissé à la base.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Toxique		Lepiota kuehneri Huijsman ex Hora 2205 Syn. : Nom français : Lépiote de Kühner Habitat : Dans les taillis, les parcs, les sentiers, sous conifères. Odeur : Faible ou nulle. Chapeau brun rosé vif à briqueté, velouté. Stipe blanchâtre, chiné à la base - Lames crème.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Toxique		Lepiota magnispora Murrill 2210 Syn. : Lepiota ventriosospora Lepiota ventriosospora var. fulva Nom français : Lépiote à voile jaune Habitat : Uniquement sous conifères (pins, épicéas). Odeur : Douce, non caractéristique. Chapeau couvert d'écailles fauve orangé. Stipe guirlandé par un voile floconneux jaune.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible		Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser 2271 Syn. : Lepiota pudica - Lepiota naucina Lepiota holosericea - Leucoagaricus holosericeus Nom français : Lépiote pudique Habitat : Dans les jardins, les parcs, les pelouses. Odeur : Faible, fongique. Chapeau soyeux à feutré, blanc puis crème. Stipe blanc pur, soyeux, orné d'un anneau coulissant.
19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible		Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bellu & Lanzoni 2388 Syn. : Macrolepiota procera f. fuliginosa Lepiota procera var. fuliginosa Nom français : Lépiote fuligineuse Habitat : Dans les forêts claires, lisières et prairies. Odeur : Odeur non caractéristique. Chapeau de 15-20 cm, couvert de squames sombres. Stipe chiné sous l'anneau, rougissant au froissement.

19 - Les lépiotes Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Agaricaceae  Comestibilité Comestible	 <i>Macrolepiota procera</i> Charles Rouhier	Macrolepiota procera (Scop.) Singer 2387 Syn. : Lepiota procera Nom français : Lépiote élevée (Coulemelle) Habitat : Dans les prés, les lisières ou clairières gramineuses. Odeur : Faible, fongique. Reconnaisable à sa grande taille, à son chapeau squameux, à son stipe chiné, à son anneau coulissant.
21 - Coprins et psathyrelles Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Coprinaceae  Comestibilité Comestible		Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 539 Syn. : Nom français : Coprin chevelu Habitat : Dans les lieux herbeux, les jardins, les décombres. Odeur : Faible ou nulle, non caractéristique. Chapeau cylindracé, blanc, orné de mèches blanches. Stipe doté d'un anneau fragile, mobile - Chair blanche.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae Comestibilité Comestible	 <i>Amanita battarrae</i> Charles Rouhier	Amanita battarrae (Boud.) Bon 98 Syn. : Nom français : Amanite de Battarra Habitat : Sous feuillus (chênes, châtaigniers, tilleuls ...). Odeur : Non caractéristique. Cloisons des hyphes du sommet du stipe non amyloïdes (kk négatif).
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilité A rejeter	 <i>Amanita citrina</i> Charles Rouhier	Amanita citrina (Schaeff.) Pers. 103 Syn. : Nom français : Amanite citrine Habitat : Sous feuillus et conifères. Odeur : Raphanoïde. Chapeau jaune citrin - Stipe orné d'un bulbe globuleux. Volve membraneuse circonscise - Saveur douce.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilité Toxique	 <i>Amanita echinocephala</i> Charles Rouhier	Amanita echinocephala (Vittad.) Qué. 113 Syn. : Amanita solitaria Nom français : Amanite épineuse Habitat : Sous feuillus et conifères, en terrain calcaire. Odeur : Odeur non caractéristique. Espèce thermophile - Anneau ample et pendant. Chapeau couvert de verrues pyramidales aiguës.
22 - Les amanites Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Agaricales Fam. Amanitaceae  Comestibilité Toxique	 <i>Amanita muscaria</i> Charles Rouhier	Amanita muscaria (L.) Lam. 130 Syn. : Nom français : Amanite tue-mouches Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide. Odeur : Non caractéristique. Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs. Anneau membraneux, juponnnant - Lames blanches.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Amanita ovoidea (Bull.) Link

138

Syn. :

Nom français : **Amanite ovoïde**

Habitat : Prés-bois, en bordure des chemins, des routes.

Odeur : Désagréable après la cueillette.

Grande espèce blanche, à volve membraneuse.

Marge du chapeau appendiculée - Anneau crémeux.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Amanita porphyria Alb. & Schw.

144

Syn. :

Nom français : **Amanite porphyre**

Habitat : Surtout sous conifères de montagne, sur sols acides.

Odeur : Raphanoïde.

Chapeau porphyre - Bulbe hémisphérique, marginé.

Anneau blanchâtre, vite violacé - Saveur douce.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **Comestible**



Amanita rubescens (Pers.) Gray

152

Syn. :

Nom français : **Amanite rougissante (Golmotte)**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Non caractéristique.

Rougisement de la chair - Anneau ample et strié. Volve friable - Stipe napiforme.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Amanita strobiliformis (Vittad.) Bertill.

159

Syn. : **Amanita solitaria sensu auct. europ. plur.**

Nom français : **Amanite pomme de pin**

Habitat : Sous feuillus, dans les parcs et les jardins.

Odeur : Faible, agréable.

Chapeau gris blanchâtre, orné de lambeaux de voile.

Anneau fragile et crémeux.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Amanita submembranacea (Bon) Gröger

160

Syn. : **Amanitopsis submembranacea**

Nom français : **Amanite à volve grise**

Habitat : Sous conifères de montagne, en terrain acide.

Odeur : Non caractéristique.

Espèce robuste à chapeau brun-jaune nuancé d'olive.

Volve semi-membraneuse, de couleur grise.

22 - Les amanites

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Amanitaceae**



Comestibilité **Comestible**



Amanita vaginata (Bull.) Lam.

162

Syn. :

Nom français : **Amanite vaginée**

Habitat : Ubiquiste, sans liaison avec des essences précises.

Odeur : Inodore.

Stipe sans anneau - Chapeau grisâtre, mamelonné.

Volve membraneuse, très engainante - Spores rondes.

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Entolomataceae**


Comestibilité **Comestible**

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kummer

450

Syn. :

Nom français : **Meunier**

Habitat : Sous feuillus et résineux, dans les clairières.

Odeur : Fortement farineuse.

Chapeau de forme variable, blanchâtre, cassant.

Lames très décurrentes, blanches puis roses.

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Pluteaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner

2872

Syn. : **Pluteus tricuspidatus - Pluteus nigrofloccosus**
Pluteus cervinus var. atromarginatus

Nom français : **Plutée à lames bordées de noir**

Habitat : Sur souches ou troncs couchés de conifères.

Odeur : Faible, non franchement raphanoïde.

Chapeau mamelonné, brun, squamuleux au disque.

Arête des lames floconneuse, ponctuée de brun-noir.

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Pluteaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.

2838

Syn. : **Pluteus brunneoradiatus - Pluteus atricapillus**

Nom français : **Plutée couleur de cerf**

Habitat : Sur souches et bois mort de feuillus et de conifères.

Odeur : Nettement raphanoïde.

Chapeau gris brunâtre, sans nuances olivâtres.

Lames à arête concolore - Hyphes non bouclées.

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Pluteaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Pluteus pouzarianus Singer

2863

Syn. :

Nom français : **Plutée de Pouzar**

Habitat : Sur souches ou débris de bois de conifères.

Odeur : Légèrement raphanoïde.

Chapeau brun-noir, gris métallisé en séchant, lisse.

Stipe crème, fibrilleux de gris-noir ou de brun, plein.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Cortinariaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Calonarius saporatus (Britzelm.) Niskanen & Liimat.

1003

Syn. : **Cortinarius subturbinatus - Cortinarius saporatus**

Nom français : **Proche de Cortinarius turbinatus**

Habitat : Sous charmes, chênes, châtaigniers, sur sol calcaire.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau visqueux, jaune roussâtre +/- moucheté.

Stipe blanc muni d'un gros bulbe en forme de toupie.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Cortinariaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Cortinarius anomalus (Fr.) Fr.

567

Syn. : **Cortinarius azureus**

Nom français : **Cortinaire irrégulier**

Habitat : Ubiquiste, en plaine et en montagne, en terrain humide.

Odeur : Faible, un peu camphrée ou herbacée.

Chapeau brun-jaune, sec - Lames lilacines au début.

Stipe renflé à la base et zoné d'ocre - Voile blanchâtre.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Cortinariaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Cortinarius cagei Melot

622

Syn. : **Cortinarius bicolor**

Nom français : **Cortinaire bicolore**

Habitat : En montagne, sous feuillus, sur sol calcaire.

Odeur : Raphanoïde.

Chapeau hygrophane, brun-rouge à crème ochracé.

Lames brun châtain - Stipe appointi, entièrement violet.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Cortinariaceae**



Comestibilité **Comestible**


Cortinarius caperatus Pers.

632

Syn. : **Rozites caperata**

Nom français : **Pholiote ridée**

Habitat : Sous conifères et feuillus, dans les myrtilliers.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau ochracé pâle, givré de blanc grisâtre.

Stipe orné d'un anneau membraneux blanchâtre.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Cortinariaceae**



Comestibilité **Mortel**


Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray

953

Syn. : **Cortinarius puniceus**

Nom français : **Cortinaire sanguin**

Habitat : Dans les sapinières et pessières humides.

Odeur : Raphanoïde ou de bois de cèdre.

Coloration entièrement rouge sang - Mycélium orangé.

Silhouette élancée - Chapeau finement squamuleux.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Cortinariaceae**



Comestibilité **Comestible**


Cortinarius varius (Schaeff.) Fr.

1040

Syn. :

Nom français : **Cortinaire variable**

Habitat : En montagne, exclusivement associé à l'épicéa.

Odeur : Faible, un peu fétide à la coupe.

Chapeau visqueux, jaune orangé +/- vif - Lames lilas.

Stipe en massue, blanc, à voile blanchâtre peu épais.

24 - Les cortinaires

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Cortinariaceae**



Comestibilité **Toxique**


Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen & Liimat.

922

Syn. : **Cortinarius eumarginatus** - **Cortinarius purpurascens**

Nom français : **Cortinarius purpureuscent**

Habitat : Sous conifères (épicéas), sur sols acides.

Odeur : Nulle.

Chapeau visqueux, gris-bleu, orné de fibrilles brunes.

Lames se tachant de violet sombre au froissement.

25 - Inocybes et hébelomes

Div. **Basidiomycota**
Clas. **Agaricomycetes**
Ord.. **Agaricales**
Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Hebeloma birrus (Fr.) Gillet

1543

Syn. : **Hebeloma pumilum**
Hebeloma danicum

Nom français : **Hébelome à chapeau brun roux**

Habitat : Sous feuillus et conifères, parfois sur sol brûlé.

Odeur : De cacao.

Chapeau visqueux, brun-roux vif à beige ochracé.

Stipe radicaire, blanchâtre, brunissant - Saveur amère.

25 - Inocybes et hébelomes

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Hymenogastraceae


Comestibilité **Toxique**

Hebeloma lateritium Murrill

1563

Syn. : **Hebeloma strophosum** - **Hebeloma mesophaeum**

Nom français : **Hébélome à centre sombre**

Habitat : Sous saules, aulnes et bouleaux.

Odeur : Raphanoïde.

Chapeau visqueux, cocardé, brun de datte au disque.

Cortine abondante - Stipe orné d'une zone annulaire.

25 - Inocybes et hébelomes

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Strophariaceae


Comestibilité **A rejeter**
Hebeloma pusillum J.E. Lange

1571

Syn. : **Hebeloma vaccinum var. cephalotum**

Nom français : **Hébélome menu**

Habitat : En bordure d'étangs ou de tourbières, sous saules.

Odeur : Raphanoïde.

Chapeau de 2-3 cm, bicolore, noisette, à marge pâle.

Stipe non cortiné, blanc puis brunissant, fibrilleux.

25 - Inocybes et hébelomes

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Strophariaceae


Comestibilité **Toxique**

Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet

1576

Syn. :

Nom français : **Hébélome échaudé**

Habitat : Ubiquiste, sous conifères et feuillus.

Odeur : Fortement raphanoïde.

Chapeau cuir fauvâtre - Lames non pleureuses.

Présence d'une mèche en haut du stipe (coupe).

25 - Inocybes et hébelomes

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Inocybaceae


Comestibilité **Toxique**

Inocybe geophylla P. Kumm.

1887

Syn. :

Nom français : **Inocybe à lames terreuses**

Habitat : En terrain humide, surtout sous feuillus.

Odeur : Spermatique.

Chapeau blanc, mamelonné, soyeux.

Lames pâles à brun ochracé, plutôt serrées.

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Galerineaceae


Comestibilité **A rejeter**

Galerina camerina (Fr.) Kühner

1404

Syn. : **Galerina pseudobadipes**

Nom français : **Galère campanulée**

Habitat : Sur bois très dégradé de conifères.

Odeur : Faible, un peu farineuse.

Chapeau brun ochracé, blanchâtre en séchant.

Stipe miel, couvert par des fibrilles du voile blanc.

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Agaricales

Fam. Galerineaceae


Comestibilité **Mortel**

Galerina marginata (Batsch) Kühner

1409

Syn. : **Galerina unicolor** - **Galerina autumnalis**

Nom français : **Galère marginée**

Habitat : Sur bois mort de conifères, dans la mousse, au sol.

Odeur : Farineuse.

Espèce brun-ocre à chapeau hygrophane.

Présence d'un anneau membraneux fugace.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Gymnopilaceae**



Comestibilité **Toxique**



Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill

1484

Syn. : **Gymnopilus stabilis - Gymnopilus hybridus**

Nom français : **Gymnopile pénétrant**

Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus.

Odeur : Légèrement herbacée.

Chapeau lisse à faiblement velouté, jaune orangé - Cortine persistante - Lames jaunâtres et saveur amère.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Mortel**



Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

1800

Syn. : **Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis**

Nom français : **Hypholome en touffes**

Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.

Odeur : De polypore.

En touffes sur les souches ou le bois mort. Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Pholiota gummosa (Lasch) Singer

2776

Syn. : **Flammula gummosa**

Nom français : **Pholiote gommeuse**

Habitat : Dans les clairières herbeuses, sur débris ligneux.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau floconneux, beige sur fond jaune verdâtre. Stipe moucheté sous une zone annulaire cortiniforme.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Pholiota limonella (Peck) Sacc.

2783

Syn. :

Nom français : **Pholiote nuancé de jaune citron**

Habitat : Surtout sur bouleaux, aulnes, sapins mais pas seulement.

Odeur : Faible, parfois un peu de viande fumée.

Chapeau très visqueux, avec des écailles roussâtres. Stipe et chapeau jaune doré - Stipe couvert d'écailles.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Pholiota lucifera (Lasch) Quéf.

2785

Syn. :

Nom français : **Pholiote luisante**

Habitat : Sur débris ligneux ou herbeux enterrés de feuillus.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau jaune avec des écailles ochracé roussâtre. Stipe jaune, orné d'une zone annulaire cortinée.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm.

2793

Syn. : **Pholiota muelleri**

Nom français : **Pholiote écaillée**

Habitat : En fascicules à la base des troncs vivants ou morts.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau hérissé d'écailles récurvées concentriques. Stipe très long, flexueux, squarveux-squamuleux.

26 - Autres cortinariales

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Strophariaceae**



Comestibilité **Toxique**



Internet
 Copyright (c) 2006 Alexandre Bédard

Stropharia caerulea Kreisel

3390

Syn. : **Stropharia cyanea sensu Tuomikoski**
Psilocybe caerulea

Nom français : **Strophaire bleutée**

Habitat : Dans les lieux rudéralisés, souvent parmi les orties.

Odeur : Faible, herbacée.

Chapeau bleu verdâtre puis jaunâtre, visqueux.

Arête des lames concolore - Anneau fugace.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula aeruginea

Charles Rougier

Russula aeruginea Lindblad ex Fr.

3058

Syn. :

Nom français : **Russule vert de gris**

Habitat : Souvent sous bouleaux, parfois sous conifères.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau gris verdâtre, vergeté, taché de rouille.

Lames crème puis ocre - Saveur légèrement âcre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**

Russula amoenicolor Romagn.

3068

Syn. :

Nom français : **Russule panachée**

Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout méridional.

Odeur : D'artichaut et de crustacés.

Chapeau violet mêlé d'ocre et d'olivâtre, mat et velouté.

Lames crème - Saveur douce - Stipe pruneux de rose.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula anthracina

Romagn. Charles

Russula anthracina Romagn.

3074

Syn. :

Nom français : **Russule anthracite**

Habitat : Sous feuillus hygrophiles.

Odeur : Un peu fruitée.

Chapeau charnu, ferme, blanchâtre puis marbré.

Saveur âcre - Lames crème, vite tachées de noir.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula aquosa

Charles Rougier

Russula aquosa Leclair

3077

Syn. : **Russula carminea**

Nom français : **Russule aqueuse**

Habitat : Dans les sphaignes des tourbières, des hauts-marais.

Odeur : Faible, à peine fruitée.

Espèce fragile - Chapeau rouge lilacin, à marge striée.

Saveur douce à un peu âcre - Lames blanches.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Toxique**


Russula betularum Hora

3092

Syn. : **Russula emetica var. betularum**

Nom français : **Russule émétique des bouleaux**

Habitat : Sous bouleaux, dans les marécages, les tourbières.

Odeur : Faible, légèrement fruitée.

Chapeau très fragile, rose lilacin, à marge cannelée.

Lames blanches à reflets crème - Saveur âcre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Russula cavipes
Charles Roulet
Russula cavipes Britzelm.

3099

Syn. :

Nom français : **Russule à pied creux**

Habitat : Surtout sous épicéas.

Odeur : Safranée ou de pommes.

Chapeau bigarré, violet nuancé d'olive - Lames crème, réagissant en rose avec NH₃ - Saveur subdouce.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Russula chloroides
Roulet Charles
Russula chloroides (Krombh.) Bres.

3101

Syn. :

Nom français : **Russule à lames glauques**

Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres.

Odeur : Forte, fruitée.

Grande espèce à chapeau blanc, sec, déprimé.
 Lames étroites - Stipe parfois zoné de vert au sommet.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Comestible**


Russula cyanoxantha
Roulet Charles
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

3113

Syn. : **Russula cutefracta**

Nom français : **Russule charbonnière**

Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres.

Odeur : Faible, non significative.

Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce.
 Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Toxique**


Russula emetica var. gregaria
Roulet Charles
Russula emetica (Schaeff.) Pers.

3125

Syn. :

Nom français : **Russule émetique**

Habitat : Dans la mousse ou les sphaignes des marécages.

Odeur : Subnulle ou un peu fruitée.

Chapeau rouge cerise - Stipe blanc tendant à jaunir.
 Lames blanches - Saveur très âcre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Russula farinipes
Roulet Charles
Russula farinipes Romell

3130

Syn. :

Nom français : **Russule à pied farineux**

Habitat : Sous feuillus, sur sols plutôt lourds et humides.

Odeur : Fruitée.

Chapeau jaune ochracé clair, à marge cannelée.
 Lames blanches - Stipe blanc - Saveur très piquante.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**


Russula fellea
Roulet Charles
Russula fellea (Fr.) Fr.

3133

Syn. :

Nom français : **Russule de fiel**

Habitat : Généralement sous hêtres.

Odeur : De compote de pommes.

Entièrement de couleur ochracée à ocre - Saveur âcre.
 Lames blanc crème nuancé d'ochracé

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **A rejeter**

Russula grata (laurocerasi)

Jean Delrieux

Russula grata Britzelm

3174

Syn. : **Russula laurocerasi** - **Russula fragrans**
Russula foetens var. **laurocerasi**

Nom français : **Russule à odeur de laurier cerise**

Habitat : Surtout sous feuillus.

Odeur : D'amandes amères, de laurier cerise.

Chapeau ochracé roussâtre - Saveur âcre.

Lames crème blanchâtre +/- tachées de roussâtre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **A rejeter**

Russula illota

Romagn. 2010

Russula illota Romagn.

3158

Syn. : **Russula laurocerasi** var. **illota**Nom français : **Russule à arête ponctuée**

Habitat : Sous feuillus.

Odeur : Nauséuse, sur fond d'amandes amères.

Chapeau ocre jaunâtre, à marge cannelée.

Saveur âcre - Lames crème, ponctuées de brun-noir.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **A rejeter**

Russula integra

Fr. 1962

Russula integra (L.) Fr.

3163

Syn. : **Russula piceetorum** - **Russula adulterina**Nom français : **Russule intègre**

Habitat : Dans les pessières de montagne.

Odeur : Très faible d'iode à la coupe.

Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns.

Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **A rejeter**

Internet

(c) Miquel A. Pérez-De-Gregorio

Russula integra (Singer) P.A. Moreau, Carteret & Francini.
f. pseudoolivascens

3164

Syn. : **Russula integra** var. **pseudoolivascens**
Russula fusca f. **pseudoolivascens**

Nom français : **Russule intègre à chapeau olivacé**

Habitat : Dans les pessières de montagne.

Odeur : Non caractéristique.

Diffère du type par son chapeau panaché de verdâtre, de gris bronzé et de jaune olivâtre.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **A rejeter**

Russula integra var. purpurella

Romagn. 2010

Russula integra (Singer) Bon
f. purpurella

3165

Syn. : **Russula integra** var. **purpurella**Nom français : **Russule intègre de couleur pourpre**

Habitat : Dans les pessières de montagne.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau épais, pourpre noir sans nuance brune.

Saveur douce - Lames ochracées à jaunes.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Comestible**

Russula mustelina

Charles Bonnier

Russula mustelina Fr.

3197

Syn. :

Nom français : **Russule couleur de belette**

Habitat : Dans les pessières à myrtilles, en montagne.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Espèce compacte - Chapeau sec, brun noisette.

Saveur douce - Lames crème - Chair épaisse.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula nigricans

Fr.

3200

Syn. :

Nom français : **Russule noircissante**

Habitat : Sous conifères, dans les pessières de montagne.

Odeur : Faible, un peu fruitée.

Chapeau blanchâtre, marbré de bistre - Saveur douce.

Lames espacées - Chair rougissante et noircissante.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula ochroleuca

Pers.

3204

Syn. :

Nom français : **Russule ocre et blanche**

Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des tourbières.

Odeur : Faiblement fruitée.

Chapeau ochracé - Lames blanches à crème pâle.

Saveur âcre à presque douce - Stipe blanc, grisonnant.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Mortel**



Russula olivacea

(Schaeff.) Fr.

3207

Syn. :

Nom français : **Russule olivacée**

Habitat : En montagne, sous hêtres et épicéas.

Odeur : Faible, un peu fruitée.

Chapeau vert à brun ou jaune, sec - Saveur douce.

Phénol = pourpre - Lames jaunes.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula puellaris

Fr.

3229

Syn. :

Nom français : **Russule jeune fille**

Habitat : Surtout sous conifères (épicéas), rare sous feuillus.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Petite espèce à chapeau pourpre - Lames crème.

Saveur subdouce - Jaunissement de toutes les parties.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Comestible**



Russula vesca

Fr.

3277

Syn. :

Nom français : **Russule comestible**

Habitat : Sous feuillus, en terrain siliceux.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rose carné, rose jambon - Saveur douce.

Lames blanchâtres - Réaction orangé vif avec Fer.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula violeipes f. citrina

(Qué.) Romagn.

3286

Syn. :

Nom français : **Forme jaune de la Russule à pied violet**

Habitat : Sous feuillus et conifères, souvent sous hêtres.

Odeur : Subnulle ou de crustacés.

Chapeau et stipe jaunes, sans trace de violet.

Les autres caractères sont identiques à ceux du type.

27 - Les russules

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Russula xerampelina (Schaeff.) Fr.

3289

Syn. :

Nom français : **Russule feuille morte - Russule écrevisse**

Habitat : Sous conifères de montagne, près des hauts-marais.

Odeur : De crustacés en train de cuire.

Chapeau pourpre - Stipe rose rouge - Lames ocre.

Saveur douce - Réaction verte avec SO4Fe.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **A rejeter**



Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray

2016

Syn. : **Lactarius aurantiofulvus**

Nom français : **Lactaire fauve orangé**

Habitat : En montagne, sous épicéas.

Odeur : Faible, de hareng salé à la fin.

Chapeau orangé ou fauve orangé, non zoné.

Latex abondant, immuable, doux puis amer.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Comestible**



Lactarius deterrimus Gröger

2037

Syn. :

Nom français : **Lactaire des épicéas**

Habitat : Exclusivement sous épicéas.

Odeur : Nulle.

Chapeau orangé vif, vite verdissant, zoné.

Latex peu abondant, orange, immuable, amer.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Toxique**



Lactarius helvus (Fr.) Fr.

2050

Syn. :

Nom français : **Lactaire à odeur de chicorée**

Habitat : Dans les tourbières, les hauts-marais.

Odeur : De chicorée torréfiée.

Grande espèce, à chapeau beige jaunâtre.

Latex aqueux, doux, peu abondant, vite tari.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**

Comestibilité **Comestible**



Lactarius picinus Fr.

2071

Syn. :

Nom français : **Lactaire enfumé**

Habitat : En montagne, dans les pessières.

Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brun noirâtre sombre, sec, velouté.

Latex lentement rosâtre sur la chair, âcre.

28 - Les lactaires

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Russulales**
 Fam. **Russulaceae**



Comestibilité **Comestible**



Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair

2091

Syn. :

Nom français : **Lactaire couleur saumon**

Habitat : Sous les sapins.

Odeur : Faible, légèrement savonneuse.

Chapeau jaune orangé, sans traces de vert.

Latex abondant, rouge carotte, subimmuable.

28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité A rejeter		Lactarius tabidus Fr. 2104 Syn. : Lactarius theiogalus sensu auct. Nom français : Lactaire chiffonné Habitat : Dans les tourbières, les hauts-marais. Odeur : Subnulle ou un peu pélargoniée. Chapeau ocre orangé, sec, chagriné, ridé. Latex jaunissant sur le mouchoir, +/- âcre.
28 - Les lactaires Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Russulales Fam. Russulaceae  Comestibilité A rejeter		Lactarius uvidus (Fr.) Fr. 2110 Syn. : Nom français : Lactaire humide Habitat : Sous bouleaux et saules, dans les mares. Odeur : Faible ou nulle. Chapeau beige lilacin, très visqueux, non zoné. Latex se teintant de violet sur les lames.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Boletus edulis Bull. 263 Syn. : Nom français : Cèpe de Bordeaux Habitat : Sous feuillus et conifères, plutôt sur terrain acide. Odeur : Fongique, très agréable. Chapeau de couleur noisette, à marginelle blanchâtre. Pores serrés, blancs à jaune verdâtre - Réseau blanc.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Toxique		Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini 295 Syn. : Boletus calopus Nom français : Bolet à beau pied Habitat : Sous conifères et feuillus, en montagne. Odeur : Un peu acidulée, de vinaigre. Stipe rouge, jaune en haut - Réseau blanc, très visible. Chair bleuissant légèrement à la coupe, très amère.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité A rejeter		Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 342 Syn. : Boletus piperatus - Chalciporus amarellus Nom français : Bolet poivré Habitat : Sous conifères de montagne, rarement sous feuillus. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-rouge à brun-jaune - Saveur poivrée. Pores amples, anguleux, cuivrés - Base du stipe jaune.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae  Comestibilité Comestible		Imleria badia (Fr.) Vizzini 1824 Syn. : Boletus badius - Xerocomus badius Nom français : Bolet bai Habitat : Sous conifères et feuillus. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau bai à marron, de couleur uniforme. Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.

29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Leccinellum pseudoscabrum (Kallenb.) Mikšík 2149 Syn. : Boletus pseudoscaber Leccinum pseudoscabrum Nom français : Bolet des charmes Habitat : Sous feuillus, noisetiers et charmes. Odeur : Faible. Chapeau brun fauve, finement feutré. Stipe élancé, grisonnant, ponctué de bistre-noir.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Leccinum albostipitatum Den Bakker & Noordel. 2133 Syn. : Leccinum aurantiacum sensu auct. Leccinum rufum Nom français : Bolet à pied orné de mèches blanches Habitat : Surtout sous les trembles, parfois sous peupliers. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau orangé vif, la cuticule débordant de la marge. Stipe couvert de mèches blanches puis roussissantes.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Leccinum duriusculum (S. Schulz.) Singer 3698 Syn. : Boletus duriusculus Leccinum duriusculum f. robustum Nom français : Bolet rude des trembles Habitat : Sous trembles et peupliers. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau ferme, dur, brun grisâtre, méchuleux. Stipe radican, taché de vert-bleu à la base.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité A rejeter		Leccinum holopus var. aerugineum (Fries) Blanco-Dios 3698 Syn. : Leccinum aerugineum Boletus holopus var. aerugineus Nom français : Bolet rude vert de gris Habitat : Sphaignaie de montagne, sous bouleaux pubescents. Odeur : Faible, non caractéristique. Chapeau bleu, crème - Chair blanche, rougeâtre à la coupe - Stipe brun, crème, cylindracé, squamuleux.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Boletaceae Comestibilité Comestible		Leccinum variicolor Watling 2152 Syn. : Boletus variicolor - Krombholziella variicolor Nom français : Bolet ramoneur Habitat : Sous bouleaux, dans les endroits humides. Odeur : Non caractéristique. Chapeau brun-noir avec des zones décolorées. Stipe gris blanchâtre, orné de squamules brun-noir.
29 - Les bolets Div. Basidiomycota Clas. Agaricomycetes Ord.. Boletales Fam. Suillaceae Comestibilité A rejeter		Suillus grevillei (Klotzch) Singer 3420 Syn. : Suillus elegans - Boletus elegans - Boletus grevillei Nom français : Bolet de Greville (Bolet élégant) Habitat : Sous mélèzes, de la plaine à la montagne. Odeur : Agréable, fruitée. Chapeau jaune d'or ou jaune orangé, visqueux. Voile partiel cortiniforme, visqueux - Pores étroits.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Boletales

Fam. Boletaceae



Comestibilité A rejeter

Xerocomellus porosporus (Imler ex Bon & Moreno) Šutara

3634

Syn. : Xerocomus porosporus - Boletus porosporus

Nom français : Bolet à chapeau fissuré

Habitat : Sous feuillus, surtout sous chênes.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau brun olive à brun-gris noirâtre, vite fissuré.

Pores jaune-olivâtre, bleuissants - Saveur douce.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Boletales

Fam. Boletaceae



Comestibilité Comestible

Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio

3640

Syn. : Boletus ferrugineus - Boletus et Xerocomus lanatus
Boletus et Xerocomus spadiceus

Nom français : Bolet ferrugineux

Habitat : Sous feuillus et sous conifères.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau brun-rouge, verdissant avec NH3.

Pores jaune +/- vif - Stipe fibrillo-ridé - Chair crème.

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Boletales

Fam. Gomphidiaceae



Comestibilité A rejeter


Chroogomphus helveticus (Pilát) Kuthan & Singer
subsp. tatensis

362

Syn. :

Nom français : Gomphide squamuleux

Habitat : Sous sapins et épicéas.

Odeur : Odeur agréable, un peu fruitée.

Chapeau orange, hémisphérique, feutré-squamuleux.

Chair jaunâtre orangé - Lames espacées et épaisses.

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Boletales

Fam. Gomphidiaceae



Comestibilité Comestible



Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.

1463

Syn. :

Nom français : Gomphide glutineux

Habitat : Sous conifères de montagne.

Odeur : Insignifiante.

Chapeau brun ochracé, recouvert d'un voile glutineux.

Lames espacées, très décurrentes.

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Boletales

Fam. Hygrophoropsidaceae



Comestibilité Comestible

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire

1728

Syn. :

Nom français : Fausse chanterelle

Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries.

Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore

Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Boletales

Fam. Paxillaceae



Comestibilité Mortel



Paxillus involutus (Batsch) Fr.

2685

Syn. :

Nom français : Paxille enroulé

Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs.

Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau roux ochracé, à marge involutée.

Lames très serrées, étroites, facilement détachables.

30 - Les boléales lamellés

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Paxillaceae**


Comestibilité **Mortel**

Paxillus olivellus P.A. Moreau et al.

2688

Syn. : **Paxillus filamentosus sensu auct.**

Nom français : **Paxille filamenteux**

Habitat : Sous les aulnes (glutinosa et incana), sur sol humide.

Odeur : Légèremet fruitée.

Chapeau velouté, ocre roussâtre, à marge enroulée.

Lames crème à jaunâtre - Stipe se tachant de roux.

30 - Les boléales lamellés

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Tapinellaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Tapinella atrotomentosa (Batsch) Sutara

3432

Syn. : **Paxillus atrotomentosus - Sarcopaxillus atrotomentosus**

Nom français : **Paxille à pied noir**

Habitat : A la base des souches de conifères.

Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau dimidié, ocre à brun rouille, finement feutré.

Stipe latéral, chaussé d'un tomentum brun-noir.

31 - Les gastéromycètes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Agaricaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Cyathus striatus (Huds. : Pers.) Pers.

1132

Syn. :

Nom français : **Cyathe strié**

Habitat : En groupes, sur débris végétaux.

Odeur : Faible, non caractéristique.

En coupe un peu évasée - Intérieur strié radialement.

Extérieur brun foncé, hirsute - Péridioles lenticulaires.

31 - Les gastéromycètes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Agaricales**
 Fam. **Agaricaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Lycoperdon umbrinum Pers.

2347

Syn. :

Nom français : **Vesse de loup brun d'ombre**

Habitat : Sur terre, surtout sous épicéas de montagne.

Odeur : Non caractéristique.

Fuctifications piriformes ornées d'aiguillons denses.

Gléba blanche puis brunâtre-olivacé, compacte.

31 - Les gastéromycètes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Phallales**
 Fam. **Phallaceae**


Comestibilité **A rejeter**

Phallus impudicus L.

2741

Syn. :

Nom français : **Satyre puant**

Habitat : Sous feuillus et conifères.

Odeur : Cadavérique à maturité.

D'abord en forme d'œuf puis il prend l'aspect d'une morille à long pied fragile et à chapeau verdâtre.

31 - Les gastéromycètes

Div. **Basidiomycota**
 Clas. **Agaricomycetes**
 Ord.. **Boletales**
 Fam. **Sclerodermataceae**


Comestibilité **Toxique**

Scleroderma areolatum Ehrenb.

3325

Syn. : **Scleroderma hypercoides**

Nom français : **Scléroderme aréolé**

Habitat : Sur terre, en lisière des bois, sur terrains en friche.

Odeur : Non caractéristique.

Carpophore globuleux, à stipe court et lacuneux.

Péridium parsemé d'écailles en forme d'aréoles.

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota

Clas. Agaricomycetes

Ord.. Boletales

Fam. Sclerodermataceae



Comestibilité Toxique



Scleroderma citrinum Pers.

3327

Syn. : **Scleroderma vulgare**
Scleroderma aurantium sensu auct.

Nom français : **Scléroderme commun**

Habitat : Sur terre sablonneuse.

Odeur : Nulle.

Fructifications tuberculeuses, comprimées, sessiles.

Péridium épais, jaune ochracé, verruqueux.