SORTIE DU 15 OCTOBRE 2026

La Cabane à Bonnet secteur les Seiglières, Saint-Martin d'Uriage

Mycologue : Charles Rougier

Responsable : Michel Bardet

17 participants : Gilles Bonnet-Machot, Estelle Bril, Alain Bucci, Annick Bucci, Simon Chanal, Jean Debroux, Michèle Debroux, Renée Derobert, Jean-François Lartigue, Philippe Lebourg, Benjamin Micoulaud, Maxence Roth, Jean-Paul Serra-Tosio, Françoise Serra-Tosio, Marie-Eve Stussi, Chloé Tournier, Didier Gibier

Bilan de la sortie :



Une sortie agréable dans un sous-bois très accessible et une météo clémente. Le sous-bois avait été visiblement visité par les ramasseurs de champignons. Nous avons pu collecter 77 espèces différentes. Les nouveaux adhérents (généralement jeunes !) ont pu bénéficier des compétences des mycologues qui participaient aussi à cette sortie. En fin de matinée les espèces ramassées ont été exposées et Charles a fait un tour de table didactique et dense de la récolte. Au cours de la sortie nous avons eu de quelques interactions avec des ramasseurs ou des promeneurs qui ont profité de notre présence pour nous interroger sur leurs propres récoltes. Charles a rappelé le devoir de prudence recommandé par la SMD quant à la comestibilité des champignons.

Merci à Didier Gibier pour la rédaction de la liste détaillée des champignons et les vérifications dans la nomenclature actuelle des espèces.

Quiz

Réponse dans la liste ci-après :

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Dacrymycetes
Ord.. Dacrymycetales
Fam. Dacrymycetaceae

Comestibilité A rejeter

Calocera furcata (Fr.) Fr. 299

Syn. : **Calocera viscosa var. furcata**

Nom français : **Calocère fourchue**
Habitat : Sur bois mort de conifères.
Odeur : Inodore.

Fructifications fourchues aux extrémités.
Proche de Calocera cornea mais spores différentes.

---

10 - Les basidiomycètes à basides remarquables

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Auriculariales
Fam. Exidiaceae

Comestibilité A rejeter

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. 2939

Syn. : **Tremellodon gelatinosum**

Nom français : **Pseudohydne gélatineux**
Habitat : Sur bois de conifères pourrissants, sur les souches.
Odeur : Non caractéristique.

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa consistance gélatineuse et à la présence d'aiguillons.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Fomitopsidaceae

Comestibilité A rejeter

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar 395

Syn. : **Spongipellis borealis**

Nom français : **Polypore boréal**
Habitat : Souches d'épicéas ou de sapins.
Odeur : Agréable, suave.

Chapeau épais, dimidié, spongieux, blanc puis ocre.
Pores dédaléens - Trame à 2 couches - Pas de stipe.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Cyanosporus caesius (Schrad.) Mc Ginty 2617

Syn. : **Postia caesia - oligoporus caesius - Tyromyces caesius**

Nom français : **Polypore bleuté des conifères**
Habitat : Surtout sur bois de conifères.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Fructifications molles, tachées de bleu, porées.
Pores arrondis, souvent déchirés (3 pores / mm).

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Fomitopsidaceae

Comestibilité A rejeter

Fomitopsis pinicola (Swartz) P. Karst. 1395

Syn. : **Ungulina marginata**

Nom français : **Polypore marginé**
Habitat : Saprophyte des conifères, parfois des feuillus.
Odeur : Acide, forte, évoquant l'odeur des poulaillers.

Fructifications dimidiées à surface brun-rouge.
L'un des polypores les plus communs.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Gloeophyllales
Fam. Gloeophyllaceae

Comestibilité A rejeter

Gloeophyllum abietinum (Bull.) P.Karst. 1456

Syn. : **Lenzites abietinus**

Nom français : **Lenzite du sapin**
Habitat : Saprophyte sur bois mort de conifères.
Odeur : Nulle.

Chapeaux brunâtres, peu ou non zonés.
Lames pruineuses (8 à 12 près de la marge).

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Gloeophyllales
Fam. Gloeophyllaceae

Comestibilité A rejeter

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

1457

Syn. : **Trametes odorata**

Nom français : **Tramète odorante**
Habitat : Sur bois mort d'épicéas, surtout en montagne.
Odeur : Forte d'anis, de vanille ou de pain d'épices.

Chapeau jaune orangé noduleux, feutré.
Trame noircissant en présence de NH3.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Hymenochaetales
Fam. Hymenochaetaceae

Comestibilité A rejeter

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk

1782

Syn. : **Hymenochaete mougeotii**

Nom français : **Hymenochaete rouge écarlate**
Habitat : Sur écorce des branches de sapin.
Odeur : Inodore.

Revêtement croûteux à marge relevée-réfléchie.
Hyménium rouge vif puis brun-rouge.

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Fomitopsidaceae

Comestibilité A rejeter

Postia ptychogaster (Kytov) Redhead

2886

Syn. : **Oligoporus ptychogaster - Tyromyces ptychogaster**
Polyporus ptychogaster - Ptychogaster albus

Nom français : **Polypore fuligineux**
Habitat : Sur bois mort de conifères.
Odeur : Nulle.

Fructification d'abord velue (forme imparfaite), puis formant des petits chapeaux porés (forme fertile).

---

11 - Croûtes et polypores

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Polyporales
Fam. Polyporaceae

Comestibilité A rejeter

Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd

3452

Syn. : **Coriolus hirsutus**

Nom français : **Tramète hirsute**
Habitat : Surtout sur bois mort de feuillus et d'arbustes.
Odeur : Insignifiante ou légèrement anisée.

Chapeau fortement hirsute ou strigueux, blanc-gris.
Pores étroits, arrondis, anguleux - Contexte subéreux.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité Comestible

Cantharellus amethysteus (Quélet) Saccardo

318

Syn. : **Cantharellus cibarius var. amethysteus**

Nom français : **Girolle amethyste**
Habitat : Feuillus (hêtres surtout) et conifères de montagne.
Odeur : Agréable de mirabelle.

Chapeau jaune, moucheté de petites écailles violettes.
Plis décurrents - Stipe jaunissant fortement au toucher.

---

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité A rejeter

Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt.

384

Syn. : **Clavaria cinerea**

Nom français : **Clavaire cendrée**
Habitat : Sous feuillus, sur sol riche en débris ligneux.
Odeur : Faible, de beurre.

Sous forme de buisson ramifié de 10 à 12 cm de haut.
Rameaux grisâtres à reflets violets - Saveur douce.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité Comestible

Craterellus tubaeformis Bull. 1080

Syn. : **Cantharellus tubaeformis**

Nom français : **Chanterelle en tube**
Habitat : Surtout sous conifères, dans les mousses humides.
Odeur : Agréable, fruitée.
Chapeau en entonnoir, brun gris à brun ochracé.
Plis bien formés, fourchus, gris-brun - Stipe brun-jaune.

12 - Clavaires, hydnes, chanterelles et girolles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Cantharellales
Fam. Hydnaceae

Comestibilité Comestible

Hydnum repandum L. 1672

Syn. :

Nom français : **Pied-de-mouton**
Habitat : Sous feuillus et conifères, jusqu'en montagne.
Odeur : Agréable, fruitée.
Chapeau de jaune pâle à couleur abricot.
Aiguillons très serrés, fragiles, faciles à séparer.

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Armillaria lutea Gillet 187

Syn. : **Armillaria bulbosa - Armillaria gallica**

Nom français : **Armillaire à anneau jaune**
Habitat : Espèce isolée ou en groupes, sur feuillus et conifères.
Odeur : Faible à +/- désagréable.
Chapeau brun-ocre - Stipe bulbeux à base +/- jaune vif.
Anneau bordé de jaune - Lames un peu décurrentes.

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Physalacriaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink 189

Syn. : **Armillariella ostoyae**

Nom français : **Armillaire d'Ostoya**
Habitat : Souvent sur souches et racines d'épicéas.
Odeur : Faible, de polypore.
Chapeau brun-roux, couvert de mèches brun noirâtre.
Anneau membraneux - Lames un peu décurrentes.

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

Comestibilité Comestible

Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 424

Syn. :

Nom français : **Clitocybe anisé**
Habitat : Feuillus et conifères, surtout en montagne.
Odeur : Fortement anisée.
Chapeau vert à gris-vert, parfois décoloré, mat.
Lames adnées, blanches ou verdâtres - Saveur douce.

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

Comestibilité Comestible

Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja 1835

Syn. : **Clitocybe gibba**

Nom français : **Clitocybe bossu**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : Cyanique.
Chapeau en entonnoir, beige à beige ochracé.
Lames très décurrentes, crème - Stipe blanchâtre.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini et al. 2300

Syn. : **Clitocybe connata - Lyophyllum connatum**

Nom français : **Clitocybe en touffes**
Habitat : Au bord des chemins, en troupes et fasciculés.
Odeur : Herbacée, de petits pois ou de haricots.

Chapeau blanc pur ou glacé, soyeux, marbré de gris.
Chair blanche, cartilagineuse - Pieds blancs, connés.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 2934

Syn. : **Clitocybe cyathiformis - Omphalia cyathiformis**

Nom français : **Clitocybe en coupe**
Habitat : Dans les endroits herbeux, en bordure des chemins.
Odeur : Cyanique.

Chapeau en entonnoir, hygrophane, marron à gris.
Lames décurrentes, falciformes, pentues, brun clair.

---

14 - Les clitocybes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Hymenochaetales
Fam. Rickenellaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. 3027

Syn. : **Mycena fibula - Omphalia fibula**

Nom français : **Omphale en forme d'épingle**
Habitat : Dans les mousses, les marécages, les sphaignes.
Odeur : Nulle.

Espèce gracile à chapeau ombiliqué, orange vif.
Lames arquées-décurrentes à reflets orangés.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Tricholoma pseudonictitans Bon 3538

Syn. : **Tricholoma fulvum var. pseudonictitans**

Nom français : **Tricholome luisant**
Habitat : Sous conifères, rarement sous feuillus.
Odeur : Subnulle à légèrement farineuse.

Chapeau brun fauve, à marge non cannelée.
Lames crème - Chair du pied jaune au grattage.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 3544

Syn. : **Tricholoma boudieri**

Nom français : **Tricholome à odeur de savon**
Habitat : Sous feuillus et conifères, de la plaine à la montagne.
Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide.

Chapeau gris-brun olivâtre - Chair rosissante.
Lames espacées, épaisses - Stipe radicant, plein.

---

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Tricholomataceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Tricholoma saponaceum Bres. var. ardosiacum 3710

Syn. : **Tricholoma saponaceum f. ardosiacum**

Nom français : **Variété à chapeau couleur ardoise**
Habitat : Sous feuillus et conifères.
Odeur : De savonnette, de gant de toilette humide.

Diffère du type par son chapeau de couleur sombre ardoisée.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

15 - Les tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Incertae sedis

Comestibilité A rejeter

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer

3573

Syn. : **Tricholoma decorum**

Nom français : **Tricholome décoré**
Habitat : Sur bois pourri de conifère, surtout en montagne.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau jaune d'or, orné de squamules brun olivacé.
Stipe moucheté de brun bistre - Lames jaune d'or.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae

Comestibilité Comestible

Laccaria amethystina Cooke

1987

Syn. : **Laccaria amethystea**
Laccaria laccata var. amethystina

Nom français : **Laccaire améthyste**
Habitat : Ubiquiste, sous feuillus et conifères.
Odeur : Légèrement fruitée.

Chapeau hygrophane, violet foncé puis pâlissant.
Lames très espacées, larges, épaisses, violettes.

---

16 - Les autres tricholomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Hydnangiaceae

Comestibilité Comestible

Laccaria laccata (Scop.) Cooke

1989

Syn. :

Nom français : **Laccaire laqué**
Habitat : Dans les bois, au bord des chemins.
Odeur : Insignifiante.

Chapeau hygrophane, fauve ochracé, sublisse.
Lames espacées, épaisses, larges, rose carné.

---

17 - Collybies et marasmes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Omphalotaceae

Comestibilité A rejeter

Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox

3001

Syn. : **Collybia butyracea**

Nom français : **Collybie beurrée**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sur sols pauvres.
Odeur : Agréable, épicée.

Chapeau brun-rouge, hygrophane, gras au toucher.
Stipe clavé, farci ou creux, concolore, fibrilleux, sec.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél.

2472

Syn. : **Mycena elegans sensu auct.**

Nom français : **Mycène à arête des lames orange**
Habitat : Dans les forêts de conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau brun-gris à marge jaune ou jaune oangé.
Arête des lames orange vif.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena galericulata (Scop.) Gray

2505

Syn. :

Nom français : **Mycène en casque**
Habitat : Sur souches et branches de feuillus ou de conifères.
Odeur : Faible, farineuse (saveur très farineuse).

Stipe tenace, souvent comprimé, hirsute à la base.
Lames souvent rose pâle, fortement interveinées.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité Toxique

Mycena rosea Gramberg — 2558

Syn. : **Mycena pura f. et var. rosea**

Nom français : **Mycène rose**
Habitat : Surtout sous feuillus, sur terre nue, parmi les feuilles.
Odeur : Raphanoïde.

Chapeau de couleur vieux rose, hygrophane.
Stipe blanc à rose pâle, finement fibrilleux.

---

18 - Les mycènes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Mycenaceae

Comestibilité A rejeter

Mycena rubromarginata (Fr.) P. Kumm. — 2561

Syn. :

Nom français : **Mycène à lames bordées de pourpre**
Habitat : Sur bois pourrissant de conifères et de feuillus.
Odeur : Nulle.

Chapeau brun grisâtre à reflets lilas, pruineux, strié.
Arête des lames pourpre à brun rougeâtre.

---

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité A rejeter

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod — 1140

Syn. :

Nom français : **Cystoderme furfuracé**
Habitat : Sous conifères, sur humus ou tapis d'aiguilles.
Odeur : De moisi, d'insecticide, de lindane.

Chapeau chamois ochracé, finement farineux-granuleux
Stipe concolore, couvert d'une armille floconneuse.

---

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité A rejeter

Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod — 1142

Syn. :

Nom français : **Cystoderme à dents de requin**
Habitat : Sous conifères, dans les mousses, sur les aiguilles.
Odeur : Désagréable, de moisi ou de gaz d'éclairage.

Chapeau gris rose, granuleux, à marge appendiculée.
Stipe couvert d'une armille surmontée d'un anneau.

---

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité A rejeter

Cystoderma fallax A.H. Sm. & Singer — 1143

Syn. : **Cystoderma carcharias var. fallax**

Nom français : **Cystoderme trompeur**
Habitat : Sous conifères.
Odeur : Désagréable de moisi, terreuse.

Diffère du type par la couleur brun-ocre à brun rouille du carpophore et par l'anneau plus ample, bien formé.

---

19 - Les lépiotes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Macrolepiota procera (Scop.) Singer — 2387

Syn. : **Lepiota procera**

Nom français : **Lépiote élevée (Coulemelle)**
Habitat : Dans les prés, les lisières ou clairières gramineuses.
Odeur : Faible, fongique.

Reconnaissable à sa grande taille, à son chapeau squameux, à son stipe chiné, à son anneau coulissant.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

21 - Coprins et psathyrelles

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Coprinaceae

Comestibilité Comestible

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 539

Syn. :

Nom français : **Coprin chevelu**
Habitat : Dans les lieux herbeux, les jardins, les décombres.
Odeur : Faible ou nulle, non caractéristique.

Chapeau cylindracé, blanc, orné de mèches blanches.
Stipe doté d'un anneau fragile, mobile - Chair blanche.

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Toxique

Amanita muscaria (L.) Lam. 130

Syn. :

Nom français : **Amanite tue-mouches**
Habitat : Sous feuillus et conifères, surtout en terrain acide.
Odeur : Non caractéristique.

Chapeau rouge écarlate moucheté de flocons blancs.
Anneau membraneux, juponnnant - Lames blanches.

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible

Amanita umbrinolutea (Secretan ex Gillet) Bataille 161

Syn. : **Amanitopsis umbrinolutea**

Nom français : **Amanite ombre jaune**
Habitat : Sous feuillus ou sous conifères.
Odeur : Inodore.

Robuste - Chapeau châtain, cocardé, lames surlignées de brun. Souvent confondue avec A. battarae.

22 - Les amanites

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Amanitaceae

Comestibilité Comestible

Amanita vaginata (Bull.) Lam. 162

Syn. :

Nom français : **Amanite vaginée**
Habitat : Ubiquiste, sans liaison avec des essences précises.
Odeur : Inodore.

Stipe sans anneau - Chapeau grisâtre, mamelonné.
Volve membraneuse, très engainante - Spores rondes.

23 - Plutées, volvaires et entolomes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Pluteaceae

Comestibilité A rejeter

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 2838

Syn. : **Pluteus brunneoradiatus - Pluteus atricapillus**

Nom français : **Plutée couleur de cerf**
Habitat : Sur souches et bois mort de feuillus et de conifères.
Odeur : Nettement raphanoïde.

Chapeau gris brunâtre, sans nuances olivâtres.
Lames à arête concolore - Hyphes non bouclées.

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

Comestibilité Toxique

Cortinarius cinnamomeus (L.) Gray 646

Syn. :

Nom français : **Cortinaire cannelle**
Habitat : En plaine ou en montagne, dans les hauts marais.
Odeur : Faible de radis ou d'iode.

Chapeau cannelle, subsquamuleux, à mamelon obtus. Lames fauve orangé - Voile jaune à brun-rouge.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

Comestibilité A rejeter

Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr. 861

Syn. :

Nom français : **Cortinaire cuivré**
Habitat : Dans les hêtraies-sapinières, en terrain calcicole.
Odeur : Nulle.

Chapeau rouge sang ou brun-rouge bordé de gris-vert.
Lames jaune verdâtre - Pied orné d'un bulbe volviforme.

---

24 - Les cortinaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Cortinariaceae

Comestibilité Toxique

Thaxterogaster purpurascens (Fr.) Niskanen & Liimat. 922

Syn. : **Cortinarius eumarginatus - Cortinarius purpurascens**

Nom français : **Cortinarius purpurescent**
Habitat : Sous conifères (épicéas), sur sols acides.
Odeur : Nulle.

Chapeau visqueux, gris-bleu, orné de fibrilles brunes.
Lames se tachant de violet sombre au froissement.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Gymnopilaceae

Comestibilité Toxique

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill 1484

Syn. :

Nom français : **Gymnopile pénétrant**
Habitat : Sur bois dégradé de conifères et de feuillus.
Odeur : Légèrement herbacée.

Chapeau lisse à faiblement velouté, jaune orangé - Cortine persistante -
Lames jaunâtres et saveur amère.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité Comestible

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. 1794

Syn. : **Geophila capnoides**

Nom français : **Hypholome à lames enfumées**
Habitat : Sur souches et racines de conifères.
Odeur : Plutôt agréable.

En touffes, à chapeaux lisses et jaune olive.
Lames lavées de lilas puis noirâtres - Saveur douce.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité Mortel

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 1800

Syn. : **Geophila fascicularis - Psilocybe fascicularis**

Nom français : **Hypholome en touffes**
Habitat : Sur bois mort de feuillus, de conifères.
Odeur : De polypore.

En touffes sur les souches ou le bois mort.
Lames jaune soufre à verdâtre et saveur amère.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité Toxique

Hypholoma marginatum J. Schröt. 1806

Syn. : **Hypholoma dispersum - Psilocybe marginata**

Nom français : **Hypholome marginé**
Habitat : Sur bois et débris divers de conifères.
Odeur : Non caractéristique.

Marge piléique ornée des restes du voile blanc.
Stipe coriace, voilé-chiné de fibrilles blanches.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité A rejeter

Pholiota gummosa (Lasch) Singer

2776

Syn. : **Flammula gummosa**

Nom français : **Pholiote gommeuse**
Habitat : Dans les clairières herbeuses, sur débris ligneux.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau floconneux, beige sur fond jaune verdâtre.
Stipe moucheté sous une zone annulaire cortiniforme.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité A rejeter

Pholiota lenta (Pers.) Singer

2782

Syn. : **Flammula lenta**
Dryophila lenta
Nom français : **Pholiote glutineuse**
Habitat : Sous feuillus et conifères, sur bois dégradé.
Odeur : Faible, légèrement iodée.

Chapeau beige ochracé jaunâtre, très visqueux, avec des flocons blancs noyés dans le mucus.

---

26 - Autres cortinariales

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Strophariaceae

Comestibilité Toxique

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.

3387

Syn. : **Psilocybe aeruginosa**

Nom français : **Strophaire vert de gris**
Habitat : En lisière des bois, sur débris végétaux pourrissant.
Odeur : Légèrement herbacée.

Chapeau bleu-vert, visqueux, à marge appendiculée.
Arête des lames blanche - Anneau visqueux, pendant.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula cavipes Britzelm.

3099

Syn. :

Nom français : **Russule à pied creux**
Habitat : Surtout sous épicéas.
Odeur : Safranée ou de pommes.

Chapeau bigarré, violet nuancé d'olive - Lames crème, réagissant en rose avec NH3 - Saveur subdouce.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Russula chloroides (Krombh.) Bres.

3101

Syn. :

Nom français : **Russule à lames glauques**
Habitat : Sous feuillus, surtout sous hêtres.
Odeur : Forte, fruitée.

Grande espèce à chapeau blanc, sec, déprimé.
Lames étroites - Stipe parfois zoné de vert au sommet.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae



Comestibilité Comestible

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

3113

Syn. : **Russula cutefracta**

Nom français : **Russule charbonnière**
Habitat : Surtout sous hêtres (Fagus), sur sols plutôt pauvres.
Odeur : Faible, non significative.

Chapeau pourpre violet à gris ardoisé - Saveur douce.
Lames blanches, nettement lardacées - Stipe blanc.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula fellea (Fr.) Fr. 3133

Syn. :

Nom français : **Russule de fiel**
Habitat : Généralement sous hêtres.
Odeur : De compote de pommes.

Entièrement de couleur ochracée à ocre - Saveur âcre.
Lames blanc crème nuancé d'ochracé

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula illota Romagn. 3158

Syn. : **Russula laurocerasi var. illota**

Nom français : **Russule à arête ponctuée**
Habitat : Sous feuillus.
Odeur : Nauséeuse, sur fond d'amandes amères.

Chapeau ocre jaunâtre, à marge cannelée.
Saveur âcre - Lames crème, ponctuées de brun-noir.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula integra (L.) Fr. 3163

Syn. : **Russula piceetorum - Russula adulterina**

Nom français : **Russule intègre**
Habitat : Dans les pessières de montagne.
Odeur : Très faible d'iode à la coupe.

Chapeau épais, dur, versicolore, dans les tons bruns.
Lames jaune saturé - Saveur douce, de noisette.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Russula mustelina Fr. 3197

Syn. :

Nom français : **Russule couleur de belette**
Habitat : Dans les pessières à myrtilles, en montagne.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Espèce compacte - Chapeau sec, brun noisette.
Saveur douce - Lames crème - Chair épaisse.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula nigricans Fr. 3200

Syn. :

Nom français : **Russule noircissante**
Habitat : Sous conifères, dans les pessières de montagne.
Odeur : Faible, un peu fruitée.

Chapeau blanchâtre, marbré de bistre - Saveur douce.
Lames espacées - Chair rougissante et noircissante.

---

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Russula ochroleuca Pers. 3204

Syn. :

Nom français : **Russule ocre et blanche**
Habitat : Sous feuillus et conifères, en bordure des tourbières.
Odeur : Faiblement fruitée.

Chapeau ochracé - Lames blanches à crème pâle.
Saveur âcre à presque douce - Stipe blanc, grisonnant.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

27 - Les russules

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Mortel

Russula olivacea (Schaeff.) Fr. 3207

Syn. :

Nom français : **Russule olivacée**
Habitat : En montagne, sous hêtres et épicéas.
Odeur : Faible, un peu fruitée.
Chapeau vert à brun ou jaune, sec - Saveur douce.
Phénol = pourpre - Lames jaunes.

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray 2016

Syn. : **Lactarius aurantiofulvus**

Nom français : **Lactaire fauve orangé**
Habitat : En montagne, sous épicéas.
Odeur : Faible, de hareng salé à la fin.
Chapeau orangé ou fauve orangé, non zoné.
Latex abondant, immuable, doux puis amer.

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité A rejeter

Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. 2048

Syn. :

Nom français : **Lactaire à odeur de noix de coco**
Habitat : Sous bouleaux, en terrain acide.
Odeur : De noix de coco.
Chapeau beige rosâtre, pruineux, feutré.
Latex peu abondant, fluide, doux puis âcre.

28 - Les lactaires

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Russulales
Fam. Russulaceae

Comestibilité Comestible

Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair 2091

Syn. :

Nom français : **Lactaire couleur saumon**
Habitat : Sous les sapins.
Odeur : Faible, légèrement savonneuse.
Chapeau jaune orangé, sans traces de vert.
Latex abondant, rouge carotte, subimmuable.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Toxique

Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini 295

Syn. : **Boletus calopus**

Nom français : **Bolet à beau pied**
Habitat : Sous conifères et feuillus, en montagne.
Odeur : Un peu acidulée, de vinaigre.
Stipe rouge, jaune en haut - Réseau blanc, très visible.
Chair bleuissant légèrement à la coupe, très amère.

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité A rejeter

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille 342

Syn. : **Boletus piperatus - Chalciporus amarellus**

Nom français : **Bolet poivré**
Habitat : Sous conifères de montagne, rarement sous feuillus.
Odeur : Non caractéristique.
Chapeau brun-rouge à brun-jaune - Saveur poivrée.
Pores amples, anguleux, cuivrés - Base du stipe jaune.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Imleria badia (Fr.) Vizzini

1824

Syn. : **Boletus badius - Xerocomus badius**

Nom français : **Bolet bai**
Habitat : Sous conifères et feuillus.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau bai à marron, de couleur uniforme.
Stipe non réticulé, fibrilleux, brun-rouge pâle.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

Comestibilité Comestible

Neoboletus erythropus (Pers.) C. Hahn

2601

Syn. : **Boletus erythropus**

Nom français : **Bolet à pied rouge**
Habitat : Sous conifères et feuillus, surtout en montagne.
Odeur : +/- fruitée.

Grande espèce à chapeau brun-rouge, feutré-velouté.
Stipe moucheté de rouge grenat et pores orangés.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.J. Gilbert

2880

Syn. : **Porphyrellus pseudoscaber**
Tylopilus porphyrosporus
Nom français : **Bolet porphyre**
Habitat : Sous feuillus et sous conifères de montagne.
Odeur :

Chapeau sec, brun noirâtre olivacé, finement velouté.
Pores petits, arrondis, gris à pourpres.

---

29 - Les bolets

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Boletaceae

TOXIQUE

Comestibilité Toxique

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.

3383

Syn. : **Strobilomyces floccopus - Boletus strobilaceus**

Nom français : **Bolet pomme de pin**
Habitat : Sous conifères et feuillus, souvent sur les talus.
Odeur : Un peu terreuse.

Chapeau gris noirâtre, orné d'écailles pyramidales.
Pores amples, rougissant - Anneau épais et laineux.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Gomphidiaceae

A REJETER

Comestibilité A rejeter

Chroogomphus helveticus (Pilát) Kuthan & Singer subsp. tatrensis

362

Syn. :

Nom français : **Gomphide squamuleux**
Habitat : Sous sapins et épicéas.
Odeur : Odeur agréable, un peu fruitée.

Chapeau orange, hémisphérique, feutré-squamuleux.
Chair jaunâtre orangé - Lames espacées et épaisses.

---

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Hygrophoropsidaceae

Comestibilité Comestible

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire

1728

Syn. :

Nom français : **Fausse chanterelle**
Habitat : Souvent sous conifères, sur souches pourries.
Odeur : Faible, non caractéristique.

Chapeau jaune à orangé, mat, velouté - Stipe concolore
Lames décurrentes, serrées, fourchues, jaune-orange.

2026-10-14 Sortie cabane à Bonnet

30 - Les bolétales lamellés

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Boletales
Fam. Paxillaceae

Comestibilité Mortel

Paxillus involutus (Batsch) Fr. 2685

Syn. :

Nom français : **Paxille enroulé**
Habitat : Sous feuillus et conifères, dans les parcs.
Odeur : Faible, de scléroderme.

Chapeau roux ochracé, à marge involutée.
Lames très serrées, étroites, facilement détachables.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité A rejeter

Bovista plumbea Pers. 279

Syn. :

Nom français : **Boviste couleur de plomb**
Habitat : Prés, pâturages, pelouses subalpines et alpines.
Odeur : Inodore.

Carpophores globuleux ou aplatis, de 2 à 3 cm.
Exopéridium blanc - Endopéridium gris à maturité.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité A rejeter

Lycoperdon echinatum Pers. 2339

Syn. : **Lycoperdon gemmatum var. echinatum**

Nom français : **Vesse de loup hérisson**
Habitat : Surtout sous hêtres en terrain calcaire.
Odeur : Non caractéristique.

Fructifications globuleuses fortement échinulées.
Gléba blanche puis brun pourpre à maturité.

---

31 - Les gastéromycètes

Div. Basidiomycota
Clas. Agaricomycetes
Ord.. Agaricales
Fam. Agaricaceae

Comestibilité Comestible

Lycoperdon perlatum Pers. 2345

Syn. : **Lycoperdon gemmatum**

Nom français : **Vesse de loup perlée**
Habitat : Sur terre nue ou parmi les aiguilles.
Odeur : Non caractéristique.

Frucifications blanches recouvertes d'aiguillons.
Gléba blanche puis olive - Stipe conique.

Myxomycètes

Div. Myxomycota
Clas. Myxomycetes
Ord.. Liceales
Fam. Reticulariaceae

Comestibilité A rejeter

Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr. 2335

Syn. :

Nom français : **Lycogale du bois**
Habitat : Sur bois mort.
Odeur : Nulle.

Aethaliums subglobuleux ou pulvinés.
Plasmode rouge corail - Péridium rugueux.